

RIVM rapport 441500 012

**Registratie van SOA en HIV consulten bij
GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999**

M.J.W. van de Laar, K. Haks, A.J.J. Coenen ¹

April 2001

¹ Stichting soa-bestrijding

Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van het project 441500, "Epidemiologie en surveillance van SOA".

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven,
telefoon: 030 - 274 91 11, fax: 030 - 274 29 71

Abstract

Public health nurses at the municipal health services keep a register of patients attending the MHS or STD clinic for diagnosis and treatment of STD or request for HIV-testing. Data are collected at a national level and are only registered for an actual STD or HIV consultation with confirmed diagnosis. Thirty-nine health services registered a total of 11,586 consultations with a confirmed diagnosis in 1999 (15% more than in 1998). About 75% of the patients were Dutch. Three-quarters of the men reported heterosexual contacts, 20% reported homosexual and bisexual contacts. Of the women, 21% reported to have worked as a commercial sex worker in the past 6 months prior to the consultation at the clinic.

The number of cases of diagnosed STD had increased by 3% in 1999 (to 2934) with respect to 1998 (2844); for women 0% and for men 6%. An STD was actually diagnosed in 31% of the visitors who were tested for STD (1998: 36%). Patients with a confirmed STD were more often non-Dutch; the percentage with homosexual and bisexual contacts was higher than among the total group of patients. The most common STD for both men and women was chlamydia. The next most common STD for men were genital warts and gonorrhoea, for women bacterial vaginitis, candidiasis and genital warts. A rise of 20% in the number of gonorrhoea cases among men was observed, for women the number declined by 12%. In 1999 5027 patients consulted for HIV and requested HIV-testing; 0.9% were found positive. Just as in 1998, homosexual and bisexual men were most often represented among the HIV-positives.

Voorwoord

Dit rapport beschrijft de resultaten van de registratie van 1999 die wordt gevoerd in de non-curatieve bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze registratie geeft inzicht in het aantal consulten en gestelde diagnoses bij bezoekers met een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek bij GGD's en SOA-poliklinieken. De Stichting soa-bestrijding is verantwoordelijk voor de verzameling van de gegevens en zorgt ervoor dat de gegevens van de GGD's bij het RIVM komen. De rapportage is verzorgd door medewerkers van het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) van het RIVM.

De gegevens over 1999 zijn, evenals in de voorgaande jaren, verzameld door de enthousiaste medewerking van sociaal verpleegkundigen (SV's) en artsen van de GGD's. Door deze inspanning leveren zij een belangrijke bijdrage aan het inzicht in het voorkomen van SOA in Nederland.

Deze registratie wordt sinds jaren gevoerd zodat het mogelijk is om trends over de tijd te bestuderen. Ook uit dit verslag blijken weer verschuivingen in het bezoek aan de GGD's en SOA-poliklinieken. Deze registratie biedt echter niet voldoende inzicht in het voorkomen van SOA in Nederland. Omdat andere registraties een dergelijk inzicht ook niet kunnen bieden is in 1999 een werkgroep herziening SOA-surveillance gestart om de Inspectie voor de Gezondheidszorg te adviseren over een gewenst surveillancesysteem, welk advies in oktober 2000 is uitgebracht. In 2001 zal duidelijk worden op welke wijze de toekomstige SOA-surveillance wordt vormgegeven en welke rol de SOA registratie hierbij zal spelen.

Het eerste gedeelte van het rapport heeft betrekking op de presentatie en bespreking van de nationale gegevens (tabellen deel A). Het tweede gedeelte van het rapport betreft het tabellenoverzicht waarbij behalve de nationale tabellen (deel A) ook trendgegevens over de periode 1993-1999 (deel B) en de gegevens van de 13 GGD's met de grootste bijdrage (deel C) worden gepresenteerd. Hierbij is gekozen om de meest relevante gegevens te presenteren. Echter, vervolgbewerkingen zijn op verzoek mogelijk, ook voor GGD's die niet apart in dit jaarverslag zijn gepresenteerd. De auteurs stellen prijs op opmerkingen en suggesties die het jaarverslag kunnen verbeteren.

Mw. Dr. Ir M.J.W. van de Laar
Projectleider SOA, AIDS, hepatitis

Drs. A.J.J. Coenen, MPM
Directeur Stichting soa-bestrijding

Inhoud

Samenvatting	9
1. Inleiding	11
2. Consulten en kenmerken bezoekers	13
2.1 Totaal aantal consulten voor SOA-hulpvraag en HIV-testverzoek	13
2.2 Aandeel van GGD's en SOA-poliklinieken	13
2.3 Seizoensfluctuatie	14
2.4 Reden voor bezoek	15
2.5 Reden van bezoek in relatie tot onderzoek en uitslag	16
2.6 Epidemiologische kenmerken van bezoekers	17
3. SOA-diagnoses en achtergrondkenmerken	19
3.1 Aantal vastgestelde infecties	19
3.2 Aandeel van verschillende SOA	20
3.3 Infecties met Chlamydia trachomatis	21
3.4 Gonorroe	22
3.5 Syfilis	23
3.6 HIV-infecties	24
3.7 Virale SOA	24
4. Trendoverzichten SOA 1993-1999	27
5. Beschouwing	29

TABELLEN	32
Toelichting op de gegevensverwerking en tabellen	33
DEEL B NATIONALE GEGEVENS	35
CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS	35
1 Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek	35
2 Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek	36
3 Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek	36
4a Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD	36
4b Reden voor SOA-onderzoek en HIV-test	37
4c Aantal consulten naar reden van bezoek, soort onderzoek en diagnose	37
5 Aantal consulten naar leeftijd en geslacht	37
6 Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht	38
7 Aantal consulten naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek, mannen	38
8a Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, mannen	38
8b Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, vrouwen	38
9 Aantal consulten naar druggebruik en geslacht	39
10 Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht	39
GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTEN	40
11 Aantal gestelde diagnoses naar geslacht	40
11a Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht	41
11b Lokalisatie i.g.v. gonorroe (incl. PVG), naar geslacht	42
11c Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht	42
12 Aantal infecties in geval van gestelde diagnose, naar geslacht	42
13a Diagnoses naar leeftijd, mannen	43
13b Diagnoses naar leeftijd, vrouwen	43
14a Diagnoses naar land van herkomst, mannen	44
14b Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen	44
15 Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen	45
16a Diagnoses naar prostitutie, mannen	45
16b Diagnoses naar prostitutie, vrouwen	45
17 Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen	46
18a Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen	46
18b Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen	46
18c Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen	47
19 Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep	47
DEEL B TRENDOVERZICHTEN SOA 1993-1999	49
20 Aantal gediagnosticeerde SOA en aantal consulten, 1993-1999	49
20a Aantal diagnoses en percentage per jaar, 1993-1999	49
21a Aantal diagnoses en percentage per jaar, heteroseksuele mannen, 1993-1999	50
21b Aantal diagnoses en percentage per jaar, homo- en biseksuele mannen, 1993-1999	50
22a Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, niet werkzaam in de prostitutie, 1993-1999	51
22b Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, werkzaam in de prostitutie, 1993-1999	51

1. GG en GD Utrecht	53
2. GGD Rotterdam e.o.	61
3. GGD regio Nijmegen	69
4. GGD Hart voor Brabant	77
5. GGD Arnhem	85
6. GGD Oostelijk Zuid Limburg	93
7. GGD Twente	101
8. GGD Den Haag	109
9. GGD Groningen	117
10. GGD Noord Kennemerland	125
11. GGD Zuidelijk Zuid Limburg	133
12. GGD West Brabant	141
13. GGD Zuid Kennemerland	149

Bijlage 1	Verzendlijst	159
Bijlage 2	Achtergrond SOA-registratie	161
Bijlage 3	Definities	163
Bijlage 4	Registratiekaart 1999	165
Bijlage 5	Toelichting op het invullen van het registratieformulier niet-curatieve SOA-bestrijding, versie 1995	167

Samenvatting


Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) en SOA-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek. De registratie omvat alleen gegevens van geregistreerde bezoekers van een SOA-spreekuur waarbij daadwerkelijk een SOA-onderzoek of HIV-test werd uitgevoerd.

In 1999 registreerden 39 GGD's in totaal 11.586 consulten (stijging van 15% t.o.v. 1998), waarvan 50% bij mannen en 50% bij vrouwen. Van deze consulten werd bij 57% een SOA-onderzoek uitgevoerd, bij 25% een HIV-test en bij 18% beide. In vergelijking met 1998 is het aantal testen voor SOA alleen met 18% toegenomen, voor HIV alleen gelijk gebleven en voor zowel SOA als HIV met 27% toegenomen. Ruim driekwart van de bezoekers was afkomstig uit Nederland. Van de mannen rapporteerde 75% heteroseksueel en 20% homo- en biseksueel contact, 10% was prostituant. Van de vrouwen werkte 21% als prostituee. De meeste consulten voor SOA vonden plaats vanwege eigen risicogedrag en klachten. Bij consulten voor HIV-testverzoeken bleken eigen risicogedrag, aanvang van een nieuwe relatie en het risicogedrag van de partner de meest voorkomende redenen te zijn. De meeste bezoekers waren tussen de 20 en 29 jaar. Voor vrouwen lag de piek bij 20-24 jarigen en bij mannen bij 25-29 jarigen. Drugs (incl. softdrugs) werden door 12% van de bezoekers gebruikt. Van deze druggebruikers zei 2,3% de drugs intraveneus te gebruiken. Bij 17% van de bezoekers was al eerder een SOA gediagnosticeerd.

Het aantal personen bij wie een diagnose SOA werd gesteld steeg in 1999 met 3% tot 2.934; voor vrouwen 0%, voor mannen 6%. Bij 31% van de bezoekers waarbij SOA-onderzoek is gedaan, werd een SOA geconstateerd (1998: 37%). De meest voorkomende SOA was chlamydia; bij mannen gevolgd door genitale wratten en gonorroe en bij vrouwen gevolgd door bacteriële vaginose, candidiasis en genitale wratten. Gonorroe bij mannen steeg met 18%; bij vrouwen daalde het aantal met 12%. Bij homo-en biseksuele mannen bedroeg de stijging 20%, bij heteroseksuele mannen 14%. Het aantal gevallen van syfilis daarentegen daalde met 21%, voornamelijk door een daling bij mannen (34%). Het aantal HIV-testverzoeken steeg met 10% tot 5.027 consulten waarbij 0,9% positief bleek te zijn. Bij de homoseksuele mannen steeg het aantal HIV-testen met 16%, bij biseksuele mannen met 35% en bij heteroseksuele mannen 12%. In de groep HIV-positieven waren de homo- en biseksuele mannen, net als in 1998, het meest vertegenwoordigd.

1. Inleiding

Uit Figuur 1 blijkt dat het aantal consulten in 1999 gestegen is ten opzichte van voorafgaande jaren. De daling van het aantal GGD's in de afgelopen 2 jaar is veroorzaakt door een aantal fusies van GGD's. Voor de jaren 1990 tot en met 1996 waren van de GG&GD Amsterdam alleen de consulten met een positieve uitslag voor gonorroe, chlamydia en syfilis beschikbaar. Om de jaren met elkaar te kunnen vergelijken is in deze figuur gebruik gemaakt van diezelfde gegevens. In 1999 is het aantal consulten (incl. Amsterdam) gestegen tot 13.998 (1998:12.319 met 13,6%) en het aantal SOA-diagnoses tot 5385 (1998: 5002 met 7,7%)



Figuur 1. Totaal aantal consulten, aantal gediagnosticeerde SOA en het aantal participerende GGD's (met meer dan 10 consulten per jaar). SOA-registratie, 1990-1999

Verzamelen gegevens

De gegevens ten behoeve van de rapportage van de SOA-registratie zijn op verschillende manieren aangeleverd. Van enkele GGD's komen de ingevulde registratiekaarten in de loop van het jaar binnen via de Stichting soa-bestrijding. Deze worden half jaarlijks, per kwartaal of maandelijks opgestuurd; de meeste kaarten komen echter na afloop van het kalenderjaar binnen. Het RIVM voert de kaarten in en controleert de bestanden op fouten of inconsistenties en corrigeert de gegevens daarbij aan de verschillende versies van registratiekaarten die nog steeds worden gebruikt. Van een aantal GGD's worden de gegevens

op diskette ontvangen. Na aanpassing van de verschillende invoermethoden worden de gegevens gekoppeld en geanalyseerd.

GG&GD Amsterdam

Aangezien de gegevens van de GG&GD Amsterdam afwijken van het overige bestand van de SOA-registratie is besloten om deze gegevens niet meer op te nemen in deze rapportage. De gegevens van Amsterdam zijn te vinden in het jaarverslag 1999 van de GG&GD Amsterdam.¹ Bij de trendgegevens tot en met 1999 is wél gebruik gemaakt van de gegevens van Amsterdam, zodat de gegevens onderling vergelijkbaar blijven. Dit betreft, net zoals in voorgaande jaren, alleen de positieve uitslagen van chlamydia, gonorroe en syfilis.

Indeling jaarrapportage

Dit jaarverslag bestaat uit vier onderdelen: de jaarrapportage 1999, de nationale tabellen 1999 (deel A), trendoverzichten 1993-1999 (deel B) en de tabellen van 1999 voor 13 GGD's apart (deel C). De gegevens hebben betrekking op zowel het totaal aantal consulten bij GGD's of SOA-poliklinieken als het totaal aantal gediagnosticeerde SOA. Hierbij wordt ingegaan op:

- ten aanzien van de consulten: geografische verspreiding (participatie van GGD), seizoensinvloeden, reden voor consultatie, demografie van bezoekers, relevante determinanten (risicofactoren).
- ten aanzien van gestelde diagnoses: welke SOA, enkele of multiple infecties, demografie van patiënten, SOA in anamnese, SOA naar risicofactoren.
- trends van SOA uit deze registratie over de periode 1993-1999.

Presentatie gegevens van afzonderlijke GGD's


De gegevens voor afzonderlijke GGD's worden gepresenteerd in de tabellen in deel C, indien de betreffende GGD in 1999 minstens 300 registratiekaarten heeft opgestuurd. Dit houdt in dat voor 13 GGD's de cijfers apart worden gegeven. Tezamen hebben zij in 1999 79% van het totaal aantal registratiekaarten ingestuurd. Deze tabellen worden niet besproken en geïnterpreteerd.

¹ GG&GD Amsterdam. Dienst geslachtsziektenbestrijding, Jaarverslag 1999. Amsterdam, geslachtsziektenbestrijding, 2000.

2. Consulten en kenmerken bezoekers

2.1 Totaal aantal consulten voor SOA-hulpvraag en HIV-testverzoek

In 1999 zijn voor de SOA-registratie 11.586 nieuwe consulten ten behoeve van een SOA-hulpvraag en HIV-testverzoek geregistreerd, dit is een stijging van 14,5% ten opzichte van 1998 (n=10.123). Bij 57% van de geregistreerde consulten werd alleen een SOA-onderzoek gedaan (1998: 55%), bij 25% alleen een HIV-test (1998: 28%) en bij 18% zowel een SOA-onderzoek als een HIV-test (1998: 17%); zie ook Tabel 1 en Figuur 2. Bij vrouwen vonden 5.813 consulten plaats (stijging t.o.v. 1998: 13%); bij mannen vonden 5.715 consulten plaats (stijging t.o.v. 1998: 16%) (Tabel 2).




Figuur 2. Aandeel consulten ten behoeve van SOA-hulpvraag, HIV-testverzoek of beide, SOA-registratie 1999

2.2 Aandeel van GGD's en SOA-poliklinieken

Het aantal GGD's met meer dan 10 geregistreerde consulten is 39, dit is zes minder dan in 1998. Deze daling is vooral te wijten aan een aantal fusies van GGD's. In 1999 was 76% van de consulten afkomstig van 12 GGD's: 30% van drie GGD's in de grote steden, te weten Utrecht (12%), Rotterdam (11%) en Nijmegen (7%). Nog eens 46% van de geregistreerde consulten zijn afkomstig van negen GGD's: GGD Hart voor Brabant (6%), GGD Arnhem (6%), GGD Oostelijk Zuid Limburg (6%), GGD Twente (5%), GGD Den Haag (5%), GGD Groningen (5%), GGD Noord Kennemerland (4%), GGD Zuidelijk Zuid Limburg (4%) en GGD West-Brabant (4%). Een aantal GGD's heeft geen kaarten ingestuurd vanwege een tekort aan personeel of omdat ze geen registratie bijhouden.

2.3 Seizoensfluctuatie

De verspreiding over het jaar 1999 laat zien dat het aantal consulten in de maand november het grootst was (9,3%), maar dat er verder weinig seizoensfluctuatie was. Bij het aantal consulten ten behoeve van een SOA-hulpvraag was geen duidelijke piek waar te nemen. Wel waren er in december duidelijk minder consulten ten behoeve van een SOA-hulpvraag (6,3%). Consulten ten behoeve van een HIV-testverzoek vertoonden een piek in de maand januari (11,4%), terwijl consulten voor zowel SOA als HIV een kleine piek in de maanden november en december vertoonden (10,7% en 10,2%)(Tabel 3; Figuur 3). Deze seizoenspatronen zijn veel gelijkmatiger dan de patronen in 1998. Toen was er in de maanden juni tot en met november een piek in het aantal consulten, met name in het aantal SOA-hulpvragen. Het aantal HIV-testverzoeken vertoonde een piek in de maanden januari tot en met maart.




Figuur 3. Aantal consulten naar maand en soort onderzoek (SOA-hulpvraag, HIV-testverzoek of beide), SOA-registratie 1999

2.4 Reden voor bezoek

Net als in 1998 betrof de reden voor bezoek in de meeste gevallen een SOA-hulpvraag, (45%), en in iets mindere mate een HIV-testverzoek (29%) of beide (25%), van 1% van de bezoekers was de reden van bezoek onbekend (Tabel 4a). Het eigen risicogedrag (33,8%; 1998: 30,2%) was de meest voorkomende reden om de GGD te consulteren vanwege SOA-onderzoek, gevolgd door het hebben van klachten (29,7%; 1998: 35,1%) en het beginnen van een nieuwe relatie (9,3%; 1998: 9,5%). Slechts een minderheid van de consulten voor SOA bleek gewaarschuwd te zijn door de eigen partner (3,4%) of door een sociaal verpleegkundige (0,4%) (Tabel 4b; Figuur 4).

In geval van een HIV-testverzoek bleek het eigen risicogedrag (42,2%; 1998: 45,4%) de voornaamste reden te zijn, gevolgd door het beginnen van een nieuwe relatie (22,2%; 1998: 25,3%) en het risicogedrag van de partner (13,8%; 1998: 8,3%). Partnerwaarschuwing speelt nauwelijks een rol bij HIV-testverzoek (0,5%).



Figuur 4. Reden voor SOA-onderzoek en HIV-testverzoek, SOA-registratie 1999

2.5 Reden van bezoek in relatie tot onderzoek en uitslag

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de reden voor bezoek en het uiteindelijke uitgevoerde onderzoek en de uitslag daarvan. Personen kunnen voor een SOA-hulpvraag de GGD bezoeken en na consultatie zich behalve op SOA ook op HIV-infectie laten onderzoeken of met een HIV-testverzoek binnenkomen en zich uiteindelijk ook op SOA laten onderzoeken of alleen op SOA of alleen op HIV. In Tabel 4c staan alle mogelijke combinaties gepresenteerd met de testuitslag.

In vergelijking met 1998 is het aantal uitgevoerde testen op SOA en HIV met 15% gestegen: voor SOA alleen met 18% en voor SOA en HIV met 27%; het aantal solitaire HIV-testen is stabiel gebleven.

Van de 5.193 consulten vanwege een initiële SOA-hulpvraag alleen werd slechts in 17 gevallen (0,3%) geen SOA-onderzoek uitgevoerd, in plaats daarvan werd wel een HIV-test uitgevoerd. In 34,0% (1768/5193) van de consulten ten behoeve van SOA werd daadwerkelijk een SOA gediagnosticeerd (1998: 38,1%). Bij 44 personen (0,85%) werd behalve SOA-onderzoek ook een HIV-test uitgevoerd; bij 4 personen was de uitslag HIV seropositief.

Van de 2.892 consulten ten behoeve van zowel SOA-onderzoek als HIV-testverzoek werd bij 2,2% (63/2892) uiteindelijk geen SOA-onderzoek gedaan; bij 14,6% (413/2829) werd daadwerkelijk een SOA gediagnosticeerd. Bij 27,5% (795/2892) werd uiteindelijk geen HIV-test gedaan maar alleen een SOA-onderzoek; bij 25% daarvan werd een SOA geconstateerd. Bij 72,5% (2097/2892) werd een HIV-test gedaan, bij 0,95% (20/2097) een positieve uitslag.

In geval van consultatie vanwege een HIV-testverzoek werd in 16,6% (560/3383) van de gevallen uiteindelijk toch geen HIV-test uitgevoerd (1998: 11,0%) maar wel een SOA-onderzoek (bij 83% werd een SOA gevonden). Bij 82,0% (2775/3383) werd alleen een HIV-test uitgevoerd (0,7% met positieve uitslag). Bij 1,4% (48/3383) werd zowel een HIV-test als een SOA-onderzoek uitgevoerd, 1 persoon was HIV-positief en 3 personen hadden een SOA.

Van de 118 bezoekers waarvan de reden van bezoek onbekend was, werd bij niemand een HIV-infectie gevonden.

Indien we uitgaan van het uitgevoerde onderzoek (alleen HIV, alleen SOA, HIV en SOA), dan blijkt dat bij 0,9% (46/5027) van de HIV-testen de uitslag positief was (1998: 0,8%) en dat bij 30,9% (2685/8695) van de SOA-onderzoeken een (of meerdere) SOA werden vastgesteld (1998: 35,6%).

2.6 Epidemiologische kenmerken van bezoekers

Leeftijd, geslacht, land van herkomst

De piek van de leeftijdsverdeling van mannelijke bezoekers viel evenals in 1998 in de categorie 25-29 jaar, gevolgd door de categorieën 20-24 jaar en 30-34 jaar. De vrouwelijke bezoekers waren evenals in 1998 iets jonger met een piek in de categorie 20-24 jaar, gevolgd door 25-29 jaar (Tabel 5).

Van de 11.586 bezoekers was 50% vrouw en 50% man. Ongeveer 79% van de bezoekers was van Nederlandse afkomst (1998: 80%), 4,5% was afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba (1998: 5,8%), en 13% uit andere landen (zoals rest Europa, Amerika, Afrika, Azië enz.). Van 3,2% van de bezoekers was het land van herkomst onbekend. Het absolute aantal Nederlandse bezoekers steeg met 14,4% van 8.051 in 1998 tot 9.208 in 1999. Het aantal Nederlandse vrouwen steeg met 8,1%, het aantal Nederlandse mannen steeg met 19,7%. Het aantal consulten van personen met een buitenlandse herkomst steeg met 18,9% van 1.690 in 1998 naar 2.009 in 1999. Evenals in 1998 bleken in 1999 meer mannen dan vrouwen afkomstig te zijn uit de in ons land meest voorkomende etnische groepen (Turkije, Marokko, Suriname, Antillen en Aruba). Bij vrouwen bleek het aandeel afkomstig uit andere landen groter te zijn dan bij de mannen (Tabel 6).

Risicofactoren

In 20% van de consulten bij mannen betrof het homo- en biseksuele mannen (1998: 18%). Het aantal consulten voor HIV-testverzoeken was bij 16% afkomstig van homo- en biseksuele mannen (Tabel 7). In vergelijking met 1998 is het totaal aantal consulten van homo- en biseksuele mannen met 30% en dat van heteroseksuele mannen met 13% gestegen. Voor homoseksuele mannen (respectievelijk biseksuele mannen, heteroseksuele mannen) is het aantal uitgevoerde HIV-testen met 16% (resp. 35%, 12%) gestegen; het aantal consulten waarbij SOA-onderzoek werd uitgevoerd is respectievelijk met 45%, 39% en 19% gestegen. Van de mannen die de GGD consulteerden rapporteerde 9,8% contact met een prostituee te hebben gehad in de zes maanden voorafgaand aan het consult (1998: 11%); bij consulten vanwege SOA was dit 11%, vanwege HIV 8,5% en vanwege SOA en HIV 7,3%. Van de vrouwen die de GGD consulteerden rapporteerde 21% werkzaam te zijn (geweest) in de prostitutie in de afgelopen zes maanden (1998: 20%); bij consulten vanwege SOA was dit 28%, vanwege HIV 3,4% en vanwege SOA en HIV 18,3%. Opvallend is het relatief grote aantal consulten (12,9% mannen en 8,3% vrouwen), waarbij het onbekend was of er sprake was van contacten in de prostitutie (Tabel 8a en b). Van de bezoekers rapporteerde 12,1% druggebruik (incl. softdrugs) in de zes maanden voorafgaand aan het consult (1998: 5,7%). Van deze druggebruikers zei 2,3% de drugs intraveneus te gebruiken (1998: 2,6%). Het percentage 'onbekend' is drastisch gedaald van 94,3% in 1998 tot 18,7% in 1999 (Tabel 9). Bij 16,5% van de bezoekers werd al eerder een SOA gediagnosticeerd (1998: 16,5%); 69% had nooit eerder een SOA gehad en bij 14% is de informatie over een voorgeschiedenis van

SOA onbekend (Tabel 10). Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het percentage 'onbekend' is relatief groot (14%), in 1998 was dit 15%.

3. SOA-diagnoses en achtergrondkenmerken

3.1 Aantal vastgestelde infecties

Bij de 11.586 consulten zijn 2.934 infecties (SOA inclusief HIV) geconstateerd hetgeen in vergelijking met 1998 (n=2.844) een stijging van 3,2% betekent. Het aantal infecties bij vrouwen steeg met 0,1% van 1.578 in 1998 tot 1.580 in 1999; dat bij mannen met 6,2% van 1.266 tot 1.344.

Door de 13 GGD's die apart worden vermeld, zijn 2.505 infecties (85% van het totaal) vastgesteld: Rotterdam (28,6%), Den Haag (11,7%), Arnhem (8,7%), Nijmegen (8,5%), Groningen (7,3%), Utrecht (7,0%), Hart voor Brabant (6,2%), Twente (5,4%), Noord Kennemerland (4,4%), Zuidelijk Zuid Limburg (4,1%), West-Brabant (3,1%), Oostelijk Zuid Limburg (2,8%) en Zuid Kennemerland (2,2%).

In dit hoofdstuk zijn de gegevens over SOA als percentage van het aantal gestelde diagnoses weergegeven. Vergelijking met het aantal consulten is niet mogelijk doordat het onduidelijk is of alle participerende GGD's ook negatieve uitslagen registreren en insturen.

Van de bezoekers met een vastgestelde infecties was 46% man en 54% vrouw. De leeftijdsverdeling bij mannen en vrouwen met een vastgestelde infectie was ongeveer gelijk aan de verdeling bij het totaal aantal mannen en vrouwen in de registratie (zie Tabel 13a en 13b). Bij de mannen met een gediagnosticeerde infectie was bijna 74% afkomstig uit Nederland terwijl 83% van het totaal aantal mannelijke bezoekers afkomstig was uit Nederland (bij vrouwen resp. 70% en 75%). Naast de bezoekers van Nederlandse afkomst was zowel bij de mannen als bij de vrouwen de grootste groep met een vastgestelde infectie afkomstig uit de categorie 'overig' (9% resp. 20%).

Bij mannen met een vastgestelde infectie was 74% heteroseksueel, 22% homo- of biseksueel en bij 3% was de seksuele gerichtheid onbekend. Van de mannen met een gediagnosticeerde SOA rapporteerde 9% prostitutie-bezoek (vergelijk: 10% van de mannelijke bezoekers). Van de mannen met een SOA gaf 0,2% aan zelf als prostitué werkzaam te zijn, 76% gaf aan geen relatie te hebben met de prostitutie en bij 15% was deze relatie onbekend. Bij de vrouwen met een vastgestelde infectie gaf 22% aan als prostituee gewerkt te hebben, hetgeen procentueel overeenkomt met het totaal van prostitutie onder de vrouwelijke bezoekers (21%), 68% had geen relatie met de prostitutie en van 10% was deze relatie onbekend. Van alle personen met een infectie was 23% druggebruiker (incl. softdrugs). Van deze druggebruikers, was 2,2% intraveneus druggebruiker.

3.2 Aandeel van verschillende SOA

In de SOA-registratie bleek een infectie met *Chlamydia trachomatis* (hierna te noemen: chlamydia) de meest voorkomende SOA in 1999 bij zowel mannen als vrouwen te zijn (Tabel 11): van alle gestelde SOA/HIV diagnoses betrof dit 22% (1998: 24%) van de mannen en 25% (1998: 26%) van de vrouwen (Tabel 11a). Het aantal chlamydia infecties was gedaald met 4% van 714 in 1998 tot 688 in 1999. De diagnose gonorroe werd 225 keer gesteld, 172 keer voor mannen en 53 keer voor vrouwen. In de SOA-registratie kwamen consulten met betrekking tot de diagnose chlamydia gemiddeld 3,1 maal zo vaak voor als consulten voor gonorroe (1998: 3,5); voor vrouwen 7,4 en voor mannen 1,7. De diagnose chlamydia werd ongeveer even vaak bij mannen als vrouwen gevonden in tegenstelling tot gonorroe. De man : vrouw ratio voor chlamydia was 0,74 en voor gonorroe 3,25.

Bij 13% van de mannen met een SOA werd gonorroe gevonden; 16% van de mannen had genitale wratten, 6,9% niet-specifieke urethritis, 4,6% herpes genitalis en 4,6% syfilis (alle vormen tezamen). Bij de vrouwen met SOA lag deze verdeling anders: 18,4% had bacteriële vaginose, 12,2% candidiasis, gevolgd door genitale wratten (10,3%), herpes genitalis (4,0%) en syfilis (3,9% voor alle vormen tezamen) (Tabel 11a; Figuur 5).


De lokalisatie van gonorroe was in 54% van de gevallen urethraal/cervicaal en voor 40% onbekend. Onder de mannen waren er 7 (4,1%) met een anale/rectale gonorroe infectie. De lokalisatie van chlamydia was in 76% van de gevallen urethraal/cervicaal en voor 23% onbekend. Ook hier hadden 7 mannen (2,4%) een anale/rectale infectie (Tabel 11b en 11c).

In geval van een vastgestelde SOA-diagnose bleek het bij 90% van de infecties om een enkele infectie te gaan; bij 9% werden twee infecties tegelijkertijd vastgesteld. Bij vrouwen kwamen relatief vaker tweevoudige infecties voor dan bij de mannen (10,2% versus 7,2%) (Tabel 12).

In Tabel 13a en 13b staat de leeftijdsverdeling per diagnose weergegeven, voor mannen en vrouwen apart. Het aandeel van 20-24 jarige vrouwen was voor de meeste SOA relatief groot, behalve voor syfilis en HIV-infecties. Bij de mannen was het aandeel van de categorie 25-29 jarigen relatief groot, behalve voor syfilis HIV-infecties. In Tabel 14 staat het land van herkomst per diagnose weergegeven, voor mannen en vrouwen apart. Het aandeel van Nederlanders onder de patiënten met syfilis is relatief laag, maar gezien de kleine aantallen is hier weinig over te zeggen.

In de Tabellen 15 t/m 19 worden de diagnoses uitgesplitst naar seksuele gerichtheid voor mannen (Tabel 15), prostitutie voor mannen en vrouwen (Tabel 16a en 16b), naar druggebruik (Tabel 17) en naar SOA in de anamnese voor mannen en vrouwen (Tabel 18a, 18b en 18c). Tot slot wordt in Tabel 19 een overzicht gegeven van het aantal HIV-test verzoeken met uitslag naar risicogroep voor mannen en vrouwen apart.

Hieronder worden de belangrijkste resultaten voor chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV-infectie en de virale SOA (herpes genitalis en genitale wratten) gepresenteerd; candidiasis en bacteriële vaginose worden hier niet besproken.



Figuur 5. Aandeel van verschillende SOA (=100%) voor vrouwen met een SOA en mannen met SOA, SOA-registratie 1999


3.3 Infecties met *Chlamydia trachomatis*

In 1999 is de diagnose chlamydia 688 keer gesteld, hetgeen een daling van 4% in vergelijking met 1998 betekent (1998: 714). Bij 393 vrouwen werd de diagnose chlamydia gesteld, hetgeen een daling van 4,1% ten opzichte van 1998 betekent. De piek bij de vrouwen met chlamydia betrof de leeftijdscategorie 20-24 jaar. In 1999 presenteerde 28% van de vrouwen met chlamydia zich vanwege klachten, 11% vanwege waarschuwing door partner en 24% vanwege eigen risicogedrag (Figuur 6). In 1998 presenteerden meer vrouwen zich vanwege klachten (35%) en minder vanwege waarschuwing door partner (10%). Terwijl een vergelijking met 1997 liet zien dat er toen ongeveer evenveel vrouwen met een bewezen infectie met chlamydia een GGD vanwege klachten bezochten (27%).

Bij 292 mannen werd chlamydia vastgesteld (1998: 304). De man:vrouw ratio is 0,74. De piek in de leeftijdsverdeling bij mannen werd gevonden in de categorie 25-29 jaar. In 1999 presenteerde 37% van de mannen met chlamydia zich vanwege klachten, 9% vanwege waarschuwing door partner en 33% vanwege eigen risicogedrag (Figuur 6). In 1998 presenteerde meer mannen zich vanwege klachten (bijna 50%) en minder vanwege eigen risico gedrag (24%).

Van de mannen met chlamydia was 75% van Nederlandse afkomst (1998: 71%), van de vrouwen 73% (1998: 71%). Opvallend was het hoge percentage mannen met chlamydia dat afkomstig was uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba (10,3%).

Van de mannen met chlamydia gaf 15,8% aan homo- en biseksuele contacten te hebben en 81,2% had heteroseksuele contacten (vergelijk met gonorroe: 42,4% en 52,9%). Van alle heteroseksuele mannen met een SOA bleek 23,8% chlamydia te hebben (1997: 37,7%, 1998: 26,9%), van alle homo- en biseksuele mannen met SOA was dit 15,1% (1997: 24,3%, 1998: 14,9%). Van de mannen met chlamydia bleek 5,1% prostituant (voor gonorroe: 13,4%); van de vrouwen met chlamydia bleek 17,6% werkzaam te zijn in de prostitutie (voor gonorroe: 18,9%). Van de patiënten met chlamydia bleek 19,6% al eerder een SOA te hebben gehad (1998: 21,2%): eerder chlamydia (mannen 7,7%, vrouwen 9,2%), eerder gonorroe (mannen 5,1%; vrouwen 0,7%), of eerder een andere SOA (mannen 22,3%; vrouwen 18,7%).



Figuur 6. Reden van bezoek voor patiënten met chlamydia, gonorroe of syfilis naar geslacht (meer redenen per persoon mogelijk), SOA-registratie, 1999

3.4 Gonorroe

In totaal werd de diagnose gonorroe 216 keer gesteld, dat is een stijging van 11% (1998: 195). Bij 51 vrouwen werd de diagnose gonorroe (excl. Penicillinase Vormende Gonokokken (PVG)) gesteld, hetgeen minder is dan in 1998 (n=58). De piek bij de vrouwen met gonorroe was te zien in de leeftijdscategorie 20-24 jaar. Ongeveer 33% van de vrouwen met gonorroe presenteerde zich vanwege klachten, 6% vanwege waarschuwing door de partner, 9% wegens periodieke controle en 24% vanwege eigen risicogedrag (Figuur 6). Dit laatste percentage is toegenomen ten opzichte van 1998 (17,5%).

Bij 165 mannen werd gonorroe (excl. PVG) vastgesteld, hetgeen een stijging van 20% betekent (1998: 137). De stijging was bij homoseksuele mannen groter dan bij heteroseksuele mannen (20% versus 14%). De man:vrouw ratio is 3,2. De piek in de leeftijdsverdeling bij mannen werd gevonden in de categorie 25-29 jaar. Ongeveer 50% van de mannen met gonorroe presenteerde zich vanwege klachten, 6% vanwege waarschuwing door de partner en 31% vanwege eigen risicogedrag (Figuur 6). In vergelijking met 1998 was in het percentage vanwege klachten een daling en in het percentage vanwege eigen risicogedrag een stijging te zien (1998: 70% en 21%, respectievelijk).

Voor mannen met gonorroe bleek dat 76% (1998: 63%) van Nederlandse afkomst was, voor de vrouwen was dit 60% (1998: 70%). De verdeling van het land van herkomst van mannen met een vastgestelde gonorroe kwam overeen met de verdeling bij alle mannen met een vastgestelde SOA. Van de mannelijke gonorroe-patiënten bleek 42,4% homo- of biseksueel te zijn en 52,9% heteroseksueel (1998: 41,8% resp. 54,8%). Van alle heteroseksuele mannen met een SOA bleek 9,2% gonorroe te hebben, van alle homo- en biseksuele mannen met SOA was dit 23,9%. Van de mannen met gonorroe bleek 13,4% prostituant (1998: 21,0%); van de vrouwen met gonorroe bleek 18,9% werkzaam te zijn in de prostitutie (1998: 33,3%). Van de gonorroe- patiënten bleek 23,6% al eerder een SOA te hebben gehad: eerder gonorroe (mannen 8,7%; vrouwen 3,2%), eerder chlamydia (mannen 4,3%, vrouwen 9,5%), eerder een andere SOA (mannen 24,1%; vrouwen 20,7%).

Het aantal gevallen van gonorroe veroorzaakt door PVG bedroeg slechts 9, hetgeen een percentage van het totaal aantal vastgestelde gevallen van gonorroe van 4% oplevert (1998: 5%).

3.5 Syfilis

In totaal werd de diagnose 45 keer gesteld, dat is een daling van 21% (1998: n=57). Bij 22 vrouwen werd de diagnose syfilis (lues I, lues II) gesteld, hetgeen evenveel was als in 1998 (1997: n=30). De piek bij de vrouwen met syfilis betrof de leeftijdscategorieën 15-19 jaar, 35-39 jaar en 45-54 jaar. Van de vrouwen met syfilis presenteerde 16% zich vanwege klachten, 3% vanwege waarschuwing door partner, 21% vanwege eigen risicogedrag en 28% vanwege periodieke controle (Figuur 6). In 1998 presenteerden meer vrouwen zich vanwege klachten (32%) en minder vanwege periodieke controle (14%).

Bij 23 mannen werd syfilis (lues I, lues II) vastgesteld (1998: n=35; daling van 34%). De man:vrouw ratio is 1,0. De daling was het sterkst bij de heteroseksuele mannen (55%); bij de homo- en biseksuele mannen was een stijging waarneembaar (33%) maar betrof het een klein aantal (tabel 15). De piek in de leeftijdsverdeling bij mannen werd gevonden in de categorieën 35-39 jaar en >54 jaar (1998: 45-54 jaar). Van de mannen met syfilis presenteerden 45% zich vanwege klachten, 30% vanwege eigen risicogedrag en 4% vanwege

waarschuwing door partner (Figuur 6). In 1998 presenteerde 60% van de mannen met syfilis zich vanwege klachten en 19% vanwege eigen risicogedrag.

Voor mannen met syfilis bleekt dat 61% van Nederlandse afkomst was en 46% van de vrouwen; in 1998 was dit 49% en 46%, respectievelijk. Vrouwen met syfilis bleken relatief vaker afkomstig te zijn uit andere landen dan de in Nederland meest voorkomende etnische groepen (36,4% ten opzichte van 19,7% gemiddeld).

Van de mannen met syfilis bleek 34,7% homo- of biseksueel te zijn en 65,2% heteroseksueel. Ten opzichte van 1998 is het percentage homo- en biseksuele mannen gestegen (1998: 17%). Van alle heteroseksuele mannen met een vastgestelde diagnose bleek 1,5% syfilis te hebben, van alle homo- en biseksuele mannen met SOA was dit 2,6%. Van de mannen met syfilis bleek 21,7% prostituant te zijn (1998: 48,4%); van de vrouwen met syfilis bleek 36,4% werkzaam te zijn in de prostitutie (1998: 50,0%). Van de syfilis-patiënten bleek 28,9% al eerder een SOA te hebben gehad: gonorroe (mannen 21,9%; vrouwen 0%), chlamydia (mannen 0%; vrouwen 0%), andere SOA (mannen 37,6%; vrouwen 24,0%).

3.6 HIV-infecties

Het aantal personen met een positieve uitslag voor de HIV-test is met 20% gestegen tot 46 gevallen; 37 mannen en 9 vrouwen; dit betreft circa 1,6% van het totaal aantal gestelde diagnoses (1998: 1,3%, Tabel 11). In totaal hebben 5.027 personen zich laten onderzoeken op een infectie met HIV hetgeen een toename van 10,4% betekent ten opzichte van 1998. Van de 2.060 op HIV geteste heteroseksuele mannen bleek 0,7% HIV-positief (n=15), van de 498 homo- en biseksuele mannen 3,8% (n=19). Bij vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie was 1,3% HIV-positief (0,3% bij niet-prostitutie). Van de HIV-positieve mannen bleek 51,3% homo- of biseksueel te zijn en 40,5% heteroseksueel, van 8,1% (n=3) van de HIV-positieve mannen is de seksuele gerichtheid onbekend. Om relevante uitspraken te doen is het aantal HIV-positieven te klein ten opzichte van het aantal HIV-testen. (0,9%).

3.7 Virale SOA

Hier zal kort worden ingegaan op de virale SOA in de SOA-registratie, i.e. genitale wratten en herpes genitalis, die in totaal 12,9% respectievelijk 4,3% van alle SOA betreffen. Acute hepatitis B blijft hier buiten beschouwing (slechts 0,6% van alle diagnoses). Bij 62 mannen werd herpes genitalis vastgesteld (1998: 68) en bij 215 mannen genitale wratten (1998: 166). Voor vrouwen waren deze aantallen 63 en 162, respectievelijk (1998: 70 en 169). Bijna 80% van de mannen met een virale SOA was van Nederlandse afkomst. Het aandeel mannen met genitale wratten van Nederlandse afkomst was relatief groot (82%). Van de vrouwen met een virale SOA was 84% afkomstig uit Nederland, hetgeen in vergelijking met het totaal percentage Nederlandse vrouwen met een gediagnosticeerde SOA hoog is (vergelijk: 70%). In

1998 was het percentage vrouwen van Nederlandse afkomst met een virale SOA eveneens hoog (85%).


Van de mannen met genitale wratten bleek 27% homo- of biseksueel te zijn (1998:25%) en 69% heteroseksueel (1998: 73%). Voor herpes genitalis waren deze percentages: 13% en 82% (1998: 12% en 88%, respectievelijk). Van de mannen met een virale SOA bleek 7% prostituant te zijn; bij de vrouwen met herpes genitalis bleek niemand in de prostitutie te werken, bij vrouwen met genitale wratten 13%.

Van de personen met een virale SOA had 68% nog nooit eerder een SOA gehad, circa 20% had wel ooit een SOA gehad.

4. Trendoverzichten SOA 1993-1999

In Figuur 7 is de trend in het aantal gevallen van gonorroe, syfilis en chlamydia en het totaal aantal SOA weergegeven. De getallen zijn terug te vinden in de tabellen in deel B. Om de gegevens van 1999 te vergelijken met voorafgaande jaren zijn ook de positieve uitslagen van gonorroe, chlamydia en syfilis (uit het jaarverslag) van de GG&GD Amsterdam in de figuur opgenomen.

Uit de figuur blijkt dat het percentage chlamydia en het totale aantal SOA in 1999 is gestegen, eigenlijk continue vanaf 1994, terwijl gonorroe en syfilis ongeveer gelijk zijn gebleven ten opzichte van 1994. Hoewel in 1995 alle trends opwaarts waren heeft dit zich alleen voortgezet voor chlamydia, syfilis en het totaal aantal infecties. Het aantal gevallen van syfilis is echter weer gedaald in 1997 en is daarna redelijk stabiel gebleven. Voor HIV-infecties werd in 1995 en 1996 een toename van gezien van 41%, maar het aantal daalde in 1997 en 1998. In 1999 is het aantal HIV-infecties weer gestegen (Tabel 20, niet in figuur).



Figuur 7. Trend in het aantal gevallen van SOA, als percentage van het aantal gevallen in 1991 (geïndexeerd op 100%; n=aantal in 1991, SOA-registratie 1991/1999, alleen voor gonorroe, chlamydia en syfilis zijn de gegevens van de GG&GD Amsterdam in de figuur opgenomen).

Nadat het aantal gevallen van gonorroe van 1993 tot 1998 geleidelijk is gedaald, is er in 1999 weer een toename te zien. Een onderverdeling naar mannen en vrouwen laat zien dat de stijging in 1999 grotendeels is toe te schrijven aan een stijging in het aantal mannen, en dan vooral de homo- en biseksuele mannen. Dit is heel duidelijk beschreven in het jaarverslag van de Amsterdamse SOA-polikliniek. In de rest van het land zijn er, op basis van dit jaarverslag, aanwijzingen voor dezelfde trend.

Het aantal gevallen van syfilis is gedaald tot 1994 en is na een korte verheffing in 1995-96 weer enigszins gestabiliseerd in de laatste jaren. Een onderverdeling naar seksuele voorkeur voor mannen en prostitutie voor vrouwen laat zien dat de stijging in 1995-1996 grotendeels is toe te schrijven aan prostitutie. De recente stijging van het aantal syfilisgevallen in Amsterdam, en dan vooral bij homo- en biseksuele mannen, wordt niet gevonden in de rest van het land. Wel is in 1999 een toename in het aandeel van homoseksuele mannen te zien.

Het aantal gevallen van infecties met *Chlamydia trachomatis* laat vanaf 1994 een stijgende trend zien. Vooral in de jaren 1995 en 1996 is het aantal infecties flink toegenomen. Vanaf 1997 is de stijging in het aantal infecties minder sterk. Veranderingen in de diagnostiek, het veelal asymptomatisch beloop van de infectie en het prevalent karakter van de ziekte bemoeilijken een interpretatie van deze trend. De stijging in recente jaren zal dientengevolge een weerspiegeling zijn van o.a. de implementatie van zeer gevoelige amplificatie-technieken, een toegenomen beschikbaarheid van diagnostiek en een verhoogde alertheid op chlamydia. De infectie kwam iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Het overgrote deel van de infecties werd bij heteroseksuele mannen en vrouwen (niet werkzaam in prostitutie) gevonden.

Het totaal aantal gediagnosticeerde infecties is tot 1996 flink gestegen. In 1997 leek het percentage te dalen, maar de daling heeft zich in 1998 en 1999 niet voortgezet. De stijging van het totaal in 1998 en 1999 werd vooral veroorzaakt door een stijging van chlamydia, bacteriële vaginose en een aantal SOA in de categorie 'overig'.

5. Beschouwing

In 1999 is het totaal aantal consulten met 15% gestegen ten opzichte van 1998. Het totaal aantal personen bij wie een SOA diagnose werd gesteld is met 3% gestegen en was grotendeels te wijten aan een toename bij mannen.

GGD's/kwaliteit van de registratie

Het aantal participerende GGD's is afgenomen door een aantal fusies op GGD-niveau. Door enkele GGD's zijn aanzienlijk minder consulten geregistreerd in vergelijking met voorafgaande jaren; hierbij speelden problemen als interne reorganisatie en een tekort aan personeel een belangrijke rol. De registratiekaart dient te worden ingevuld indien daadwerkelijk onderzoek verricht wordt en een gesprek met de SV plaatsvindt. Voor HIV-testverzoeken is dit duidelijk vastgelegd omdat toestemming van de patiënt nodig is alvorens de HIV-test te doen. Voor SOA is dit minder duidelijk en zal de registratie behalve van de beschikbaarheid van de sociaal verpleegkundige (of arts) ook afhangen van het beleid met betrekking tot de SOA-bestrijding. Het verwijsbeleid ten aanzien van een HIV-testverzoek op landelijk niveau is waarschijnlijk het meest consistent omdat er altijd een pre-test gesprek zal plaatsvinden waarin ook een 'informed consent' van de patient wordt gevraagd. Ook voor de bacteriële SOA is het verwijsbeleid op landelijk niveau waarschijnlijk consistent en vergelijkbaar (en traditioneel bepaald door activiteiten in het kader van de bron- en contactopsporing). Het verwijsbeleid ten aanzien van de virale SOA is niet eenduidig; in sommige GGD's zullen geen consulten met de SV plaatsvinden als herpes genitalis of genitale wratten zijn gediagnosticeerd. In sommige gevallen is de SV al geconsulteerd voordat de diagnose bekend was of zijn deze infecties als co-infecties bij een bacteriële SOA gevonden en geregistreerd. Voor de surveillance van SOA is het echter van groot belang dat het registratieprotocol eenduidig is en dat uniformiteit in en de kwaliteit van de gegevensverzameling wordt verbeterd.

Consulten/onderzoek

Meer dan de helft van het aantal consulten vond plaats ten behoeve van een SOA-hulpvraag (zonder HIV-consult), waarvan de meesten plaatsvonden vanwege eigen risicogedrag en klachten. De reden voor een HIV-testverzoek was in iets minder dan de helft van de gevallen 'eigen risicogedrag'. Bij het merendeel van de consulten werd ook het onderzoek uitgevoerd waarvoor men consulteerde. Overigens wordt maar bij 1,2% van de bezoekers met een SOA-hulpvraag ook een HIV-test uitgevoerd. Omgekeerd bleek dat bij 1,4% van de HIV-testverzoeken ook onderzoek naar SOA werd gedaan en bij 16,6% bleek dat alleen onderzoek naar SOA werd gedaan zonder HIV-test. Het aantal onderzoeken voor SOA is met 18% gestegen en dat voor zowel HIV als SOA met 27%; voor zowel SOA als HIV was deze toename het grootst bij de homo- en biseksuele mannen. Deze toename kan mogelijk worden

verklaard door een actiever HIV-test beleid. Echter, in 28% van de consulten voor SOA en HIV werd geen HIV-test uitgevoerd, bij consulten voor een HIV-testverzoek was dat 17%; deze beide percentages zijn hoger dan het vorige jaar (resp. 17% en 11%). Deze (en alle andere hier gepresenteerde) percentages moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat niet alle GGD's de registratiekaarten met een negatieve SOA-uitslag insturen (en sommige GGD's ook niet alle positieve SOA-uitslagen) en er dientengevolge een vertekening optreedt. Voor negatieve HIV-uitslagen wordt doorgaans wel altijd een registratiekaart ingevuld.

SOA/risicogroepen

Bij 31% van de bezoekers werd een SOA diagnose gesteld, in 1998 bij 36%. Chlamydia is, ondanks de lichte daling, de meest voorkomende SOA in de registratie. Hierbij zijn nauwelijks verschillen te vinden tussen mannen en vrouwen. Gonorroe bij mannen steeg met 18%; bij vrouwen daalde het aantal met 12%. Bij homo- en biseksuele mannen bedroeg de stijging 20%, bij heteroseksuele mannen 14%. Het aantal gevallen van syfilis daarentegen daalde met 21%, voornamelijk door een daling bij mannen (34%); wel was er een toename in het aandeel van homoseksuele mannen met syfilis. Het percentage HIV positieven bedroeg 0,9% van het aantal getestte personen; het aantal HIV positieven is met 21% gestegen ten opzichte van 1998. In de groep HIV-positieven waren de homo- en biseksuele mannen, net als in 1998, het meest vertegenwoordigd. De opvallendste stijging werd gevonden bij de heteroseksuele mannen.

In het jaarverslag geslachtsziektenbestrijding van de GG&GD Amsterdam over 1999 werd een toename geconstateerd van het aantal bezoekers (9%) en SOA-diagnoses, met name gonorroe (stijging van 46%) en vroege syfilis (stijging van 120%). De stijging is in alle bevolkingsgroepen te vinden maar kan vooral worden toegeschreven aan een stijging van het aantal SOA bij homoseksuele mannen. Gonorroe is fors toegenomen bij de homoseksuele mannen (59%) en de vrouwen (66%) en in mindere mate bij de heteroseksuele mannen (16%); voor vroege syfilis zijn deze getallen: 333%, 38% en 54% respectievelijk. De stijging heeft zich doorgezet in 2000. Deze toename is verontrustend vanwege de mogelijke terugval in onveilig seksueel gedrag en consequenties voor HIV-transmissie.

De aanwijzingen om deze trend landelijk te bevestigen op basis van gegevens uit de SOA-registratie zijn enigszins tegenstrijdig: zowel het aantal consulten als het aantal SOA-diagnoses is gestegen maar de stijging is wel bij gonorroe maar niet bij syfilis te vinden. Het is opvallend dat het aandeel van homoseksuele mannen binnen de SOA/HIV-patienten is toegenomen ten opzichte van voorafgaande jaren. Ook is het aantal HIV-positieven toegenomen, hetgeen waarschijnlijk deels te verklaren is door een actiever testbeleid, maar ook blijkt een toename te zien in het aandeel van homo- en biseksuele mannen.

De gegevens suggereren dat onveilig seksueel gedrag bij de homoseksuele mannen toeneemt, hetgeen een zorgelijke ontwikkeling is met mogelijke consequenties voor de HIV-incidentie.

SOA Surveillance

Sinds de wijziging van de Wet op de Bestrijding Infectieziekten (april 1999) zijn syfilis en gonorroe geen aangifteplichtige ziekten meer. Hierdoor berust het inzicht momenteel in het voorkomen van SOA alleen op de jaarverslagen van de SOA-poliklinieken en de SOA-registratie. In september 2000 heeft de Werkgroep Herziening SOA-surveillance een unaniem advies uitgebracht aan IGZ.² Het advies omvat o.a. een SOA-peilstation, bestaande uit de 6 drempelvrije poliklinieken en een beperkt aantal GGD's buiten de randstad, aangevuld met gegevens uit ISIS en de aangifte, voor de monitoring van SOA-diagnoses en enkele kerngegevens.

De werkgroep heeft aangegeven dat de huidige SOA-registratie onder bepaalde voorwaarden onderdeel kan zijn van de toekomstige SOA-surveillance; het is echter nog niet duidelijk welke keuzes dienen te worden gemaakt. Indien wordt gekeken naar de kwantiteit van de gegevens dan blijkt dat in 1999 76% van het aantal consulten zijn ingestuurd door 12 GGD, voor het aantal SOA diagnoses blijkt dit 85% te zijn. De vorming van een SOA-peilstation op basis van de participatie van een aantal GGD's ligt dan voor de hand. In de loop van 2001 zal duidelijk moeten worden hoe het SOA-peilstation verder vorm gegeven zal worden.

² Rijlaarsdam J, Bosman A, Laar MJW van de. SOA-surveillance in Nederland. Bilthoven: RIVM Rapport 441500 010. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2000.

TABELLEN

Toelichting op de gegevensverwerking en tabellen

In een samenvattend overzicht worden de belangrijkste gegevens van de 11.586 ingestuurde kaarten gepresenteerd. Hierbij wordt de logica van de registratiekaart gevolgd.

In **hoofdstuk 2 en tabellen deel A** wordt een overzicht gegeven van de insturende GGD's/ SOA-poliklinieken, de redenen waarvoor de patiënt de GGD of polikliniek bezoekt, hoe vaak daadwerkelijk onderzoek naar SOA en HIV wordt uitgevoerd en vervolgens een overzicht van kenmerken van bezoekers naar soort uitgevoerd onderzoek (onderzoek op SOA, HIV-test of beide): geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, prostitutie, druggebruik, SOA in anamnese en land van herkomst.

Land van herkomst is vastgesteld op basis van de op de kaart aangegeven geboorteland, eerste en tweede nationaliteit. Wordt aangegeven dat een bezoeker in Turkije geboren is en/of een Turkse nationaliteit heeft dan is het land van herkomst 'Turkije'. Misclassificaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld doordat personen van de tweede generatie niet geïdentificeerd kunnen worden of dat bij het invullen van de kaart de twee verschillende coderingslijsten door elkaar gehaald zijn.

In **hoofdstuk 3 en tabellen deel A** staan de gestelde SOA-diagnose (inclusief HIV) centraal. Omdat per persoon meerdere SOA mogelijk zijn, is het aantal diagnoses groter dan het aantal personen. Een overzicht wordt gegeven van het aantal personen met geen, één of meerdere infecties, vervolgens alle gediagnosticeerde SOA (naar geslacht) en de lokalisatie i.g.v. gonorroe en chlamydia.

Voor gonorroe (inclusief PVG), syfilis (primair en secundair), chlamydia, de virale SOA (genitale herpes, genitale wratten en hepatitis B) en HIV afzonderlijk worden de aantallen diagnoses gepresenteerd naar de bovengenoemde achtergrondkenmerken.

In **hoofdstuk 4 en tabellen deel B** staan trendoverzichten van het voorkomen van bovengenoemde SOA afzonderlijk voor de periode 1993-1999 weergegeven. Allereerst voor alle subgroepen tezamen vervolgens apart voor heteroseksuele mannen, homo- en biseksuele mannen, vrouwelijke non-prostituees en vrouwelijke prostituees.

DEEL A: NATIONALE GEGEVENS

CONSULTEN EN KENMERKEN BEZOEKERS

Tabel 1: Aantal consulten naar GGD en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA Onderzoek	HIV test	Beide	totaal 1999	%	totaal 1998
GG en GD Utrecht	399	163	835	1397	12.1	1492
GGD Rotterdam e.o.	887	433	.	1320	11.4	835
GGD regio Nijmegen	684	100	21	805	6.9	714
GGD Hart voor Brabant	533	188	1	722	6.2	688
GGD Arnhem	530	31	146	707	6.1	749
GGD Oostelijk Zuid Limburg	278	103	272	653	5.6	400
GGD Twente	485	126	.	611	5.3	130
GGD Den Haag	507	34	61	602	5.2	344
GGD Groningen	380	2	186	568	4.9	543
GGD Noord Kennemerland	282	91	145	518	4.5	481
GGD Zuidelijk Zuid Limburg	288	61	138	487	4.2	504
GGD West-Brabant	241	157	21	419	3.6	340
GGD Zuid Kennemerland	129	160	19	308	2.7	255
GGD Zuid-Holland Noord	26	212	1	239	2.1	345
GGD Flevoland	109	66	43	218	1.9	204
GGD regio IJssel-Vecht	99	51	63	213	1.8	86
GGD regio Stedendriehoek	67	106	28	201	1.7	267
GGD Amstelland-De Meerlanden	35	90	32	157	1.4	99
GGD Frýslan	112	12	9	133	1.1	97
GGD Kop van Noord-Holland	93	16	13	122	1.1	102
GGD Westfriesland	51	44	3	98	0.8	89
GGD Zeeland	44	40	11	95	0.8	117
GGD Noord Limburg	46	34	2	82	0.7	104
GGD Midden Holland	42	31	8	81	0.7	76
GGD Eindhoven	.	77	2	79	0.7	.
GGD Rivierenland	31	19	29	79	0.7	47
GGD West-Veluwe/Vallei	26	48	1	75	0.6	86
GGD Delfland	.	74	.	74	0.6	63
GGD Gooi en Vechtstreek	14	50	3	67	0.6	67
GGD West-Holland	1	63	.	64	0.6	96
GGD regio Achterhoek	28	25	8	61	0.5	60
GGD Eemland	11	44	.	55	0.5	136
GGD Westelijk Mijnstreek	13	24	12	49	0.4	83
GGD Zuidhollandse Eilanden	20	24	2	46	0.4	18
GGD Midden Limburg	5	35	.	40	0.3	44
GGD Zuid-Holland Zuid	.	33	.	33	0.3	114
GGD Noordwest Veluwe	9	7	16	32	0.3	30
GGD Midden Kennemerland	12	.	.	12	0.1	12
GGD Noord & Midden Drenthe	10	.	.	10	0.1	28
GGD Zuidwest Drenthe	2	.	1	3	0.0	6
GGD Zuid-Oost Brabant	1	.	.	1	0.0	.
GGD Midden Nederland	.	.	.	.	.	8
GGD Nieuwe Waterweg Noord	.	.	.	.	.	.
GGD Zaanstreek-Waterland	.	.	.	.	.	45
GGD Zuid-Oost Drenthe	.	.	.	.	.	11
Onbekend	29	17	4	50	0.4	18
TOTAAL	6559	2891	2136	11586	100.0	10123

Tabel 2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	3031	46.21	1619	56.00	1065	49.86	5715	49.33	4931	48.88
vrouw	3500	53.36	1253	43.34	1060	49.63	5813	50.17	5152	51.08
onbekend	28	0.43	19	0.66	11	0.51	58	0.50	4	0.04
TOTAAL	6559	100.00	2891	100.00	2136	100.00	11586	100.00	10087	100.00

Tabel 3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		Totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	504	7.68	328	11.35	212	9.93	1044	9.01	824	8.14
februari	502	7.65	219	7.58	161	7.54	882	7.61	769	7.60
maart	629	9.59	267	9.24	168	7.87	1064	9.18	869	8.58
april	595	9.07	234	8.09	165	7.72	994	8.58	723	7.14
mei	508	7.75	218	7.54	151	7.07	877	7.57	656	6.48
juni	614	9.36	231	7.99	137	6.41	982	8.48	869	8.58
juli	562	8.57	251	8.68	139	6.51	952	8.22	908	8.97
augustus	552	8.42	209	7.23	180	8.43	941	8.12	905	8.94
september	567	8.64	235	8.13	187	8.75	989	8.54	899	8.88
oktober	500	7.62	163	5.64	187	8.75	850	7.34	865	8.54
november	603	9.19	244	8.44	229	10.72	1076	9.29	995	9.83
december	411	6.27	276	9.55	217	10.16	904	7.80	798	7.88
onbekend	12	0.18	16	0.55	3	0.14	31	0.27	43	0.42
TOTAAL	6559	100.00	2891	100.00	2136	100.00	11586	100.00	10123	100.00

Tabel 4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		Totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	2453	42.92	2715	46.71	25	43.10	5193	44.82	4737	46.96
HIV-test	1883	32.95	1483	25.51	17	29.31	3383	29.20	3125	30.98
beide	1322	23.13	1557	26.78	13	22.41	2892	24.96	1986	19.69
onbekend	57	1.00	58	1.00	3	5.17	118	1.02	239	2.37
TOTAAL	5715	100.00	5813	100.00	58	100.00	11586	100.00	10087	100.00

Tabel 4b: Reden voor SOA-onderzoek en HIV-test (meer redenen per client mogelijk)

	SOA onderzoek				HIV test			
	1999 aantal	%	1998 Aantal	%	1999 aantal	%	1998 aantal	%
klachten	3164	29.68	2940	35.13	256	3.22	231	3.93
begin nieuwe relatie	987	9.26	792	9.46	1762	22.17	1486	25.29
kinderwens	58	0.54	61	0.73	110	1.38	111	1.89
eigen risicogedrag	3604	33.81	2524	30.16	3356	42.22	2666	45.36
risicogedrag partner	868	8.14	512	6.12	1098	13.81	486	8.27
partner HIV positief	11	0.10	10	0.12	96	1.21	48	0.82
gewaarschuwd door partner	359	3.37	314	3.75	37	0.47	47	0.80
gewaarschuwd door SV *	46	0.43	29	0.35	3	0.04	.	.
gewaarschuwd door anders	65	0.61	506	0.60	24	0.30	120	2.04
periodieke controle	864	8.11	617	7.37	419	5.27	177	3.01
na seksueel geweld	167	1.57	92	1.10	122	1.53	60	1.02
extreme angst	123	1.15	82	0.98	204	2.57	140	2.38
prik accident	3	0.03	2	0.02	43	0.54	33	0.56
i.v.m. verzekering	3	0.03	5	0.06	28	0.35	20	0.34
onbekend	57	0.53	49	0.59	57	0.72	44	0.75
anders	280	2.63	289	3.45	333	4.19	208	3.54
TOTAAL	10659	100.0	8368	100.0	7948	100.0	5877	100.0

*SV= Sociaal-verpleegkundige

Tabel 4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

reden bezoek ∅	SOA				totaal 1999	totaal 1998
	Onderzoek	HIV test	beide	Onbekend		
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	2	19	4	.	25	29
geen SOA onderzoek, HIV negatief	15	2756	59	36	2866	2852
SOA positief, geen HIV test	1757	463	203	36	2459	2395
SOA positief, HIV positief	1	.	5	.	6	5
SOA positief, HIV negatief	10	3	205	2	220	176
SOA negatief, geen HIV test	3375	97	592	36	4100	3163
SOA negatief, HIV positief	3	1	11	.	15	4
SOA negatief, HIV negatief	30	44	1813	8	1895	1499
TOTAAL	5193	3383	2892	118	11586	10123

Tabel 5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		Totaal 1999		Totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	16	0.28	28	0.48	.	.	44	0.38	60	0.59
15-19	220	3.85	790	13.59	12	20.69	1022	8.82	788	7.81
20-24	1003	17.55	1862	32.03	15	25.86	2880	24.86	2497	24.75
25-29	1254	21.94	1213	20.87	10	17.24	2477	21.38	2288	22.68
30-34	961	16.82	728	12.52	6	10.34	1695	14.63	1440	14.28
35-39	755	13.21	469	8.07	4	6.90	1228	10.60	992	9.83
40-44	467	8.17	292	5.02	1	1.72	760	6.56	672	6.66
45-54	592	10.36	249	4.28	3	5.17	844	7.28	714	7.08
>54	308	5.39	66	1.14	2	3.45	376	3.25	271	2.69
??	139	2.43	116	2.00	5	8.62	260	2.24	365	6.62
TOTAAL	5715	100.00	5813	100.00	58	100.00	11586	100.00	10087	100.00

Tabel 6:
Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	4781	83.66	4384	75.42	43	74.14	9208	79.48	8051	79.82
Turkije	58	1.01	22	0.38	.	.	80	0.69	126	1.25
Marokko	88	1.54	35	0.60	.	.	123	1.06	114	1.13
Sur./ Ant./ Aru.	170	2.97	149	2.56	1	1.72	320	2.76	344	3.41
overig	423	7.40	1054	18.13	9	15.52	1486	12.83	1106	10.96
onbekend	195	3.41	169	2.91	5	8.62	369	3.18	346	3.43
TOTAAL	5715	100.00	5813	100.00	58	100.00	11586	100.00	10087	100.00

Tabel 7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID										
heteroseksueel	2263	74.66	1278	78.94	782	73.43	4323	75.64	3819	77.45
homoseksueel	516	17.02	197	12.17	182	17.09	895	15.66	694	14.07
biseksueel	156	5.15	54	3.34	65	6.10	275	4.81	206	4.18
onbekend	96	3.17	90	5.56	36	3.38	222	3.88	212	4.30
TOTAAL	3031	100.00	1619	100.00	1065	100.00	5715	100.00	4931	100.00

Tabel 8a:
Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, mannen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituté	26	0.86	3	0.19	13	1.22	42	0.73	45	0.95
prostituut	345	11.38	138	8.52	78	7.32	561	9.82	505	10.65
geen van beide	2304	76.01	1212	74.86	858	80.56	4374	76.54	3725	78.52
onbekend	356	11.75	266	16.43	116	10.89	738	12.91	469	9.89
TOTAAL	3031	100.00	1619	100.00	1065	100.00	5715	100.00	4744	100.00

Tabel 8b:
Aantal consulten naar prostitutie en uitgevoerd onderzoek, vrouwen

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituée	964	27.54	42	3.35	194	18.30	1200	20.64	973	19.51
prostituut	6	0.17	.	.	1	0.09	7	0.12	6	0.12
geen van beide	2263	64.66	1058	84.44	805	75.94	4126	70.98	3708	74.37
onbekend	267	7.63	153	12.21	60	5.66	480	8.26	299	6.00
TOTAAL	3500	100.00	1253	100.00	1060	100.00	5813	100.00	4986	100.00

Tabel 9:
Aantal consulten naar druggebruik en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DRUGGEBRUIK										
ja, intraveneus	17	0.30	16	0.28	.		33	0.28	15	0.15
ja, niet intraveneus	191	3.34	148	2.55	.		339	2.93	275	2.73
ja, onbekend wat	545	9.54	488	8.39	.		1033	8.92	284	2.82
nee	3928	68.73	4040	69.50	42	72.41	8010	69.14		
onbekend	1034	18.09	1121	19.28	16	27.59	2171	18.74	9513	94.31
TOTAAL	5715	100.00	5813	100.00	58	100.00	11586	100.00	10087	100.00

Tabel 10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		Vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	954	16.69	957	16.46	4	6.90	1915	16.53	1668	16.54
nee	3945	69.03	4023	69.21	44	75.86	8012	69.15	6946	68.86
onbekend	816	14.28	833	14.33	10	17.24	1659	14.32	1473	14.60
TOTAAL	5715	100.00	5813	100.00	58	100.00	11586	100.00	10087	100.00

GESTELDE DIAGNOSES EN KENMERKEN VAN PATIENTENTabel 11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	165	2.8	51	0.8	.	.	216	1.8	195	1.9
Gonorroë: PVG	7	0.1	2	0.0	.	.	9	0.1	10	0.1
Syfilis: niet gespecificeerd	16	0.3	23	0.4	.	.	39	0.3	24	0.2
" : primair	18	0.3	12	0.2	.	.	30	0.2	41	0.4
" : secundair	5	0.1	10	0.2	.	.	15	0.1	16	0.2
" : latens recens	14	0.2	13	0.2	.	.	27	0.2	61	0.6
" : latens tarda	9	0.2	4	0.1	.	.	13	0.1	16	0.2
Chlamydia infectie	292	5.0	393	6.5	3	5.1	688	5.7	714	6.8
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	16	0.3	17	0.3	.	.	33	0.3	31	0.3
" : primo: HSV-type1&2	1	0.0	1	0.0	.	.	2	0.0	1	0.0
" : primo: HSV type 1	8	0.1	19	0.3	.	.	27	0.2	21	0.2
" : primo: HSV type 2	19	0.3	13	0.2	.	.	32	0.3	39	0.4
" : recidief	18	0.3	13	0.2	.	.	31	0.3	46	0.4
Genitale wratten	215	3.7	162	2.7	1	1.7	378	3.1	335	3.2
Hepatitis B: acuut	10	0.2	8	0.1	.	.	18	0.1	25	0.2
Hepatitis B: chronisch	15	0.3	11	0.2	.	.	26	0.2	14	0.1
Niet Specifieke Urethritis	93	1.6	9	0.1	.	.	102	0.8	91	0.9
Bacteriele Vaginose	.	.	290	4.8	5	8.5	295	2.5	243	2.3
Trichomoniasis	3	0.1	27	0.4	.	.	30	0.2	41	0.4
Candidiasis	42	0.7	193	3.2	.	.	235	2.0	280	2.7
Schaamluis	6	0.1	5	0.1	.	.	11	0.1	14	0.1
Scabies	18	0.3	10	0.2	.	.	28	0.2	51	0.5
Ulcus molle	2	0.0	.	.	.	.	2	0.0	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	315	5.4	282	4.6	1	1.7	598	5.0	496	4.7
PID	.	.	3	0.0	.	.	3	0.0	1	0.0
HIV +	37	0.6	9	0.1	.	.	46	0.4	38	0.4
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>1344</i>	<i>22.8</i>	<i>1580</i>	<i>26.0</i>	<i>10</i>	<i>17.0</i>	<i>2934</i>	<i>24.4</i>	<i>2844</i>	<i>27.1</i>
HIV -	2647	45.0	2304	38.0	30	50.8	4981	41.5	4514	42.9
Nihil *	1894	32.2	2187	36.0	19	32.2	4100	34.1	3152	30.0
TOTAAL	5885	100.0	6071	100.0	59	100.0	12015	100.0	10510	100.0

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11a:
Aandeel van verschillende diagnoses naar geslacht
(jaarlijks totaal gediagnosticeerde SOA=100%)

	man	vrouw	totaal 1999	totaal 1998
Chlamydia infectie	21.7	24.9	23.4	25.1
Overig/ niet gespecificeerd	23.4	17.8	20.4	17.4
Genitale wratten	16.0	10.3	12.9	11.8
Candidiasis	3.1	12.2	8.0	9.8
Gonorroë (excl.PVG)	12.3	3.2	7.4	6.9
Bacteriele Vaginose	.	18.4	10.1	8.5
Herpes genitalis: primo + recidief	4.6	4.0	4.3	4.9
Syfilis: totaal	4.6	3.9	4.2	5.5
Scabies	1.3	0.6	1.0	1.8
Hepatitis B: acuut	0.7	0.5	0.6	0.9
Niet Specifieke Urethritis	6.9	0.6	3.5	3.2
Trichomoniasis	0.2	1.7	1.0	1.4
Schaamluis	0.4	0.3	0.4	0.5
Hepatitis B: chronisch	1.1	0.7	0.9	0.5
HIV +	2.8	0.6	1.6	1.3
Gonorroë: PVG	0.5	0.1	0.3	0.4
PID	0.0	0.2	0.1	0.0
Ulcus molle	0.1	0.0	0.1	0.0
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	1344	1580	2934	2844

Tabel 11b:
Lokalisatie i.g.v. gonorroe (incl. PVG), naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal	
	N	N	%	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
urethraal/cervicaal	84	48.84	38	71.70	.	.	122	54.22
anaal/rectaal	7	4.07	.	.	.	.	7	3.11
mond/keel	4	2.33	1	1.89	.	.	5	2.22
oog	.	.	.	.	.	.	.	.
onbekend	77	44.77	14	26.42	.	.	91	40.44
TOTAAL	172	100.00	53	100.00	.	.	225	100.00

Tabel 11c:
Lokalisatie i.g.v. chlamydia-infectie, naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal	
	N	N	%	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
urethraal/cervicaal	222	76.03	295	75.06	3	100.00	520	75.58
anaal/rectaal	7	2.40	.	.	.	.	7	1.02
mond/keel	.	.	.	.	.	.	.	.
oog	.	.	.	.	.	.	.	.
onbekend	63	21.58	98	24.94	.	.	161	23.40
TOTAAL	292	100.00	393	100.00	3	100.00	688	100.00

Tabel 12:
Aantal infecties in geval van gestelde diagnose, naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
AANTAL SOA										
enkele infectie	1165	92.02	1289	88.96	10	100.00	2464	90.42	2337	89.99
dubbele infecties	91	7.19	148	10.21	.	.	239	8.77	229	8.82
drievoudige infecties	8	0.63	11	0.76	.	.	19	0.70	25	0.96
viervoudige infecties	2	0.16	1	0.07	.	.	3	0.11	6	0.23
TOTAAL	1266	100.00	1449	100.00	10	100.00	2725	100.00	2597	100.00

Tabel 13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	≤14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	11	6.4	21	12.2	42	24.4	31	18.0	20	11.6	13	7.6	22	12.8	12	7.0	.	.	172
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	1	4.3	2	8.7	3	13.0	6	26.1	3	13.0	2	8.7	6	26.1	.	.	23
Chlamydia	.	.	19	6.5	56	19.2	92	31.5	49	16.8	29	9.9	18	6.2	16	5.5	9	3.1	4	1.4	292
Herpes genitalis	.	.	1	1.6	9	14.5	20	32.3	9	14.5	8	12.9	4	6.5	5	8.1	5	8.1	1	1.6	62
Genitale wratten	.	.	4	1.9	34	15.8	64	29.8	44	20.5	26	12.1	12	5.6	18	8.4	10	4.7	3	1.4	215
Overig	1	0.2	20	3.7	75	13.8	113	20.8	78	14.4	78	14.4	75	13.8	55	10.1	38	7.0	10	1.8	543
HIV+	.	.	1	2.7	2	5.4	2	5.4	8	21.6	8	21.6	6	16.2	8	21.6	1	2.7	1	2.7	37
<i>Gediagn. inf</i>	1	0.1	56	4.2	198	14.7	335	25.0	222	16.5	175	13.0	131	9.7	126	9.4	81	6.0	19	1.4	1344
Nihil *	15	0.3	169	3.8	810	18.2	934	21.0	752	16.9	589	13.2	348	7.8	474	10.7	237	5.3	121	2.7	4449
TOTAAL	16	0.3	225	3.9	1008	17.4	1269	21.9	974	16.8	764	13.2	479	8.3	600	10.4	318	5.5	140	2.4	5793

Tabel 13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	≤14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	1	1.9	13	24.5	16	30.2	7	13.2	7	13.2	4	7.5	4	7.5	1	1.9	.	.	.	.	53
Syf.: Pr. & S.	.	.	4	18.2	1	4.5	3	13.6	3	13.6	4	18.2	3	13.6	4	18.2	.	.	.	.	22
Chlamydia	2	0.5	99	25.2	153	38.9	77	19.6	27	6.9	9	2.3	7	1.8	9	2.3	1	0.3	9	2.3	393
Herpes genitalis	.	.	6	9.5	10	15.9	12	19.0	12	19.0	7	11.1	10	15.9	3	4.8	.	.	3	4.8	63
Genitale wratten	1	0.6	23	14.2	62	38.3	30	18.5	21	13.0	9	5.6	7	4.3	6	3.7	1	0.6	2	1.2	162
Overig	6	0.7	132	15.0	283	32.2	181	20.6	102	11.6	75	8.5	41	4.7	39	4.4	7	0.8	12	1.4	878
HIV+	.	.	1	11.1	2	22.2	3	33.3	2	22.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11.1	9
<i>Gediagn inf</i>	10	0.6	278	17.6	527	33.4	313	19.8	174	11.0	108	6.8	72	4.6	62	3.9	9	0.6	27	1.7	1580
Nihil *	18	0.4	542	12.4	1386	31.8	918	21.0	565	12.9	369	8.5	225	5.2	193	4.4	57	1.3	91	2.1	4364
TOTAAL	28	0.5	820	13.8	1913	32.2	1231	20.7	739	12.4	477	8.0	297	5.0	255	4.3	66	1.1	118	2.0	5944

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 14a:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	130	75.6	5	2.9	4	2.3	14	8.1	11	6.4	8	4.7	172
Syfilis: Prim. & Sec.	14	60.9	1	4.3	2	8.7	2	8.7	2	8.7	2	8.7	23
Chlamydia infectie	219	75.0	2	0.7	8	2.7	30	10.3	22	7.5	11	3.8	292
Herpes genitalis	42	67.7	3	4.8	2	3.2	4	6.5	11	17.7	.	.	62
Genitale wratten	176	81.9	4	1.9	4	1.9	7	3.3	15	7.0	9	4.2	215
Overig	380	70.0	9	1.7	21	3.9	31	5.7	57	10.5	45	8.3	543
HIV+	29	78.4	1	2.7	1	2.7	.	.	4	10.8	2	5.4	37
<i>Gediagn inf</i>	990	73.7	25	1.9	42	3.1	88	6.5	122	9.1	77	5.7	1344
Nihil	3840	86.3	33	0.7	51	1.1	90	2.0	312	7.0	123	2.8	4449
TOTAAL	4830	83.4	58	1.0	93	1.6	178	3.1	434	7.5	200	3.5	5793

Tabel 14b:
Diagnoses naar land van herkomst, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	32	60.4	1	1.9	.	.	5	9.4	12	22.6	3	5.7	53
Syfilis: Prim. & Sec.	10	45.5	.	.	1	4.5	2	9.1	8	36.4	1	4.5	22
Chlamydia infectie	285	72.5	1	0.3	3	0.8	21	5.3	73	18.6	10	2.5	393
Herpes genitalis	55	87.3	.	.	.	.	2	3.2	6	9.5	.	.	63
Genitale wratten	134	82.7	.	.	3	1.9	3	1.9	16	9.9	6	3.7	162
Overig	584	66.5	4	0.5	9	1.0	55	6.3	192	21.9	34	3.9	878
HIV+	4	44.4	.	.	.	.	.	.	5	55.6	.	.	9
<i>Gediagn inf</i>	1104	69.9	6	0.4	16	1.0	88	5.6	312	19.7	54	3.4	1580
Nihil	3367	77.2	17	0.4	21	0.5	72	1.6	769	17.6	118	2.7	4364
TOTAAL	4471	75.2	23	0.4	37	0.6	160	2.7	1081	18.2	172	2.9	5944

Tabel 15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	91	52.9	63	36.6	10	5.8	8	4.7	172
Syfilis: Prim. & Sec.	15	65.2	7	30.4	1	4.3	.	.	23
Chlamydia infectie	237	81.2	37	12.7	9	3.1	9	3.1	292
Herpes genitalis	51	82.3	5	8.1	3	4.8	3	4.8	62
Genitale wratten	149	69.3	53	24.7	5	2.3	8	3.7	215
Overig	436	80.3	65	12.0	28	5.2	14	2.6	543
HIV+	15	40.5	16	43.2	3	8.1	3	8.1	37
<i>Gediagn inf</i>	<i>994</i>	<i>74.0</i>	<i>246</i>	<i>18.3</i>	<i>59</i>	<i>4.4</i>	<i>45</i>	<i>3.3</i>	<i>1344</i>
Nihil	3386	76.1	665	14.9	219	4.9	179	4.0	4449
TOTAAL	4380	75.6	911	15.7	278	4.8	224	3.9	5793

Tabel 16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituë		prostituant		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	2	1.2	23	13.4	117	68.0	30	17.4	172
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	5	21.7	17	73.9	1	4.3	23
Chlamydia infectie	1	0.3	15	5.1	243	83.2	33	11.3	292
Herpes genitalis	.	.	4	6.5	45	72.6	13	21.0	62
Genitale wratten	.	.	15	7.0	190	88.4	10	4.7	215
Overig	.	.	52	9.6	386	71.1	105	19.3	543
HIV+	.	.	1	2.7	25	67.6	11	29.7	37
<i>Gediagn inf</i>	<i>3</i>	<i>0.2</i>	<i>115</i>	<i>8.6</i>	<i>1023</i>	<i>76.1</i>	<i>203</i>	<i>15.1</i>	<i>1344</i>
Nihil	39	0.9	456	10.2	3410	76.6	544	12.2	4449
TOTAAL	42	0.7	571	9.9	4433	76.5	747	12.9	5793

Tabel 16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituëe		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	10	18.9	.	.	39	73.6	4	7.5	53
Syfilis: Prim. & Sec.	8	36.4	.	.	10	45.5	4	18.2	22
Chlamydia infectie	69	17.6	1	0.3	291	74.0	32	8.1	393
Herpes genitalis	.	.	.	.	50	79.4	13	20.6	63
Genitale wratten	21	13.0	.	.	131	80.9	10	6.2	162
Overig	228	26.0	1	0.1	550	62.6	99	11.3	878
HIV+	3	33.3	.	.	5	55.6	1	11.1	9
<i>Gediagn inf</i>	<i>339</i>	<i>21.5</i>	<i>2</i>	<i>0.1</i>	<i>1076</i>	<i>68.1</i>	<i>163</i>	<i>10.3</i>	<i>1580</i>
Nihil	887	20.3	5	0.1	3142	72.0	330	7.6	4364
TOTAAL	1226	20.6	7	0.1	4218	71.0	493	8.3	5944

Tabel 17:
Diagnoses naar druggebruik, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, intraveneus		ja, niet intraveneus		ja, onbekend wat		nee		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE											
Gonorroë	.	.	5	2.2	32	14.2	126	56.0	62	27.6	225
Syfilis: Prim. & Sec.	1	2.2	1	2.2	9	20.0	18	40.0	16	35.6	45
Chlamydia infectie	1	0.1	27	3.9	61	8.9	452	65.7	147	21.4	688
Herpes genitalis	.	.	1	0.8	15	12.0	73	58.4	36	28.8	125
Genitale wratten	.	.	5	1.3	62	16.4	239	63.2	72	19.0	378
Overig	11	0.8	22	1.5	407	28.5	647	45.3	340	23.8	1427
HIV+	2	4.3	2	4.3	6	13.0	30	65.2	6	13.0	46
<i>Gediagn inf</i>	<i>15</i>	<i>0.5</i>	<i>63</i>	<i>2.1</i>	<i>592</i>	<i>20.2</i>	<i>1585</i>	<i>54.0</i>	<i>679</i>	<i>23.1</i>	<i>2934</i>
Nihil	23	0.3	281	3.2	485	5.5	6535	73.8	1537	17.3	8861
TOTAAL	38	0.3	344	2.9	1077	9.1	8120	68.8	2216	18.8	11795

Tabel 18a:
Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE							
Gonorroë	53	23.6	136	60.4	36	16.0	225
Syfilis: Prim. & Sec.	13	28.9	24	53.3	8	17.8	45
Chlamydia infectie	135	19.6	465	67.6	88	12.8	688
Herpes genitalis	20	16.0	86	68.8	19	15.2	125
Genitale wratten	83	22.0	258	68.3	37	9.8	378
Overig	312	21.9	682	47.8	433	30.3	1427
HIV+	10	21.7	24	52.2	12	26.1	46
<i>Gediagn inf</i>	<i>626</i>	<i>21.3</i>	<i>1675</i>	<i>57.1</i>	<i>633</i>	<i>21.6</i>	<i>2934</i>
Nihil	1334	15.1	6453	72.8	1074	12.1	8861
TOTAAL	1960	16.6	8128	68.9	1707	14.5	11795

Tabel 18b:
Diagnoses naar soort SOA in anamnese, mannen (percentages in horizontale richting)

	gonorroë		Syfilis		chlamydia		andere soa		onbekend welke soa		nooit		onbekend		totaal N
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE															
Gonorroë	18	8.7	1	0.5	9	4.3	9	4.3	40	19.3	106	51.2	24	11.6	207
Syfilis: Prim. & Sec.	7	21.9	.	.	.	.	2	6.3	10	31.3	9	28.1	4	12.5	32
Chlamydia infectie	18	5.1	1	0.3	27	7.7	13	3.7	64	18.3	196	56.0	31	8.9	350
Herpes genitalis	2	2.8	.	.	2	2.8	5	7.0	10	14.1	40	56.3	12	16.9	71
Genitale wratten	7	2.7	1	0.4	15	5.7	26	9.9	49	18.7	144	55.0	20	7.6	262
Overig	29	4.6	6	0.9	19	3.0	35	5.5	110	17.4	213	33.7	220	34.8	632
HIV+	4	9.3	1	2.3	.	.	2	4.7	8	18.6	17	39.5	11	25.6	43
<i>Gediagn inf</i>	<i>85</i>	<i>5.3</i>	<i>10</i>	<i>0.6</i>	<i>72</i>	<i>4.5</i>	<i>92</i>	<i>5.8</i>	<i>291</i>	<i>18.2</i>	<i>725</i>	<i>45.4</i>	<i>322</i>	<i>20.2</i>	<i>1597</i>
Nihil	168	3.2	34	0.7	207	4.0	206	4.0	680	13.1	3349	64.5	552	10.6	5196
TOTAAL	253	3.7	44	0.6	279	4.1	298	4.4	971	14.3	4074	60.0	874	12.9	6793

Tabel 18c:
Diagnoses naar soort SOA in anamnese, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	gonorroe		syfilis		chlamydia		andere soa		onbekend welke soa		nooit		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE															
Gonorroe	2	3.2	1	1.6	6	9.5	1	1.6	11	17.5	30	47.6	12	19.0	63
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	3	12.0	.	.	.	.	3	12.0	15	60.0	4	16.0	25
Chlamydia infectie	3	0.7	1	0.2	42	9.2	19	4.2	65	14.3	268	58.9	57	12.5	455
Herpes genitalis	.	.	1	1.4	5	6.9	4	5.6	7	9.7	48	66.7	7	9.7	72
Genitale wratten	.	.	.	.	11	5.7	19	9.9	32	16.7	113	58.9	17	8.9	192
Overig	27	2.6	8	0.8	73	6.9	71	6.7	199	18.9	465	44.1	212	20.1	1055
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	11.1	.	.	7	77.8	1	11.1	9
<i>Gediagn inf</i>	32	1.7	14	0.7	137	7.3	115	6.1	317	16.9	946	50.6	310	16.6	1871
Nihil	63	1.2	37	0.7	290	5.7	217	4.3	647	12.7	3258	63.8	591	11.6	5103
TOTAAL	95	1.4	51	0.7	427	6.1	332	4.8	964	13.8	4204	60.3	901	12.9	6974

Tabel 19:
Aantal HIV-testen met uitslag naar geslacht en risicogroep

	man				vrouw				man/vrouw			
	hetero-seksueel		homo- en biseksueel		prostituée		non-prostituée		onbekend		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UITSLAG												
HIV+	15	0.7	19	3.8	3	1.3	5	0.3	4	1.1	46	0.9
HIV-	2045	99.3	479	96.2	233	98.7	1859	99.7	365	98.9	4981	99.1
TOTAAL	2060	100.0	498	100.0	236	100.0	1864	100.0	369	100.0	5027	100.0

DEEL B TRENDOVERZICHTEN SOA 1993-1999

Voor gonorroe, syfilis en chlamydia zijn de cijfers inclusief Amsterdam

Tabel 20:

Aantal gediagnostiseerde SOA en aantal consulten, 1993-1999

Jaar	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Gonorroe (excl PVG)	879	746	908	830	703	654	865
Gonorroe - PVG	129	83	9	7	67	54	66
Syfilis (prim.+sec.)	78	69	101	137	86	78	79
Syfilis (others)	142	76	162	162	174	193	207
Chlamydia trachomatis	1579	1453	1630	2164	2160	2294	2317
Genitale wratten	288	350	435	396	298	335	378
Non-specifieke urethritis	228	178	220	217	108	91	102
Herpes genitalis	138	123	174	136	113	138	125
Candidiasis	235	267	274	349	281	280	235
Bacteriele vaginose	147	127	189	214	180	243	295
Trichomoniasis	101	90	124	85	50	41	30
Scabies	27	59	66	50	25	51	28
Hepatitis B	37	47	50	25	19	39	44
Schaamluis	42	42	49	30	22	14	11
Ulcus molle	4	2	1	4	1	0	2
overig	18	14	74	107	63	496	601
geen SOA vastgesteld	1649	2130	2334	2851	3353	3152	4100
HIV-test -positief	39	39	55	54	33	38	46
HIV-test -negatief	3491	4392	5456	6054	4634	4514	4981
Totaal aantal infecties	9251	10287	12311	13872	12370	12706	14512
Totaal aantal consulten	8773	9784	11764	13226	12037	12319	13998

Tabel 20a:

Aantal diagnoses en percentage per jaar, 1993-1999

	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
DIAGNOSE														
Gonorroe	1008	11	829	8	917	7	837	6	770	6	708	6	931	6
Syfilis: Prim. & Sec.	78	1	69	1	101	1	137	1	86	1	78	1	79	1
Chlamydia-infectie	1579	17	1453	14	1630	13	2164	16	2160	18	2294	18	2317	16
Herpes genitalis	138	1	123	1	174	1	136	1	113	1	138	1	125	1
Genitale wratten	288	3	350	3	435	4	396	3	298	2	335	3	378	3
Overig	981	11	902	9	1209	10	1243	8	920	7	1449	11	1555	10
HIV+	39	0	39	0	55	0	54	0	33	0	38	0	46	0
HIV-	3491	38	4392	43	5456	44	6054	44	4637	38	4514	36	4981	35
Nihil	1649	18	2130	21	2334	19	2851	21	3353	27	3152	25	4100	29
TOTAAL	9251		10287		12311		13872		12370		12706		14512	

Tabel 21a:

Aantal diagnoses en percentage per jaar, heteroseksuele mannen, 1993-1999

	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
DIAGNOSE														
Gonorroë	548	13	407	9	374	8	304	6	207	5	233	5	268	5
Syfilis: Prim. & Sec.	36	1	38	1	42	1	66	1	30	1	36	1	35	1
Chlamydia-infectie	721	17	628	14	713	15	893	17	872	19	884	19	896	17
Herpes genitalis	70	2	58	1	88	2	70	1	33	1	60	1	51	1
Genitale wratten	135	3	164	4	169	3	181	3	80	2	121	3	149	3
Overig	375	9	295	7	395	8	354	7	165	4	394	8	436	8
HIV+	8	0	12	0	9	0	10	0	2	0	7	0	15	0
HIV-	1595	37	1886	43	2207	45	2494	46	1938	43	1250	27	2045	39
Nihil	775	18	925	21	869	18	993	19	1160	26	1687	36	1408	27
TOTAAL	4263		4413		4866		5365		4487		4672		5303	

Tabel 21b:

Aantal diagnoses en percentage per jaar, homo- en biseksuele mannen, 1993-1999

	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
DIAGNOSE														
Gonorroë	197	23	209	23	313	23	326	25	303	26	329	27	499	25
Syfilis: Prim. & Sec.	16	2	8	1	11	1	19	1	7	1	13	1	47	2
Chlamydia-infectie	82	10	76	8	137	10	155	12	217	18	273	22	355	18
Herpes genitalis	7	1	6	1	11	1	5	0	5	0	8	1	8	0
Genitale wratten	34	4	34	4	70	5	46	4	27	2	41	3	58	3
Overig	64	8	58	6	105	8	55	4	56	5	93	8	93	5
HIV+	14	2	12	1	27	2	28	2	5	0	15	1	19	1
HIV-	301	36	343	37	467	34	476	37	259	22	246	20	479	24
Nihil	132	16	178	19	226	17	185	14	296	25	253	21	427	22
TOTAAL	847		924		1367		1295		1175		1216		1985	

Tabel 22a:

Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, niet werkzaam in de prostitutie, 1993-1999

	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
DIAGNOSE														
Gonorroë	159	5	133	4	122	3	130	3	100	2	81	2	116	2
Syfilis: Prim. & Sec.	11	0	10	0	10	0	19	0	14	0	11	0	22	0
Chlamydia-infectie	617	19	569	15	551	14	862	18	802	18	910	20	887	18
Herpes genitalis	53	2	49	1	66	2	53	1	40	1	55	1	50	1
Genitale wratten	112	3	125	3	163	4	124	3	110	2	131	3	131	3
Overig	364	11	340	9	378	9	432	9	342	8	502	11	551	11
HIV+	11	0	9	0	12	0	8	0	10	0	2	0	5	0
HIV-	1444	44	1884	50	2047	51	2310	47	1833	42	1061	24	1859	37
Nihil	526	16	681	18	647	16	935	19	1164	26	1695	38	1377	28
TOTAAL	3297		3800		3996		4873		4415		4448		4998	

Tabel 22b:

Aantal diagnoses en percentage per jaar, vrouwen, werkzaam in de prostitutie, 1993-1999

	1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
DIAGNOSE														
Gonorroë	80	12	60	7	80	6	51	4	52	4	31	3	36	3
Syfilis: Prim. & Sec.	11	2	11	1	36	2	25	2	11	1	12	1	14	1
Chlamydia-infectie	116	18	110	13	182	13	202	14	178	15	169	14	133	10
Herpes genitalis	4	1	4	0	4	0	3	0	5	0	4	0	0	0
Genitale wratten	5	1	11	1	25	2	30	2	16	1	20	2	21	2
Overig	158	24	174	21	274	19	250	17	178	7	250	21	228	17
HIV+	1	0	1	0	5	0	1	0	3	0	1	0	3	0
HIV-	99	15	183	22	311	22	306	21	182	16	33	3	233	17
Nihil	184	28	277	33	529	37	570	40	542	46	629	53	687	51
TOTAAL	658		831		1446		1438		1167		1176		1355	

DEEL C GEGEVENS VOOR GGD'S AFZONDERLIJK 1999

1: GG en GD Utrecht

Tabel 1.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	227	56.89	86	52.76	443	53.05	756	54.12	832	55.76
vrouw	172	43.11	76	46.63	392	46.95	640	45.81	656	43.97
onbekend	.	.	1	0.61	.	.	1	0.07	4	0.27
TOTAAL	399	100.00	163	100.00	835	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	29	7.27	23	14.11	58	6.95	110	7.87	117	7.84
februari	33	8.27	18	11.04	53	6.35	104	7.44	122	8.18
maart	34	8.52	12	7.36	69	8.26	115	8.23	118	7.91
april	35	8.77	9	5.52	68	8.14	112	8.02	128	8.58
mei	26	6.52	12	7.36	81	9.70	119	8.52	79	5.29
juni	19	4.76	20	12.27	66	7.90	105	7.52	106	7.10
juli	39	9.77	7	4.29	57	6.83	103	7.37	151	10.12
augustus	42	10.53	13	7.98	71	8.50	126	9.02	133	8.91
september	29	7.27	14	8.59	82	9.82	125	8.95	139	9.32
oktober	31	7.77	4	2.45	81	9.70	116	8.30	136	9.12
november	40	10.03	12	7.36	70	8.38	122	8.73	119	7.98
december	42	10.53	19	11.66	79	9.46	140	10.02	144	9.65
TOTAAL	399	100.00	163	100.00	835	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	230	30.42	167	26.09	.	.	397	28.42	440	29.49
HIV-test	84	11.11	74	11.56	1	100.00	159	11.38	257	17.23
beide	437	57.80	396	61.88	.	.	833	59.63	793	53.15
onbekend	5	0.66	3	0.47	.	.	8	0.57		
TOTAAL	756	100.00	640	100.00	1	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, geen HIV test	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	1	158	3	.	162	251
SOA positief, geen HIV test	81	.	5	1	87	98
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	2	.	68	1	71	71
SOA negatief, geen HIV test	308	.	2	2	312	343
SOA negatief, HIV positief	.	.	2	.	2	1
SOA negatief, HIV negatief	5	.	753	4	762	727
TOTAAL	397	159	833	8	1397	1492

Tabel 1.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		Totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	1	0.16	.	.	1	0.07	7	0.47
15-19	34	4.50	77	12.03	.	.	111	7.95	84	5.63
20-24	143	18.92	228	35.63	.	.	371	26.56	410	27.48
25-29	198	26.19	139	21.72	.	.	337	24.12	390	26.14
30-34	137	18.12	76	11.88	.	.	213	15.25	218	14.61
35-39	81	10.71	58	9.06	1	100.00	140	10.02	156	10.46
40-44	54	7.14	31	4.84	.	.	85	6.08	112	7.51
45-54	79	10.45	20	3.13	.	.	99	7.09	75	5.03
>54	28	3.70	8	1.25	.	.	36	2.58	37	2.48
??	2	0.26	2	0.31	.	.	4	0.29	3	0.20
TOTAAL	756	100.00	640	100.00	1	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	645	85.32	579	90.47	.	.	1224	87.62	1295	86.80
Turkije	5	0.66	3	0.47	.	.	8	0.57	12	0.80
Marokko	24	3.17	5	0.78	.	.	29	2.08	27	1.81
Sur./ Ant./ Aru.	19	2.51	7	1.09	.	.	26	1.86	48	3.22
overig	54	7.14	42	6.56	.	.	96	6.87	89	5.97
onbekend	9	1.19	4	0.63	1	100.00	14	1.00	21	1.41
TOTAAL	756	100.00	640	100.00	1	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	595	78.70	639	76.8
homoseksueel	114	15.08	153	18.39
biseksueel	37	4.89	32	3.85
onbekend	10	1.32	8	0.96
TOTAAL	756	100.00	832	100.00

Tabel 1.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	1	0.13	10	1.56	.	.	11	0.79	29	1.94
prostituant(e)	72	9.52	.	.	.	.	72	5.15	71	4.76
geen van beide	657	86.90	616	96.25	1	100.00	1274	91.20	1346	90.21
onbekend	26	3.44	14	2.19	.	.	40	2.86	46	3.08
TOTAAL	756	100.00	640	100.00	1	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	130	17.20	89	13.91	.	.	219	15.68	250	16.76
Ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	1209	81.03
nee	604	79.89	539	84.22	1	100.00	1144	81.89	33	2.21
onbekend	22	2.91	12	1.88	.	.	34	2.43		
TOTAAL	756	100.00	640	100.00	1	100.00	1397	100.00	1492	100.00

Tabel 1.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		Totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	15	1.8	1	0.1	.	.	16	1.1	15	1.0
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	6	0.7	.	.	.	.	6	0.4	3	0.2
" : primair	.	.	1	0.1	.	.	1	0.1	1	0.1
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	3	0.4	1	0.1	.	.	4	0.3	2	0.1
" : latens tarda	4	0.5	1	0.1	.	.	5	0.3	2	0.3
Chlamydia infectie	53	6.5	36	5.4	.	.	89	6.0	94	6.0
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	1	0.1	1	0.1	.	.	2	0.1	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	3	0.4	2	0.3	.	.	5	0.3	6	0.4
" : primo: HSV type 2	2	0.2	3	0.4	.	.	5	0.3	5	0.3
" : recidief	.	.	1	0.1	.	.	1	0.1	1	0.1
Genitale wratten	21	2.6	10	1.5	.	.	31	2.1	34	2.2
Hepatitis B: acuut	1	0.1	.	.	.	.	1	0.1	2	0.1
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.1
Niet Specifieke Urethritis	1	0.1	.	.	.	.	1	0.1	.	.
Bacteriele Vaginose	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.1
Trichomoniasis	.	.	1	0.1	.	.	1	0.1	.	.
Candidiasis	.	.	3	0.4	.	.	3	0.2	4	0.3
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Scabies	2	0.2	.	.	.	.	2	0.1	2	0.1
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.1
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	2	0.2	1	0.1	.	.	3	0.2	2	0.1
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>114</i>	<i>14.0</i>	<i>62</i>	<i>9.3</i>	.	.	<i>176</i>	<i>11.9</i>	<i>183</i>	<i>11.6</i>
HIV -	527	64.9	467	69.7	1	100	995	67.1	1049	66.6
Nihil *	171	21.1	141	21.0	.	.	312	21.0	343	21.8
TOTAAL	812	100	670	100	1	100	1483	100	1575	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 1.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	3	20.0	1	6.7	2	13.3	3	20.0	1	6.7	2	13.3	1	6.7	2	13.3	.	.	15
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	2	3.8	.	.	18	34.0	9	17.0	4	7.5	6	11.3	3	5.7	1	1.9	1	1.9	53
herpes genitalis	.	.	.	.	1	16.7	2	33.3	2	33.3	.	.	.	.	1	16.7	.	.	.	.	6
genitale wratten	.	.	.	.	4	19.0	7	33.3	5	23.8	2	9.5	.	.	3	14.3	.	.	.	.	21
Overig	.	.	.	.	4	23.5	1	5.9	2	11.8	2	11.8	3	17.6	.	.	5	29.4	.	.	17
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	2
Nihil *	.	.	30	4.6	125	19.2	168	25.8	117	17.9	73	11.2	46	7.1	70	10.7	22	3.4	1	0.2	652
TOTAAL	.	.	35	4.6	144	18.8	198	25.8	138	18.0	83	10.8	57	7.4	79	10.3	30	3.9	2	0.3	766

Tabel 1.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	13	36.1	16	44.4	4	11.1	1	2.8	1	2.8	.	.	.	.	.	.	1	2.8	36
herpes genitalis	.	.	1	14.3	1	14.3	2	28.6	.	.	1	14.3	2	28.6	.	.	.	.	.	.	7
genitale wratten	.	.	.	.	3	30.0	3	30.0	3	30.0	1	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Overig	.	.	2	33.3	2	33.3	1	16.7	.	.	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	6
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	1	0.2	61	10.5	209	35.8	129	22.1	72	12.3	54	9.3	29	5.0	19	3.3	8	1.4	1	0.2	583
TOTAAL	1	0.2	77	11.9	231	35.8	140	21.7	76	11.8	59	9.1	31	4.8	20	3.1	8	1.2	2	0.3	645

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 1.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroe	13	81.3	.	.	.	.	2	12.5	1	6.3	.	.	16
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	77	86.5	1	1.1	2	2.2	4	4.5	4	4.5	1	1.1	89
Herpes genitalis	13	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Genitale wratten	27	87.1	.	.	2	6.5	.	.	1	3.2	1	3.2	31
Overig	12	52.2	.	.	4	17.4	.	.	7	30.4	.	.	23
HIV+	3	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Nihil	1088	88.0	7	0.6	22	1.8	21	1.7	86	7.0	12	1.0	1236
TOTAAL	1233	87.3	8	0.6	31	2.2	27	1.9	99	7.0	14	1.0	1412

Tabel 1.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	10	66.7	3	20.0	2	13.3	.	.	15
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	43	81.1	8	15.1	2	3.8	.	.	53
Herpes genitalis	5	83.3	1	16.7	.	.	.	.	6
Genitale wratten	11	52.4	9	42.9	1	4.8	.	.	21
Overig	12	70.6	5	29.4	.	.	.	.	17
HIV+	.	.	2	100.0	.	.	.	.	2
Nihil	520	79.8	90	13.8	32	4.9	10	1.5	652
TOTAAL	601	78.5	118	15.4	37	4.8	10	1.3	766

Tabel 1.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	1	6.7	14	93.3	.	.	15
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	3	5.7	50	94.3	.	.	53
Herpes genitalis	.	.	.	.	6	100.0	.	.	6
Genitale wratten	.	.	2	9.5	19	90.5	.	.	21
Overig	.	.	.	.	17	100.0	.	.	17
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	1	0.2	67	10.3	558	85.6	26	4.0	652
TOTAAL	1	0.1	73	9.5	666	86.9	26	3.4	766

Tabel 1.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	1	2.8	.	.	35	97.2	.	.	36
Herpes genitalis	.	.	.	.	7	100.0	.	.	7
Genitale wratten	1	10.0	.	.	9	90.0	.	.	10
Overig	.	.	.	.	6	100.0	.	.	6
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	8	1.4	.	.	561	96.2	14	2.4	583
TOTAAL	10	1.6	.	.	621	96.3	14	2.2	645

Tabel 1.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	1	6.3	15	93.8	.	.	16
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	13	14.6	75	84.3	1	1.1	89
Herpes genitalis	2	15.4	11	84.6	.	.	13
Genitale wratten	8	25.8	23	74.2	.	.	31
Overig	4	17.4	17	73.9	2	8.7	23
HIV+	.	.	3	100.0	.	.	3
Nihil	193	15.6	1011	81.8	32	2.6	1236
TOTAAL	221	15.7	1156	81.9	35	2.5	1412

2: GGD Rotterdam e.o.

Tabel 2.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	472	53.21	252	58.20	.	.	724	54.85	419	50.24
vrouw	415	46.79	181	41.80	.	.	596	45.15	415	49.76
TOTAAL	887	100.00	433	100.00	.	.	1320	100.00	834	100.00

Tabel 2.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	93	10.48	77	17.78	.	.	170	12.88	35	4.19
februari	113	12.74	10	2.31	.	.	123	9.32	51	6.11
maart	122	13.75	45	10.39	.	.	167	12.65	40	4.79
april	132	14.88	28	6.47	.	.	160	12.12	53	6.35
mei	98	11.05	31	7.16	.	.	129	9.77	22	2.63
juni	141	15.90	24	5.54	.	.	165	12.50	56	6.71
juli	133	14.99	74	17.09	.	.	207	15.68	61	7.31
augustus	54	6.09	20	4.62	.	.	74	5.61	109	13.05
september	1	0.11	37	8.55	.	.	38	2.88	88	10.54
oktober	.	.	7	1.62	.	.	7	0.53	126	15.09
november	.	.	16	3.70	.	.	16	1.21	118	14.13
december	.	.	64	14.78	.	.	64	4.85	68	8.14
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0.96
TOTAAL	887	100.00	433	100.00	.	.	1320	100.00	835	100.00

Tabel 2.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.								
SOA-onderzoek	90	12.43	73	12.25	163	12.35	254	30.46
HIV-test	521	71.96	433	72.65	954	72.27	341	40.89
beide	110	15.19	88	14.77	198	15.00	117	14.03
onbekend	3	0.41	2	0.34	5	0.38	122	14.63
TOTAAL	724	100.00	596	100.00	1320	100.00	834	100.00

Tabel 2.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, geen HIV test	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	4	.	.	4	5
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	429	.	.	429	18
SOA positief, geen HIV test	148	448	67	5	668	720
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	2
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	2
SOA negatief, geen HIV test	15	73	131	.	219	88
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
TOTAAL	163	954	198	5	1320	835

Tabel 2.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		Totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD								
14	.	.	.	.	.	.	.	.
15-19	25	3.45	69	11.58	94	7.12	64	7.67
20-24	118	16.30	162	27.18	280	21.21	190	22.78
25-29	164	22.65	135	22.65	299	22.65	212	25.42
30-34	141	19.48	97	16.28	238	18.03	126	15.11
35-39	100	13.81	65	10.91	165	12.50	77	9.23
40-44	75	10.36	32	5.37	107	8.11	66	7.91
45-54	65	8.98	23	3.86	88	6.67	68	8.15
>54	30	4.14	8	1.34	38	2.88	23	2.76
??	6	0.83	5	0.84	11	0.83	8	0.96
TOTAAL	724	100.00	596	100.00	1320	100.00	834	100.00

Tabel 2.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST								
Nederland	536	74.03	439	73.66	975	73.86	496	59.47
Turkije	.	.	.	.	.	.	29	3.48
Marokko	24	3.31	6	1.01	30	2.27	28	3.36
Sur./ Ant./ Aru.	47	6.49	59	9.90	106	8.03	139	16.67
overig	47	6.49	50	8.39	97	7.35	69	8.27
onbekend	70	9.67	42	7.05	112	8.48	73	8.75
TOTAAL	724	100.00	596	100.00	1320	100.00	834	100.00

Tabel 2.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	599	82.73	346	82.58
homoseksueel	91	12.57	48	11.46
biseksueel	31	4.28	20	4.77
onbekend	3	0.41	5	1.19
TOTAAL	724	100.00	419	100.00

Tabel 2.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE								
prostituë(e)	1	0.14	36	6.04	37	2.80	53	8.19
prostituant(e)	74	10.22	1	0.17	75	5.68	62	9.58
geen van beide	501	69.20	449	75.34	950	71.97	520	80.37
onbekend	148	20.44	110	18.46	258	19.55	12	1.85
TOTAAL	724	100.00	596	100.00	1320	100.00	647	100.00

Tabel 2.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE								
ja, ooit een SOA	124	17.13	109	18.29	233	17.65	65	7.79
Ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	104	12.47
nee	282	38.95	252	42.28	534	40.45	166	19.90
onbekend	318	43.92	235	39.43	553	41.89	499	59.83
TOTAAL	724	100.00	596	100.00	1320	100.00	834	100.00

Tabel 2.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
Gonorroë (excl.PVG)	20	2.7	16	2.6	36	2.6	54	6.0
Gonorroë: PVG	1	0.1	.	.	1	0.1	4	0.4
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	5	0.7	1	0.2	6	0.4	21	2.3
" : secundair	.	.	1	0.2	1	0.1	7	0.8
" : latens recens	7	0.9	8	1.3	15	1.1	37	4.1
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	26	3.5	32	5.2	58	4.2	119	13.3
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	11	1.5	5	0.8	16	1.2	28	3.1
Genitale wratten	39	5.2	23	3.7	62	4.5	97	10.8
Hepatitis B: acuut	6	0.8	3	0.5	9	0.7	19	2.1
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	7	0.9	.	.	7	0.5	8	0.9
Bacteriele Vaginose	.	.	.	.	.	.	.	.
Trichomoniasis	1	0.1	7	1.1	8	0.6	25	2.8
Candidiasis	.	.	1	0.2	1	0.1	4	0.4
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	2	0.2
Scabies	1	0.1	.	.	1	0.1	3	0.3
Ulcus molle	1	0.1	.	.	1	0.1	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	261	34.9	230	37.3	491	36.0	354	39.5
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	3	0.4	1	0.2	4	0.3	7	0.8
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>389</i>	<i>52.0</i>	<i>328</i>	<i>53.1</i>	<i>717</i>	<i>52.6</i>		
HIV -	249	33.3	180	29.2	429	31.4	20	2.2
Nihil *	110	14.7	109	17.7	219	16.0	88	9.8
TOTAAL	748	100	617	100	1365	100	897	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 2.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	4.8	2	9.5	6	28.6	4	19.0	2	9.5	3	14.3	3	14.3	.	.	.	.	21
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	.	.	5
Chlamydia	.	.	3	11.5	2	7.7	8	30.8	4	15.4	4	15.4	2	7.7	3	11.5	.	.	.	.	26
Herpes genitalis	.	.	.	.	3	27.3	1	9.1	2	18.2	1	9.1	1	9.1	1	9.1	2	18.2	.	.	11
genitale wratten	.	.	2	5.1	7	17.9	12	30.8	11	28.2	1	2.6	3	7.7	2	5.1	1	2.6	.	.	39
overig	.	.	10	3.5	43	15.1	71	25.0	42	14.8	36	12.7	36	12.7	28	9.9	14	4.9	4	1.4	284
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	1	33.3	.	.	1	33.3	.	.	.	.	3
Nihil *	.	.	10	2.8	63	17.5	70	19.5	84	23.4	56	15.6	31	8.6	31	8.6	12	3.3	2	0.6	359
TOTAAL	.	.	26	3.5	120	16.0	169	22.6	148	19.8	102	13.6	77	10.3	70	9.4	30	4.0	6	0.8	748

Tabel 2.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	5	31.3	6	37.5	.	.	2	12.5	1	6.3	2	12.5	.	.	.	.	.	.	16
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia	.	.	9	28.1	12	37.5	5	15.6	2	6.3	1	3.1	1	3.1	.	.	.	.	2	6.3	32
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	2	40.0	2	40.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5
genitale wratten	.	.	4	17.4	9	39.1	5	21.7	3	13.0	.	.	.	.	1	4.3	.	.	1	4.3	23
overig	.	.	29	11.6	76	30.5	65	26.1	26	10.4	25	10.0	16	6.4	7	2.8	4	1.6	1	0.4	249
HIV+	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	29	10.0	63	21.8	60	20.8	65	22.5	37	12.8	15	5.2	15	5.2	4	1.4	1	0.3	289
TOTAAL	.	.	76	12.3	167	27.1	138	22.4	100	16.2	66	10.7	34	5.5	23	3.7	8	1.3	5	0.8	617

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 2.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	17	45.9	.	.	1	2.7	8	21.6	4	10.8	7	18.9	37
Syfilis: Prim. & Sec.	2	28.6	.	.	1	14.3	1	14.3	.	.	3	42.9	7
Chlamydia infectie	31	53.4	.	.	4	6.9	10	17.2	6	10.3	7	12.1	58
Herpes genitalis	11	68.8	.	.	1	6.3	3	18.8	1	6.3	.	.	16
Genitale wratten	40	64.5	.	.	4	6.5	4	6.5	5	8.1	9	14.5	62
Overig	354	66.4	.	.	16	3.0	56	10.5	49	9.2	58	10.9	533
HIV+	4	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Nihil	538	83.0	.	.	7	1.1	30	4.6	38	5.9	35	5.4	648
TOTAAL	997	73.0	.	.	34	2.5	112	8.2	103	7.5	119	8.7	1365

Tabel 2.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	12	57.1	8	38.1	.	.	1	4.8	21
Syfilis: Prim. & Sec.	4	80.0	1	20.0	.	.	.	.	5
Chlamydia infectie	20	76.9	4	15.4	1	3.8	1	3.8	26
Herpes genitalis	11	100.0	.	.	.	.	.	.	11
Genitale wratten	33	84.6	5	12.8	.	.	1	2.6	39
Overig	241	84.9	25	8.8	17	6.0	1	0.4	284
HIV+	1	33.3	2	66.7	.	.	.	.	3
Nihil	298	83.0	48	13.4	13	3.6	.	.	359
TOTAAL	620	82.9	93	12.4	31	4.1	4	0.5	748

Tabel 2.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	5	23.8	13	61.9	3	14.3	21
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	20.0	4	80.0	.	.	5
Chlamydia infectie	.	.	2	7.7	18	69.2	6	23.1	26
Herpes genitalis	.	.	1	9.1	9	81.8	1	9.1	11
Genitale wratten	.	.	7	17.9	32	82.1	.	.	39
Overig	.	.	22	7.7	190	66.9	72	25.4	284
HIV+	.	.	.	.	2	66.7	1	33.3	3
Nihil	1	0.3	40	11.1	250	69.6	68	18.9	359
TOTAAL	1	0.1	78	10.4	518	69.3	151	20.2	748

Tabel 2.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	13	81.3	3	18.8	16
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Chlamydia infectie	.	.	.	.	26	81.3	6	18.8	32
Herpes genitalis	.	.	.	.	3	60.0	2	40.0	5
Genitale wratten	3	13.0	.	.	17	73.9	3	13.0	23
Overig	18	7.2	1	0.4	168	67.5	62	24.9	249
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	15	5.2	.	.	236	81.7	38	13.1	289
TOTAAL	36	5.8	1	0.2	466	75.5	114	18.5	617

Tabel 2.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	10	27.0	17	45.9	10	27.0	37
Syfilis: Prim. & Sec.	1	14.3	5	71.4	1	14.3	7
Chlamydia infectie	13	22.4	26	44.8	19	32.8	58
Herpes genitalis	1	6.3	9	56.3	6	37.5	16
Genitale wratten	11	17.7	38	61.3	13	21.0	62
Overig	102	19.1	116	21.8	315	59.1	533
HIV+	1	25.0	1	25.0	2	50.0	4
Nihil	104	16.0	340	52.5	204	31.5	648
TOTAAL	243	17.8	552	40.4	570	41.8	1365

3: GGD regio Nijmegen

Tabel 3.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	302	44.15	49	49.00	7	33.33	358	44.47	317	44.96
vrouw	377	55.12	51	51.00	14	66.67	442	54.91	388	55.04
onbekend	5	0.73	.	.	.	.	5	0.62		
TOTAAL	684	100.00	100	100.00	21	100.00	805	100.00	705	100.00

Tabel 3.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	57	8.33	4	4.00	.	.	61	7.58	76	10.64
februari	46	6.73	7	7.00	2	9.52	55	6.83	46	6.44
maart	60	8.77	9	9.00	1	4.76	70	8.70	64	8.96
april	63	9.21	19	19.00	1	4.76	83	10.31	50	7.00
mei	37	5.41	7	7.00	.	.	44	5.47	41	5.74
juni	88	12.87	6	6.00	.	.	94	11.68	66	9.24
juli	46	6.73	6	6.00	.	.	52	6.46	48	6.72
augustus	44	6.43	9	9.00	3	14.29	56	6.96	62	8.68
september	74	10.82	10	10.00	1	4.76	85	10.56	75	10.50
oktober	50	7.31	10	10.00	.	.	60	7.45	64	8.96
november	74	10.82	3	3.00	5	23.81	82	10.19	69	9.66
december	45	6.58	9	9.00	8	38.10	62	7.70	52	7.28
onbekend	.	.	1	1.00	.	.	1	0.12	1	0.14
TOTAAL	684	100.00	100	100.00	21	100.00	805	100.00	714	100.00

Tabel 3.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	297	82.96	367	83.03	5	100.00	669	83.11	567	80.43
HIV-test	52	14.53	52	11.76	.	.	104	12.92	124	17.59
beide	8	2.23	21	4.75	.	.	29	3.60	13	1.84
onbekend	1	0.28	2	0.45	.	.	3	0.37	1	0.14
TOTAAL	358	100.00	442	100.00	5	100.00	805	100.00	705	100.00

Tabel 3.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	1	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	6	92	1	.	99	127
SOA positief, geen HIV test	196	.	3	.	199	223
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	2	.	2	.
SOA negatief, geen HIV test	467	10	5	3	485	353
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	2	17	.	19	9
TOTAAL	669	104	29	3	805	714

Tabel 3.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	1	0.23	.	.	1	0.12	7	0.99
15-19	12	3.35	69	15.61	1	20.00	82	10.19	56	7.94
20-24	56	15.64	140	31.67	2	40.00	198	24.60	176	24.96
25-29	84	23.46	101	22.85	1	20.00	186	23.11	173	24.54
30-34	52	14.53	44	9.95	1	20.00	97	12.05	98	13.90
35-39	61	17.04	27	6.11	.	.	88	10.93	77	10.92
40-44	30	8.38	30	6.79	.	.	60	7.45	41	5.82
45-54	38	10.61	23	5.20	.	.	61	7.58	51	7.23
>54	22	6.15	.	.	.	.	22	2.73	24	3.40
??	3	0.84	7	1.58	.	.	10	1.24	2	0.28
TOTAAL	358	100.00	442	100.00	5	100.00	805	100.00	705	100.00

Tabel 3.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	316	88.27	328	74.21	5	100.00	649	80.62	564	800.00
Turkije	5	1.40	1	0.23	.	.	6	0.75	3	0.43
Marokko	1	0.28	6	1.36	.	.	7	0.87	5	0.71
Sur./ Ant./ Aru.	2	0.56	7	1.58	.	.	9	1.12	10	1.42
overig	34	9.50	100	22.62	.	.	134	16.65	122	17.30
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.14
TOTAAL	358	100.00	442	100.00	5	100.00	805	100.00	705	100.00

Tabel 3.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	245	68.44	243	76.66
homoseksueel	85	23.74	51	16.09
biseksueel	24	6.70	23	7.26
onbekend	4	1.12	.	.
TOTAAL	358	100.00	317	100.00

Tabel 3.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	3	0.84	135	30.54	.	.	138	17.14	98	13.92
prostituant(e)	29	8.10	2	0.45	.	.	31	3.85	36	5.11
geen van beide	319	89.11	296	66.97	5	100.00	620	77.02	565	80.26
onbekend	7	1.96	9	2.04	.	.	16	1.99	5	0.71
TOTAAL	358	100.00	442	100.00	5	100.00	805	100.00	704	100.00

Tabel 3.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	71	19.83	71	16.06	.	.	142	17.64	4	0.57
Ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	102	14.47
nee	273	76.26	357	80.77	5	100.00	635	78.88	586	83.12
onbekend	14	3.91	14	3.17	.	.	28	3.48	13	1.84
TOTAAL	358	100.00	442	100.00	5	100.00	805	100.00	705	100.00

Tabel 3.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	8	2.2	2	0.4	.	.	10	1.2	12	1.6
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	1	0.3	4	0.9	.	.	5	0.6	1	0.1
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	13	1.8
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	28	7.8	39	8.6	.	.	67	8.2	48	6.5
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	3	0.7	.	.	3	0.4	2	0.3
" : primo:HSV-type1&2	1	0.3	.	.	.	.	1	0.1	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	2	0.4	.	.	2	0.2	1	0.1
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1.0
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
Genitale wratten	30	8.3	14	3.1	.	.	44	5.4	18	2.5
Hepatitis B: acuut	.	.	2	0.4	.	.	2	0.2	1	0.1
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
Niet Specifieke Urethritis	3	0.8	2	0.4	.	.	5	0.6	8	1.1
Bacteriele Vaginose	.	.	22	4.9	.	.	22	2.7	46	6.3
Trichomoniasis	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	3	0.4
Candidiasis	5	1.4	34	7.5	.	.	39	4.8	59	8.0
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	4	1.1	5	1.1	1	20.0	10	1.2	21	2.9
PID	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	.	.
HIV +	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>80</i>	<i>22.2</i>	<i>133</i>	<i>29.4</i>	<i>1</i>	<i>20.0</i>	<i>214</i>	<i>26.1</i>	<i>248</i>	<i>33.8</i>
HIV -	56	15.5	64	14.1	.	.	120	14.7	138	18.8
Nihil *	225	62.3	256	56.5	4	80.0	485	59.2	348	47.4
TOTAAL	361	100	453	100	5	100	819	100	734	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 3.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	1	12.5	.	.	2	25.0	4	50.0	.	.	1	12.5	.	.	.	.	8
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	.	.	3	10.7	11	39.3	4	14.3	5	17.9	1	3.6	2	7.1	2	7.1	.	.	28
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	1	3.3	3	10.0	6	20.0	8	26.7	5	16.7	1	3.3	4	13.3	2	6.7	.	.	30
overig	.	.	.	.	2	16.7	3	25.0	2	16.7	2	16.7	1	8.3	1	8.3	1	8.3	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	11	3.9	46	16.4	63	22.4	37	13.2	46	16.4	27	9.6	30	10.7	18	6.4	3	1.1	281
TOTAAL	.	.	12	3.3	56	15.5	84	23.3	53	14.7	62	17.2	30	8.3	38	10.5	23	6.4	3	0.8	361

Tabel 3.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	2	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	50.0	.	.	.	.	4
Chlamydia	.	.	8	20.5	14	35.9	10	25.6	1	2.6	1	2.6	3	7.7	2	5.1	.	.	.	.	39
herpes genitalis	.	.	2	40.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40.0	.	.	.	.	1	20.0	5
genitale wratten	.	.	2	14.3	6	42.9	3	21.4	.	.	1	7.1	2	14.3	.	.	.	.	.	.	14
overig	.	.	15	22.1	22	32.4	12	17.6	7	10.3	4	5.9	4	5.9	2	2.9	.	.	2	2.9	68
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	1
Nihil *	1	0.3	44	13.8	100	31.4	77	24.2	36	11.3	21	6.6	19	6.0	17	5.3	.	.	3	0.9	318
TOTAAL	1	0.2	73	16.2	143	31.7	103	22.8	44	9.8	27	6.0	30	6.7	23	5.1	.	.	7	1.6	451

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 3.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	10	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	4	80.0	.	.	5
Chlamydia infectie	56	83.6	.	.	.	.	5	7.5	6	9.0	.	.	67
Herpes genitalis	6	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Genitale wratten	35	79.5	1	2.3	1	2.3	.	.	7	15.9	.	.	44
Overig	59	72.8	2	2.5	2	2.5	2	2.5	16	19.8	.	.	81
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	491	81.4	4	0.7	5	0.8	3	0.5	100	16.6	.	.	603
TOTAAL	658	80.5	7	0.9	8	1.0	10	1.2	134	16.4	.	.	817

Tabel 3.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	4	50.0	4	50.0	.	.	.	.	8
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	24	85.7	3	10.7	1	3.6	.	.	28
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	19	63.3	11	36.7	.	.	.	.	30
Overig	10	83.3	1	8.3	1	8.3	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	188	66.9	67	23.8	22	7.8	4	1.4	281
TOTAAL	247	68.4	86	23.8	24	6.6	4	1.1	361

Tabel 3.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	8	100.0	.	.	8
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	27	96.4	1	3.6	28
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	.	.	2	6.7	28	93.3	.	.	30
Overig	.	.	2	16.7	10	83.3	.	.	12
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	3	1.1	25	8.9	247	87.9	6	2.1	281
TOTAAL	3	0.8	29	8.0	322	89.2	7	1.9	361

Tabel 3.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	2	50.0	.	.	2	50.0	.	.	4
Chlamydia infectie	7	17.9	1	2.6	31	79.5	.	.	39
Herpes genitalis	.	.	.	.	5	100.0	.	.	5
Genitale wratten	1	7.1	.	.	13	92.9	.	.	14
Overig	23	33.8	.	.	44	64.7	1	1.5	68
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	102	32.1	1	0.3	207	65.1	8	2.5	318
TOTAAL	136	30.2	2	0.4	304	67.4	9	2.0	451

Tabel 3.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	4	40.0	4	40.0	2	20.0	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	5	100.0	.	.	5
Chlamydia infectie	10	14.9	56	83.6	1	1.5	67
Herpes genitalis	.	.	6	100.0	.	.	6
Genitale wratten	8	18.2	36	81.8	.	.	44
Overig	16	19.8	64	79.0	1	1.2	81
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	106	17.6	472	78.3	25	4.1	603
TOTAAL	144	17.6	644	78.8	29	3.5	817

4: GGD Hart voor Brabant

Tabel 4.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	266	49.91	102	54.26	.	.	368	50.97	342	49.93
vrouw	267	50.09	86	45.74	1	100.00	354	49.03	343	50.07
TOTAAL	533	100.00	188	100.00	1	100.00	722	100.00	685	100.00

Tabel 4.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	30	5.63	11	5.85	.	.	41	5.68	58	8.44
februari	29	5.44	10	5.32	.	.	39	5.40	60	8.73
maart	42	7.88	30	15.96	.	.	72	9.97	43	6.26
april	38	7.13	14	7.45	.	.	52	7.20	51	7.42
mei	31	5.82	13	6.91	.	.	44	6.09	49	7.13
juni	42	7.88	18	9.57	.	.	60	8.31	54	7.86
juli	37	6.94	7	3.72	.	.	44	6.09	64	9.32
augustus	57	10.69	20	10.64	.	.	77	10.66	52	7.57
september	57	10.69	15	7.98	1	100.00	73	10.11	60	8.73
oktober	50	9.38	9	4.79	.	.	59	8.17	75	10.92
november	61	11.44	20	10.64	.	.	81	11.22	66	9.61
december	59	11.07	21	11.17	.	.	80	11.08	53	7.71
onbekend	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.29
TOTAAL	533	100.00	188	100.00	1	100.00	722	100.00	687	100.00

Tabel 4.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.								
SOA-onderzoek	263	71.47	265	74.86	528	73.13	532	77.66
HIV-test	104	28.26	83	23.45	187	25.90	150	21.90
beide	.	.	3	0.85	3	0.42	.	.
onbekend	1	0.27	3	0.85	4	0.55	3	0.44
TOTAAL	368	100.00	354	100.00	722	100.00	685	100.00

Tabel 4.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	1	185	1	1	188	153
SOA positief, geen HIV test	142	.	1	.	143	177
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, geen HIV test	385	2	.	3	390	.
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	1	.	1	357
TOTAAL	528	187	3	4	722	687

Tabel 4.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD								
14	1	0.27	1	0.28	2	0.28	1	0.15
15-19	25	6.79	66	18.64	91	12.60	63	9.20
20-24	84	22.83	129	36.44	213	29.50	210	30.66
25-29	110	29.89	80	22.60	190	26.32	159	23.21
30-34	41	11.14	30	8.47	71	9.83	97	14.16
35-39	43	11.68	20	5.65	63	8.73	56	8.18
40-44	16	4.35	13	3.67	29	4.02	35	5.11
45-54	37	10.05	10	2.82	47	6.51	40	5.84
>54	10	2.72	4	1.13	14	1.94	16	2.34
??	1	0.27	1	0.28	2	0.28	8	1.17
TOTAAL	368	100.00	354	100.00	722	100.00	685	100.00

Tabel 4.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST								
Nederland	303	82.34	307	86.72	610	84.49	554	80.88
Turkije	4	1.09	2	0.56	6	0.83	10	1.46
Marokko	2	0.54	2	0.56	4	0.55	6	0.88
Sur./ Ant./ Aru.	19	5.16	8	2.26	27	3.74	34	4.96
overig	38	10.33	35	9.89	73	10.11	71	10.36
onbekend	2	0.54	.	.	2	0.28	10	1.46
TOTAAL	368	100.00	354	100.00	722	100.00	685	100.00

Tabel 4.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	308	83.70	289	84.50
homoseksueel	41	11.14	33	9.65
biseksueel	19	5.16	15	4.39
onbekend	.	.	5	1.46
TOTAAL	368	100.00	342	100.00

Tabel 4.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE								
prostituë(e)	2	0.54	6	1.69	8	1.11	22	3.23
prostituant(e)	29	7.88	.	.	29	4.02	43	6.30
geen van beide	334	90.76	347	98.02	681	94.32	613	89.88
onbekend	3	0.82	1	0.28	4	0.55	4	0.59
TOTAAL	368	100.00	354	100.00	722	100.00	682	100.00

Tabel 4.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE								
ja, ooit een SOA	68	18.48	59	16.67	127	17.59	1	0.15
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	122	17.81
nee	296	80.43	293	82.77	589	81.58	546	79.71
onbekend	4	1.09	2	0.56	6	0.83	16	2.34
TOTAAL	368	100.00	354	100.00	722	100.00	685	100.00

Tabel 4.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
Gonorroë (excl.PVG)	8	2.1	2	0.6	10	1.4	6	0.9
Gonorroë: PVG	2	0.5	1	0.3	3	0.4	4	0.6
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.3	.	.	1	0.1	.	.
" : primair	1	0.3	1	0.3	2	0.3	2	0.3
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	1	0.3	.	.	1	0.1	.	.
Chlamydia infectie	33	8.8	28	7.8	61	8.3	98	14.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	1	0.3	1	0.3	2	0.3	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	6	1.6	5	1.4	11	1.5	10	1.5
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	12	3.2	.	.	12	1.6	15	2.2
Bacteriele Vaginose	.	.	25	7.0	25	3.4	8	1.2
Trichomoniasis	.	.	5	1.4	5	0.7	3	0.4
Candidiasis	7	1.9	13	3.6	20	2.7	33	4.8
Schaamluis	1	0.3	.	.	1	0.1	1	0.1
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	1	0.3	1	0.1	.	.
PID	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	73	19.5	82	22.9	155	21.2	180	26.1
HIV -	102	27.2	87	24.2	189	25.7	152	22.1
Nihil *	200	53.3	190	52.9	390	53.1	357	51.8
TOTAAL	375	100	359	100	734	100	689	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 4.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	10.0	1	10.0	5	50.0	1	10.0	1	10.0	.	.	.	.	1	10.0	.	.	10
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	3	9.1	11	33.3	10	30.3	4	12.1	1	3.0	1	3.0	3	9.1	.	.	.	.	33
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	.	.	1	16.7	3	50.0	.	.	.	.	1	6.7	.	.	1	16.7	.	.	6
overig	.	.	2	9.1	1	4.5	6	27.3	4	18.2	3	13.6	2	9.1	1	4.5	3	13.6	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	0.3	20	6.6	72	23.8	86	28.5	33	10.9	38	12.6	12	4.0	33	10.9	6	2.0	1	0.3	302
TOTAAL	1	0.3	26	6.9	86	22.9	112	29.9	42	11.2	43	11.5	16	4.3	37	9.9	11	2.9	1	0.3	375

Tabel 4.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	3
Syf.: Pr. & S.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	8	28.6	8	28.6	8	28.6	2	7.1	.	.	.	.	2	7.1	.	.	.	.	28
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	2	40.0	2	40.0	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
overig	.	.	8	18.2	18	40.9	9	20.5	3	6.8	3	6.8	.	.	2	4.5	1	2.3	.	.	44
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	1	0.4	49	17.7	101	36.5	64	23.1	23	8.3	17	6.1	12	4.3	6	2.2	3	1.1	1	0.4	277
TOTAAL	1	0.3	69	19.2	130	36.2	81	22.6	30	8.4	20	5.6	13	3.6	10	2.8	4	1.1	1	0.3	359

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 4.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	8	61.5	.	.	.	.	2	15.4	3	23.1	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	47	77.0	.	.	1	1.6	6	9.8	7	11.5	.	.	61
Herpes genitalis	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Genitale wratten	5	45.5	1	9.1	.	.	2	18.2	3	27.3	.	.	11
Overig	53	80.3	.	.	.	.	3	4.5	10	15.2	.	.	66
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	501	86.5	5	0.9	3	0.5	17	2.9	51	8.8	2	0.3	579
TOTAAL	616	83.9	6	0.8	4	0.5	30	4.1	76	10.4	2	0.3	734

Tabel 4.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	5	50.0	4	40.0	1	10.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	31	93.9	1	3.0	1	3.0	.	.	33
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	4	66.7	1	16.7	1	16.7	.	.	6
Overig	14	63.6	8	36.4	.	.	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	258	85.4	28	9.3	16	5.3	.	.	302
TOTAAL	314	83.7	42	11.2	19	5.1	.	.	375

Tabel 4.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitutué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	.	.	.	.	10	100.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	1	3.0	32	97.0	.	.	33
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	.	.	.	.	6	100.0	.	.	6
Overig	.	.	2	9.1	20	90.9	.	.	22
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	2	0.7	26	8.6	271	89.7	3	1.0	302
TOTAAL	2	0.5	29	7.7	341	90.9	3	0.8	375

Tabel 4.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	27	96.4	1	3.6	28
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	1	20.0	.	.	4	80.0	.	.	5
Overig	.	.	.	.	44	100.0	.	.	44
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	5	1.8	.	.	272	98.2	.	.	277
TOTAAL	6	1.7	.	.	352	98.1	1	0.3	359

Tabel 4.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	3	23.1	10	76.9	.	.	13
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	2	100.0	.	.	2
Chlamydia infectie	16	26.2	44	72.1	1	1.6	61
Herpes genitalis	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	4	36.4	7	63.6	.	.	11
Overig	22	33.3	44	66.7	.	.	66
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	85	14.7	489	84.5	5	0.9	579
TOTAAL	130	17.7	598	81.5	6	0.8	734

5: GGD Arnhem

Tabel 5.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	124	23.40	20	64.52	68	46.58	212	29.99	209	27.72
vrouw	401	75.66	11	35.48	78	53.42	490	69.31	540	72.28
onbekend	5	0.94	.	.	.	.	5	0.71		
TOTAAL	530	100.00	31	100.00	146	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	37	6.98	3	9.68	21	14.38	61	8.63	60	8.01
februari	32	6.04	.	.	18	12.33	50	7.07	49	6.54
maart	44	8.30	4	12.90	9	6.16	57	8.06	63	8.41
april	46	8.68	7	22.58	10	6.85	63	8.91	71	9.48
mei	38	7.17	6	19.35	9	6.16	53	7.50	47	6.28
juni	50	9.43	1	3.23	11	7.53	62	8.77	89	11.88
juli	39	7.36	1	3.23	16	10.96	56	7.92	72	9.61
augustus	43	8.11	6	19.35	13	8.90	62	8.77	66	8.81
september	69	13.02	2	6.45	6	4.11	77	10.89	56	7.48
oktober	44	8.30	.	.	12	8.22	56	7.92	63	8.41
november	52	9.81	1	3.23	10	6.85	63	8.91	54	7.21
december	36	6.79	.	.	11	7.53	47	6.65	59	7.88
TOTAAL	530	100.00	31	100.00	146	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	124	58.49	398	81.22	5	100.00	527	74.54	567	75.70
HIV-test	19	8.96	10	2.04	.	.	29	4.10	68	9.08
Beide	69	32.55	78	15.92	.	.	147	20.79	113	15.09
Onbekend	.	.	4	0.82	.	.	4	0.57	1	0.13
TOTAAL	212	100.00	490	100.00	5	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	1	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	29	1	.	30	68
SOA positief, geen HIV test	185	.	.	2	187	200
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	11	1	12	11
SOA negatief, geen HIV test	342	.	.	1	343	370
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	134	.	134	100
TOTAAL	527	29	147	4	707	749

Tabel 5.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	2	0.94	1	0.20	.	.	3	0.42	.	.
15-19	7	3.30	30	6.12	.	.	37	5.23	51	6.81
20-24	37	17.45	196	40.00	3	60.00	236	33.38	237	31.64
25-29	48	22.64	108	22.04	1	20.00	157	22.21	178	23.77
30-34	31	14.62	76	15.51	.	.	107	15.13	114	15.22
35-39	24	11.32	28	5.71	.	.	52	7.36	78	10.41
40-44	28	13.21	17	3.47	1	20.00	46	6.51	34	4.54
45-54	22	10.38	25	5.10	.	.	47	6.65	44	5.87
>54	11	5.19	3	0.61	.	.	14	1.98	12	1.60
??	2	0.94	6	1.22	.	.	8	1.13	1	0.13
TOTAAL	212	100.00	490	100.00	5	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	182	85.85	295	60.20	3	60.00	480	67.89	519	69.29
Turkije	.	.	1	0.20	.	.	1	0.14	3	0.40
Marokko	3	1.42	3	0.61	.	.	6	0.85	7	0.93
Sur./ Ant./ Aru.	11	5.19	14	2.86	.	.	25	3.54	26	3.47
overig	9	4.25	170	34.69	2	40.00	181	25.60	161	21.50
onbekend	7	3.30	7	1.43	.	.	14	1.98	33	4.41
TOTAAL	212	100.00	490	100.00	5	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	154	72.64	157	75.12
homoseksueel	43	20.28	37	17.70
biseksueel	11	5.19	13	6.22
onbekend	4	1.89	2	0.96
TOTAAL	212	100.00	209	100.00

Tabel 5.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	4	1.89	309	63.06	3	60.00	316	44.70	359	47.99
prostituant(e)	23	10.85	1	0.20	.	.	24	3.39	31	4.14
geen van beide	179	84.43	176	35.92	2	40.00	357	50.50	347	46.39
onbekend	6	2.83	4	0.82	.	.	10	1.41	11	1.47
TOTAAL	212	100.00	490	100.00	5	100.00	707	100.00	748	100.00

Tabel 5.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	40	18.87	157	32.04	2	40.00	199	28.15	.	.
Ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	181	24.17
nee	162	76.42	294	60.00	3	60.00	459	64.92	447	59.68
onbekend	10	4.72	39	7.96	.	.	49	6.93	121	16.15
TOTAAL	212	100.00	490	100.00	5	100.00	707	100.00	749	100.00

Tabel 5.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		Onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorrhoe (excl.PVG)	4	1.9	6	1.2	.	.	10	1.4	18	2.3
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	12	5.6	35	6.7	.	.	47	6.4	59	7.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
" : primo: HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	8	3.8	4	0.8	.	.	12	1.6	6	0.8
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Bacteriele Vaginose	1	0.5	120	23.1	3	60.0	124	16.8	119	14.9
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Candidiasis	.	.	22	4.2	.	.	22	3.0	29	3.6
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
Scabies	.	.	1	0.2	.	.	1	0.1	2	0.3
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0.8
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.5	.	.	.	.	1	0.1	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	26	12.3	189	36.5	3	60.0	218	29.6	.	.
HIV -	87	40.8	89	17.1	.	.	176	23.9	179	22.5
Nihil *	100	46.9	241	46.4	2	40.0	343	46.5	370	46.5
TOTAAL	213	100	519	100	5	100	737	100	796	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 5.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	25.0	1	25.0	.	.	1	25.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	1	8.3	1	8.3	5	41.7	3	25.0	1	8.3	1	8.3	.	.	.	.	.	.	12
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	1	12.5	.	.	3	37.5	3	37.5	.	.	.	.	.	.	.	1	12.5	.	8
Overig	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	1
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	1
Nihil *	2	1.1	4	2.2	35	18.8	40	21.5	24	12.9	22	11.8	27	14.5	22	11.8	9	4.8	1	0.5	186
TOTAAL	2	0.9	7	3.3	37	17.5	48	22.6	31	14.6	24	11.3	28	13.2	22	10.4	11	5.2	2	0.9	212

Tabel 5.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		Totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	4	11.4	20	57.1	7	20.0	1	2.9	1	2.9	1	2.9	1	2.9	.	.	.	.	35
herpes genitalis	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	.	.	3	75.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
overig	1	0.7	9	6.3	61	42.7	29	20.3	22	15.4	7	4.9	2	1.4	11	7.7	.	.	1	0.7	143
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	16	5.0	122	38.2	72	22.6	53	16.6	20	6.3	14	4.4	14	4.4	3	0.9	5	1.6	319
TOTAAL	1	0.2	30	5.9	209	41.1	111	21.9	77	15.2	28	5.5	17	3.3	26	5.1	3	0.6	6	1.2	508

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 5.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	5	50.0	.	.	.	.	.	.	3	30.0	2	20.0	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	30	63.8	1	2.1	.	.	8	17.0	6	12.8	2	4.3	47
Herpes genitalis	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Genitale wratten	12	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Overig	83	56.5	.	.	1	0.7	4	2.7	55	37.4	4	2.7	147
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	362	71.4	.	.	5	1.0	15	3.0	119	23.5	6	1.2	507
TOTAAL	493	68.0	1	0.1	6	0.8	27	3.7	184	25.4	14	1.9	725

Tabel 5.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	4	100.0	.	.	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	11	91.7	1	8.3	.	.	.	.	12
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	2	25.0	4	50.0	.	.	2	25.0	8
Overig	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	139	74.7	34	18.3	11	5.9	2	1.1	186
TOTAAL	154	72.6	43	20.3	11	5.2	4	1.9	212

Tabel 5.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituë		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	2	50.0	.	.	2	50.0	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	12	100.0	.	.	12
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	7	87.5	1	12.5	8
Overig	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	2	1.1	23	12.4	156	83.9	5	2.7	186
TOTAAL	4	1.9	23	10.8	179	84.4	6	2.8	212

Tabel 5.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituëe		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	4	66.7	.	.	2	33.3	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	37.1	.	.	21	60.0	1	2.9	35
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	1	25.0	.	.	3	75.0	.	.	4
Overig	100	69.9	.	.	42	29.4	1	0.7	143
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	197	61.8	1	0.3	118	37.0	3	0.9	319
TOTAAL	315	62.0	1	0.2	187	36.8	5	1.0	508

Tabel 5.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	4	40.0	6	60.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	27.7	28	59.6	6	12.8	47
Herpes genitalis	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	3	25.0	9	75.0	.	.	12
Overig	53	36.1	83	56.5	11	7.5	147
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	132	26.0	339	66.9	36	7.1	507
TOTAAL	205	28.3	467	64.4	53	7.3	725

6: GGD Oostelijk Zuid Limburg

Tabel 6.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	171	61.51	71	68.93	180	66.18	422	64.62		
vrouw	107	38.49	32	31.07	92	33.82	231	35.38		
TOTAAL	278	100.00	103	100.00	272	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	10	3.60	20	19.42	62	22.79	92	14.09		
februari	19	6.83	10	9.71	28	10.29	57	8.73		
maart	21	7.55	8	7.77	29	10.66	58	8.88		
april	26	9.35	9	8.74	24	8.82	59	9.04		
mei	15	5.40	9	8.74	12	4.41	36	5.51		
juni	4	1.44	1	0.97	3	1.10	8	1.23		
juli	10	3.60	3	2.91	5	1.84	18	2.76		
augustus	23	8.27	4	3.88	14	5.15	41	6.28		
september	27	9.71	4	3.88	13	4.78	44	6.74		
oktober	23	8.27	4	3.88	18	6.62	45	6.89		
november	71	25.54	19	18.45	48	17.65	138	21.13		
december	29	10.43	12	11.65	16	5.88	57	8.73		
TOTAAL	278	100.00	103	100.00	272	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.								
SOA-onderzoek	169	40.05	107	46.32	276	42.27		
HIV-test	67	15.88	28	12.12	95	14.55		
beide	185	43.84	96	41.56	281	43.03		
onbekend	1	0.24	.	.	1	0.15		
TOTAAL	422	100.00	231	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	2	.	2	.	4	
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	90	8	1	99	
SOA positief, geen HIV test	33	.	3	.	36	
SOA positief, HIV positief	.	.	3	.	3	
SOA positief, HIV negatief	2	.	11	.	13	
SOA negatief, geen HIV test	228	1	13	.	242	
SOA negatief, HIV positief	2	.	7	.	9	
SOA negatief, HIV negatief	9	4	234	.	247	
TOTAAL	276	95	281	1	653	400

Tabel 6.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD								
14	2	0.47	4	1.73	6	0.92		
15-19	8	1.90	32	13.85	40	6.13		
20-24	45	10.66	53	22.94	98	15.01		
25-29	64	15.17	31	13.42	95	14.55		
30-34	69	16.35	33	14.29	102	15.62		
35-39	79	18.72	33	14.29	112	17.15		
40-44	48	11.37	20	8.66	68	10.41		
45-54	71	16.82	16	6.93	87	13.32		
>54	33	7.82	5	2.16	38	5.82		
??	3	0.71	4	1.73	7	1.07		
TOTAAL	422	100.00	231	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST								
Nederland	381	90.28	196	84.85	577	88.36		
Turkije	.	.	.	.	.	.		
Marokko	1	0.24	1	0.43	2	0.31		
Sur./ Ant./ Aru.	9	2.13	1	0.43	10	1.53		
overig	27	6.40	30	12.99	57	8.73		
onbekend	4	0.95	3	1.30	7	1.07		
TOTAAL	422	100.00	231	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	241	57.11		
homoseksueel	121	28.67		
biseksueel	44	10.43		
onbekend	16	3.79		
TOTAAL	422	100.00		

Tabel 6.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE								
prostituë(e)	16	3.79	78	33.77	94	14.40		
prostituant(e)	55	13.03	1	0.43	56	8.58		
geen van beide	272	64.45	117	50.65	389	59.57		
onbekend	79	18.72	35	15.15	114	17.46		
TOTAAL	422	100.00	231	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE								
ja, ooit een SOA	98	23.22	47	20.35	145	22.21		
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.		
nee	246	58.29	148	64.07	394	60.34		
onbekend	78	18.48	36	15.58	114	17.46		
TOTAAL	422	100.00	231	100.00	653	100.00	400	100.00

Tabel 6.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
Gonorroë (excl.PVG)	5	1.2	.	.	5	0.7		
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.		
Syfilis: niet gespecificeerd	1	0.2	.	.	1	0.1		
" : primair	.	.	.	.	.	.		
" : secundair	.	.	.	.	.	.		
" : latens recens	.	.	.	.	.	.		
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.		
Chlamydia infectie	7	1.6	8	3.4	15	2.2		
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	2	0.8	2	0.3		
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.		
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.		
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.		
" : recidief	.	.	2	0.8	2	0.3		
Genitale wratten	4	0.9	1	0.4	5	0.7		
Hepatitis B: acuut	1	0.2	.	.	1	0.1		
Hepatitis B: chronisch	11	2.5	4	1.7	15	2.2		
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.		
Bacteriele Vaginose	.	.	.	.	.	.		
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.		
Candidiasis	2	0.5	2	0.8	4	0.6		
Schaamluis	1	0.2	.	.	1	0.1		
Scabies	.	.	.	.	.	.		
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.		
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.		
Overig/ niet gespecificeerd	1	0.2	1	0.4	2	0.3		
PID	.	.	.	.	.	.		
HIV +	15	3.5	1	0.4	16	2.4		
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>48</i>	<i>11.1</i>	<i>21</i>	<i>8.9</i>	<i>69</i>	<i>10.3</i>		
HIV -	236	54.5	123	51.9	359	53.6		
Nihil *	149	34.4	93	39.2	242	36.1		
TOTAAL	433	100	237	100	670	100		

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 6.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	.	1	20.0	2	40.0	1	20.0	.	.	.	.	5
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	7
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	2	50.0	.	.	.	.	1	25.0	1	25.0	.	.	.	.	4
overig	.	.	.	.	1	5.9	1	5.9	3	17.6	3	17.6	3	17.6	6	35.3	.	.	.	.	17
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	6.7	5	33.3	4	26.7	4	26.7	1	6.7	.	.	.	.	15
Nihil *	2	0.5	8	2.1	40	10.6	58	15.3	62	16.4	72	19.0	38	10.1	62	16.4	33	8.7	3	0.8	378
TOTAAL	2	0.5	8	1.9	45	10.6	64	15.0	71	16.7	81	19.0	48	11.3	71	16.7	33	7.7	3	0.7	426

Tabel 6.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	1	12.5	1	12.5	4	50.0	1	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12.5	8
herpes genitalis	.	.	1	25.0	2	50.0	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
overig	1	14.3	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	1	14.3	3	42.9	.	.	.	.	.	.	7
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	2	1.0	29	13.8	46	21.9	29	13.8	31	14.8	32	15.2	17	8.1	16	7.6	5	2.4	3	1.4	210
TOTAAL	4	1.7	32	13.9	53	22.9	31	13.4	33	14.3	33	14.3	20	8.7	16	6.9	5	2.2	4	1.7	231

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 6.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	4	80.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20.0	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	86.7	.	.	.	.	1	6.7	.	.	1	6.7	15
Herpes genitalis	4	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Genitale wratten	5	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Overig	20	83.3	.	.	.	.	.	.	3	12.5	1	4.2	24
HIV+	15	93.8	.	.	.	.	.	.	1	6.3	.	.	16
Nihil	520	88.4	.	.	2	0.3	9	1.5	53	9.0	4	0.7	588
TOTAAL	581	88.4	.	.	2	0.3	10	1.5	57	8.7	7	1.1	657

Tabel 6.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	3	60.0	.	.	2	40.0	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	7	100.0	.	.	.	.	.	.	7
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	3	75.0	1	25.0	.	.	.	.	4
Overig	11	64.7	3	17.6	2	11.8	1	5.9	17
HIV+	6	40.0	5	33.3	1	6.7	3	20.0	15
Nihil	215	56.9	112	29.6	39	10.3	12	3.2	378
TOTAAL	245	57.5	121	28.4	44	10.3	16	3.8	426

Tabel 6.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	1	20.0	3	60.0	1	20.0	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	1	14.3	4	57.1	2	28.6	7
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Overig	.	.	2	11.8	9	52.9	6	35.3	17
HIV+	.	.	1	6.7	8	53.3	6	40.0	15
Nihil	16	4.2	51	13.5	245	64.8	66	17.5	378
TOTAAL	16	3.8	56	13.1	273	64.1	81	19.0	426

Tabel 6.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	12.5	.	.	5	62.5	2	25.0	8
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	50.0	2	50.0	4
Genitale wratten	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Overig	3	42.9	.	.	3	42.9	1	14.3	7
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1
Nihil	74	35.2	1	0.5	106	50.5	29	13.8	210
TOTAAL	78	33.8	1	0.4	117	50.6	35	15.2	231

Tabel 6.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	3	60.0	2	40.0	.	.	5
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	6.7	13	86.7	1	6.7	15
Herpes genitalis	2	50.0	2	50.0	.	.	4
Genitale wratten	2	40.0	3	60.0	.	.	5
Overig	7	29.2	10	41.7	7	29.2	24
HIV+	6	37.5	3	18.8	7	43.8	16
Nihil	126	21.4	362	61.6	100	17.0	588
TOTAAL	147	22.4	395	60.1	115	17.5	657

7: GGD Twente

Tabel 7.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
man	144	29.69	65	51.59	209	34.21		
vrouw	341	70.31	61	48.41	402	65.79		
TOTAAL	485	100.00	126	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND								
januari	33	6.80	12	9.52	45	7.36		
februari	37	7.63	14	11.11	51	8.35		
maart	68	14.02	9	7.14	77	12.60		
april	58	11.96	12	9.52	70	11.46		
mei	33	6.80	10	7.94	43	7.04		
juni	35	7.22	5	3.97	40	6.55		
juli	31	6.39	13	10.32	44	7.20		
augustus	40	8.25	2	1.59	42	6.87		
september	40	8.25	14	11.11	54	8.84		
oktober	31	6.39	8	6.35	39	6.38		
november	49	10.10	17	13.49	66	10.80		
december	30	6.19	10	7.94	40	6.55		
TOTAAL	485	100.00	126	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.								
SOA-onderzoek	92	44.02	68	16.92	160	26.19		
HIV-test	65	31.10	61	15.17	126	20.62		
beide	52	24.88	273	67.91	325	53.19		
TOTAAL	209	100.00	402	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG					
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	126	.	126	.
SOA positief, geen HIV test	78	.	58	136	.
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	.	.	.
SOA negatief, geen HIV test	82	.	267	349	.
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	.	.	.
TOTAAL	160	126	325	611	130

Tabel 7.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD								
14	4	1.91	3	0.75	7	1.15		
15-19	12	5.74	69	17.16	81	13.26		
20-24	39	18.66	119	29.60	158	25.86		
25-29	47	22.49	95	23.63	142	23.24		
30-34	32	15.31	64	15.92	96	15.71		
35-39	29	13.88	30	7.46	59	9.66		
40-44	15	7.18	13	3.23	28	4.58		
45-54	19	9.09	5	1.24	24	3.93		
>54	12	5.74	2	0.50	14	2.29		
??	.	.	2	0.50	2	0.33		
TOTAAL	209	100.00	402	100.00	611	100.00	130	100.0

Tabel 7.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST								
Nederland	187	89.47	144	35.82	331	54.17		
Turkije	3	1.44	.	.	3	0.49		
Marokko	.	.	1	0.25	1	0.16		
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.		
overig	19	9.09	257	63.93	276	45.17		
onbekend	.	.	.	.	.	.		
TOTAAL	209	100.00	402	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	146	69.86		
homoseksueel	35	16.75		
biseksueel	15	7.18		
onbekend	13	6.22		
TOTAAL	209	100.00		

Tabel 7.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE								
prostituë(e)	.	.	260	64.68	260	42.55		
prostituant(e)	36	17.22	.	.	36	5.89		
geen van beide	167	79.90	133	33.08	300	49.10		
onbekend	6	2.87	9	2.24	15	2.45		
TOTAAL	209	100.00	402	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE								
ja, ooit een SOA	29	13.88	36	8.96	65	10.64		
nee	170	81.34	313	77.86	483	79.05		
onbekend	10	4.78	53	13.18	63	10.31		
TOTAAL	209	100.00	402	100.00	611	100.00	130	100.00

Tabel 7.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE								
Gonorrhoe (excl.PVG)	26	12.4	2	0.5	28	4.6		
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.		
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	13	3.2	13	2.1		
" : primair	1	0.5	1	0.2	2	0.3		
" : secundair	.	.	2	0.5	2	0.3		
" : latens recens	1	0.5	1	0.2	2	0.3		
" : latens tarda	2	1.0	.	.	2	0.3		
Chlamydia infectie	9	4.3	28	7.0	37	6.1		
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	3	1.4	.	.	3	0.5		
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.		
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.		
" : primo: HSV type 2	4	1.9	1	0.2	5	0.8		
" : recidief	1	0.5	.	.	1	0.2		
Genitale wratten	1	0.5	5	1.2	6	1.0		
Hepatitis B: acuut	1	0.5	.	.	1	0.2		
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.		
Niet Specifieke Urethritis	4	1.9	.	.	4	0.7		
Bacteriele Vaginose	.	.	16	4.0	16	2.6		
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.		
Candidiasis	4	1.9	8	2.0	12	2.0		
Schaamluis	1	0.5	1	0.2	2	0.3		
Scabies	.	.	.	.	.	.		
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.		
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.		
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.		
PID	.	.	.	.	.	.		
HIV +	.	.	.	.	.	.		
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>58</i>	<i>27.8</i>	<i>78</i>	<i>19.4</i>	<i>136</i>	<i>22.3</i>		
HIV -	65	31.1	61	15.2	126	20.6		
Nihil *	86	41.1	263	65.4	349	57.1		
TOTAAL	209	100	402	100	611	100		

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 7.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	2	7.7	4	15.4	8	30.8	7	26.9	3	11.5	.	.	2	7.7	.	.	.	.	26
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	.	.	.	.	5	55.6	2	22.2	1	11.1	.	.	.	.	1	11.1	.	.	9
herpes genitalis	.	.	1	12.5	.	.	3	37.5	1	12.5	1	12.5	.	.	1	12.5	1	12.5	.	.	8
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
overig	.	.	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1	7.7	4	30.8	1	7.7	2	15.4	2	15.4	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	4	2.6	8	5.3	34	22.5	29	19.2	21	13.9	20	13.2	13	8.6	14	9.3	8	5.3	.	.	151
TOTAAL	4	1.9	12	5.7	39	18.7	47	22.5	32	15.3	29	13.9	15	7.2	19	9.1	12	5.7	.	.	209

Tabel 7.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	66.7	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	3
Chlamydia	.	.	3	10.7	6	21.4	11	39.3	6	21.4	.	.	.	.	1	3.6	.	.	1	3.6	28
herpes genitalis	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	1	20.0	2	40.0	.	.	1	20.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5
overig	.	.	6	15.4	10	25.6	7	17.9	6	15.4	6	15.4	3	7.7	1	2.6	.	.	.	.	39
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	3	0.9	58	17.9	99	30.6	77	23.8	49	15.1	23	7.1	9	2.8	3	0.9	2	0.6	1	0.3	324
TOTAAL	3	0.7	69	17.2	119	29.6	95	23.6	64	15.9	30	7.5	13	3.2	5	1.2	2	0.5	2	0.5	402

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 7.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	24	85.7	2	7.1	.	.	.	.	2	7.1	.	.	28
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Chlamydia infectie	18	48.6	.	.	.	.	.	.	19	51.4	.	.	37
Herpes genitalis	8	88.9	.	.	.	.	.	.	1	11.1	.	.	9
Genitale wratten	4	66.7	.	.	.	.	.	.	2	33.3	.	.	6
Overig	21	40.4	.	.	.	.	.	.	31	59.6	.	.	52
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	256	53.9	1	0.2	1	0.2	.	.	217	45.7	.	.	475
TOTAAL	331	54.2	3	0.5	1	0.2	.	.	276	45.2	.	.	611

Tabel 7.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	19	73.1	4	15.4	1	3.8	2	7.7	26
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	8	88.9	1	11.1	.	.	.	.	9
Herpes genitalis	4	50.0	1	12.5	3	37.5	.	.	8
Genitale wratten	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Overig	8	61.5	3	23.1	1	7.7	1	7.7	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	106	70.2	25	16.6	10	6.6	10	6.6	151
TOTAAL	146	69.9	35	16.7	15	7.2	13	6.2	209

Tabel 7.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	.	.	4	15.4	21	80.8	1	3.8	26
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	7	77.8	2	22.2	9
Herpes genitalis	.	.	2	25.0	6	75.0	.	.	8
Genitale wratten	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Overig	.	.	5	38.5	8	61.5	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	.	.	24	15.9	124	82.1	3	2.0	151
TOTAAL	.	.	36	17.2	167	79.9	6	2.9	209

Tabel 7.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorrroe	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	2	66.7	.	.	1	33.3	.	.	3
Chlamydia infectie	19	67.9	.	.	8	28.6	1	3.6	28
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	3	60.0	.	.	2	40.0	.	.	5
Overig	30	76.9	.	.	9	23.1	.	.	39
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	206	63.6	.	.	110	34.0	8	2.5	324
TOTAAL	260	64.7	.	.	133	33.1	9	2.2	402

Tabel 7.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	1	3.6	26	92.9	1	3.6	28
Syfilis: Prim. & Sec.	1	25.0	3	75.0	.	.	4
Chlamydia infectie	10	27.0	23	62.2	4	10.8	37
Herpes genitalis	2	22.2	7	77.8	.	.	9
Genitale wratten	1	16.7	4	66.7	1	16.7	6
Overig	1	1.9	44	84.6	7	13.5	52
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	49	10.3	376	79.2	50	10.5	475
TOTAAL	65	10.6	483	79.1	63	10.3	611

8: GGD Den Haag

Tabel 8.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	309	60.95	16	47.06	40	65.57	365	60.63	186	54.55
vrouw	195	38.46	18	52.94	18	29.51	231	38.37	155	45.45
onbekend	3	0.59	.	.	3	4.92	6	1.00		
TOTAAL	507	100.00	34	100.00	61	100.00	602	100.00	341	100.00

Tabel 8.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	38	7.50	2	5.88	2	3.28	42	6.98	23	6.69
februari	35	6.90	3	8.82	2	3.28	40	6.64	18	5.23
maart	53	10.45	2	5.88	11	18.03	66	10.96	31	9.01
april	33	6.51	4	11.76	6	9.84	43	7.14	17	4.94
mei	77	15.19	4	11.76	3	4.92	84	13.95	40	11.63
juni	20	3.94	.	.	1	1.64	21	3.49	36	10.47
juli	42	8.28	4	11.76	5	8.20	51	8.47	36	10.47
augustus	43	8.48	2	5.88	8	13.11	53	8.80	32	9.30
september	44	8.68	3	8.82	6	9.84	53	8.80	26	7.56
oktober	46	9.07	6	17.65	6	9.84	58	9.63	15	4.36
november	48	9.47	4	11.76	3	4.92	55	9.14	25	7.27
december	25	4.93	.	.	7	11.48	32	5.32	42	12.21
onbekend	3	0.59	.	.	1	1.64	4	0.66	3	0.87
TOTAAL	507	100.00	34	100.00	61	100.00	602	100.00	344	100.00

Tabel 8.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	267	73.15	162	70.13	2	33.33	431	71.59	240	70.38
HIV-test	24	6.58	24	10.39	.	.	48	7.97	59	17.30
beide	63	17.26	34	14.72	4	66.67	101	16.78	40	11.73
onbekend	11	3.01	11	4.76	.	.	22	3.65	2	0.59
TOTAAL	365	100.00	231	100.00	6	100.00	602	100.00	341	100.00

Tabel 8.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	1
geen SOA onderzoek, HIV negatief	1	32	.	.	33	56
SOA positief, geen HIV test	231	1	15	12	259	195
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	1	.	2	.	3	3
SOA negatief, geen HIV test	192	6	42	8	248	69
SOA negatief, HIV positief	.	1	.	.	1	.
SOA negatief, HIV negatief	6	7	42	2	57	20
TOTAAL	431	48	101	22	602	344

Tabel 8.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	3	1.30	.	.	3	0.50	4	1.17
15-19	9	2.47	22	9.52	1	16.67	32	5.32	28	8.21
20-24	38	10.41	60	25.97	2	33.33	100	16.61	67	19.65
25-29	78	21.37	54	23.38	1	16.67	133	22.09	94	27.57
30-34	73	20.00	36	15.58	1	16.67	110	18.27	50	14.66
35-39	62	16.99	21	9.09	.	.	83	13.79	30	8.80
40-44	42	11.51	17	7.36	.	.	59	9.80	24	7.04
45-54	35	9.59	12	5.19	.	.	47	7.81	35	10.26
>54	25	6.85	3	1.30	1	16.67	29	4.82	4	1.17
??	3	0.82	3	1.30	.	.	6	1.00	5	1.47
TOTAAL	365	100.00	231	100.00	6	100.00	602	100.00	341	100.00

Tabel 8.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	262	71.78	178	77.06	3	50.00	443	73.59	207	60.70
Turkije	18	4.93	3	1.30	.	.	21	3.49	22	6.45
Marokko	12	3.29	.	.	.	.	12	1.99	12	3.52
Sur./ Ant./ Aru.	15	4.11	15	6.49	1	16.67	31	5.15	33	9.68
overig	52	14.25	30	12.99	2	33.33	84	13.95	57	16.72
onbekend	6	1.64	5	2.16	.	.	11	1.83	10	2.93
TOTAAL	365	100.00	231	100.00	6	100.00	602	100.00	341	100.00

Tabel 8.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	258	70.68	155	83.33
homoseksueel	75	20.55	25	13.44
biseksueel	17	4.66	3	1.61
onbekend	15	4.11	3	1.61
TOTAAL	365	100.00	186	100.00

Tabel 8.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	4	1.10	21	9.09	.	.	25	4.15	26	8.13
prostituant(e)	44	12.05	.	.	1	16.67	45	7.48	40	12.50
geen van beide	208	56.99	158	68.40	3	50.00	369	61.30	237	74.06
onbekend	109	29.86	52	22.51	2	33.33	163	27.08	17	5.31
TOTAAL	365	100.00	231	100.00	6	100.00	602	100.00	320	100.00

Tabel 8.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	82	22.47	30	12.99	.	.	112	18.60	4	1.17
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	75	21.99
nee	239	65.48	166	71.86	5	83.33	410	68.11	204	59.82
onbekend	44	12.05	35	15.15	1	16.67	80	13.29	58	17.01
TOTAAL	365	100.00	231	100.00	6	100.00	602	100.00	341	100.00

Tabel 8.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	38	10.0	7	2.8	.	.	45	7.1	16	4.3
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	5	1.3	4	1.6	.	.	9	1.4	8	2.2
" : primair	2	0.5	3	1.2	.	.	5	0.8	4	1.1
" : secundair	4	1.1	5	2.0	.	.	9	1.4	3	0.8
" : latens recens	2	0.5	1	0.4	.	.	3	0.5	3	0.8
" : latens tarda	1	0.3	2	0.8	.	.	3	0.5	8	2.2
Chlamydia infectie	32	8.4	31	12.6	1	16.7	64	10.1	55	14.8
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	3	0.8	3	1.2	.	.	6	0.9	9	2.4
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.3
" : primo: HSV type 1	4	1.1	9	3.6	.	.	13	2.1	3	0.8
" : primo: HSV type 2	8	2.1	5	2.0	.	.	13	2.1	8	2.2
" : recidief	1	0.3	1	0.4	.	.	2	0.3	3	0.8
Genitale wratten	17	4.5	11	4.5	.	.	28	4.4	26	7.0
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	39	10.3	3	1.2	.	.	42	6.6	38	10.2
Bacteriele Vaginose	.	.	15	6.1	.	.	15	2.4	7	1.9
Trichomoniasis	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	1	0.3
Candidiasis	2	0.5	15	6.1	.	.	17	2.7	22	5.9
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	3	0.8	3	1.2	.	.	6	0.9	4	1.1
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	0.5	7	2.8	.	.	9	1.4	5	1.3
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.3	1	0.4	.	.	2	0.3	1	0.3
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>164</i>	<i>43.1</i>	<i>127</i>	<i>51.4</i>	<i>1</i>	<i>16.7</i>	<i>292</i>	<i>46.1</i>	<i>225</i>	<i>60.5</i>
HIV -	55	14.5	35	14.2	3	50.0	93	14.7	79	21.2
Nihil *	161	42.4	85	34.4	2	33.3	248	39.2	68	18.3
TOTAAL	380	100	247	100	6	100	633	100	372	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 8.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	6	15.8	12	31.6	7	18.4	2	5.3	4	10.5	2	5.3	5	13.2	.	.	38
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	16.7	1	16.7	1	16.7	1	16.7	.	.	2	33.3	.	.	6
Chlamydia	.	.	2	6.3	3	9.4	10	31.3	4	12.5	7	21.9	1	3.1	1	3.1	4	12.5	.	.	32
herpes genitalis	.	.	.	.	4	25.0	4	25.0	2	12.5	2	12.5	3	18.8	1	6.3	.	.	.	.	16
genitale wratten	.	.	.	.	4	23.5	5	29.4	2	11.8	3	17.6	2	11.8	1	5.9	.	.	.	.	17
overig	.	.	5	9.3	3	5.6	9	16.7	6	11.1	8	14.8	11	20.4	5	9.3	6	11.1	1	1.9	54
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	2	0.9	18	8.5	42	19.7	51	23.9	39	18.3	23	10.8	24	11.3	12	5.6	2	0.9	213
TOTAAL	.	.	9	2.4	38	10.1	83	22.0	73	19.4	62	16.4	45	11.9	35	9.3	29	7.7	3	0.8	377

Tabel 8.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	2	28.6	.	.	1	14.3	3	42.9	1	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	12.5	1	12.5	3	37.5	2	25.0	1	12.5	.	.	.	.	8
Chlamydia	1	3.2	8	25.8	10	32.3	7	22.6	4	12.9	1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	31
herpes genitalis	.	.	.	.	5	27.8	3	16.7	3	16.7	2	11.1	4	22.2	1	5.6	.	.	.	.	18
genitale wratten	.	.	1	9.1	3	27.3	4	36.4	1	9.1	1	9.1	.	.	1	9.1	.	.	.	.	11
overig	1	2.0	7	13.7	12	23.5	7	13.7	11	21.6	6	11.8	4	7.8	3	5.9	.	.	.	.	51
HIV+	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	1	0.8	7	5.8	33	27.5	31	25.8	16	13.3	10	8.3	9	7.5	7	5.8	3	2.5	3	2.5	120
TOTAAL	3	1.2	25	10.1	64	25.9	54	21.9	39	15.8	24	9.7	19	7.7	13	5.3	3	1.2	3	1.2	247

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 8.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	33	73.3	4	8.9	2	4.4	3	6.7	3	6.7	.	.	45
Syfilis: Prim. & Sec.	9	64.3	1	7.1	1	7.1	3	21.4	.	.	.	.	14
Chlamydia infectie	49	76.6	1	1.6	.	.	5	7.8	9	14.1	.	.	64
Herpes genitalis	21	61.8	1	2.9	1	2.9	2	5.9	9	26.5	.	.	34
Genitale wratten	25	89.3	1	3.6	.	.	2	7.1	.	.	.	.	28
Overig	63	60.0	10	9.5	1	1.0	8	7.6	20	19.0	3	2.9	105
HIV+	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Nihil	262	77.5	3	0.9	7	2.1	11	3.3	47	13.9	8	2.4	338
TOTAAL	463	73.5	21	3.3	12	1.9	34	5.4	89	14.1	11	1.7	630

Tabel 8.15:

Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE									
Gonorroë	18	47.4	18	47.4	2	5.3	.	.	38
Syfilis: Prim. & Sec.	5	83.3	.	.	1	16.7	.	.	6
Chlamydia infectie	21	65.6	10	31.3	1	3.1	.	.	32
Herpes genitalis	14	87.5	1	6.3	.	.	1	6.3	16
Genitale wratten	10	58.8	5	29.4	1	5.9	1	5.9	17
Overig	49	90.7	3	5.6	.	.	2	3.7	54
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Nihil	151	70.9	39	18.3	12	5.6	11	5.2	213
TOTAAL	268	71.1	77	20.4	17	4.5	15	4.0	337

Tabel 8.16a:

Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	6	15.8	17	44.7	15	39.5	38
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	2	33.3	3	50.0	1	16.7	6
Chlamydia infectie	.	.	3	9.4	22	68.8	7	21.9	32
Herpes genitalis	.	.	.	.	9	56.3	7	43.8	16
Genitale wratten	.	.	.	.	14	82.4	3	17.6	17
Overig	.	.	8	14.8	36	66.7	10	18.5	54
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	4	1.9	27	12.7	114	53.5	68	31.9	213
TOTAAL	4	1.1	46	12.2	216	57.3	111	29.4	377

Tabel 8.16b:

Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE									
Gonorroë	1	14.3	.	.	5	71.4	1	14.3	7
Syfilis: Prim. & Sec.	2	25.0	.	.	3	37.5	3	37.5	8
Chlamydia infectie	3	9.7	.	.	22	71.0	6	19.4	31
Herpes genitalis	.	.	.	.	9	50.0	9	50.0	18
Genitale wratten	2	18.2	.	.	9	81.8	.	.	11
Overig	4	7.8	.	.	42	82.4	5	9.8	51
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	12	10.0	.	.	78	65.0	30	25.0	120
TOTAAL	24	9.7	.	.	169	68.4	54	21.9	247

Tabel 8.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	14	31.1	26	57.8	5	11.1	45
Syfilis: Prim. & Sec.	4	28.6	4	28.6	6	42.9	14
Chlamydia infectie	12	18.8	45	70.3	7	10.9	64
Herpes genitalis	4	11.8	24	70.6	6	17.6	34
Genitale wratten	6	21.4	21	75.0	1	3.6	28
Overig	24	22.9	56	53.3	25	23.8	105
HIV+	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	50	14.8	248	73.4	40	11.8	338
TOTAAL	114	18.1	426	67.6	90	14.3	630

9: GGD Groningen

Tabel 9.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	200	52.63	2	100.00	92	49.46	294	51.76	265	48.98
vrouw	177	46.58	.	.	93	50.00	270	47.54	276	51.02
	3	0.79	.	.	1	0.54	4	0.70		
TOTAAL	380	100.00	2	100.00	186	100.00	568	100.00	541	100.00

Tabel 9.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	37	9.74	.	.	26	13.98	63	11.09	20	3.68
februari	25	6.58	.	.	15	8.06	40	7.04	47	8.66
maart	45	11.84	.	.	5	2.69	50	8.80	79	14.55
april	34	8.95	.	.	10	5.38	44	7.75	35	6.45
mei	22	5.79	.	.	10	5.38	32	5.63	41	7.55
juni	29	7.63	.	.	14	7.53	43	7.57	43	7.92
juli	27	7.11	1	50.00	13	6.99	41	7.22	49	9.02
augustus	25	6.58	.	.	14	7.53	39	6.87	36	6.63
september	33	8.68	.	.	19	10.22	52	9.15	74	13.63
oktober	41	10.79	.	.	14	7.53	55	9.68	35	6.45
november	27	7.11	.	.	20	10.75	47	8.27	38	7.00
december	35	9.21	.	.	25	13.44	60	10.56	44	8.10
onbekend	.	.	1	50.00	1	0.54	2	0.35	2	0.37
TOTAAL	380	100.00	2	100.00	186	100.00	568	100.00	543	100.00

Tabel 9.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	191	64.97	171	63.33	3	75.00	365	64.26	378	69.87
HIV-test	2	0.68	.	.	.	.	2	0.35	5	0.92
beide	97	32.99	99	36.67	1	25.00	197	34.68	143	26.43
onbekend	4	1.36	.	.	.	.	4	0.70	15	2.77
TOTAAL	294	100.00	270	100.00	4	100.00	568	100.00	541	100.00

Tabel 9.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	2
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	2	.	.	2	1
SOA positief, geen HIV test	125	.	6	3	134	148
SOA positief, HIV positief	1	.	.	.	1	1
SOA positief, HIV negatief	.	.	29	.	29	9
SOA negatief, geen HIV test	237	.	8	1	246	306
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	.	1	2
SOA negatief, HIV negatief	2	.	153	.	155	74
TOTAAL	365	2	197	4	568	543

Tabel 9.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	1	0.34	2	0.74	.	.	3	0.53	9	1.66
15-19	13	4.42	35	12.96	.	.	48	8.45	47	8.69
20-24	65	22.11	102	37.78	1	25.00	168	29.58	144	26.02
25-29	66	22.45	44	16.30	1	25.00	111	19.54	113	20.89
30-34	33	11.22	23	8.52	1	25.00	57	10.04	59	10.91
35-39	34	11.56	28	10.37	.	.	62	10.92	62	11.46
40-44	26	8.84	17	6.30	.	.	43	7.57	45	8.32
45-54	33	11.22	14	5.19	.	.	47	8.27	41	7.58
>54	21	7.14	4	1.48	.	.	25	4.40	18	33.33
??	2	0.68	1	0.37	1	25.00	4	0.70	3	0.55
TOTAAL	294	100.00	270	100.00	4	100.00	568	100.00	541	100.00

Tabel 9.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	248	84.35	241	89.26	4	100.00	493	86.80	451	83.36
Turkije	.	.	1	0.37	.	.	1	0.18	3	0.55
Marokko	1	0.34	1	0.37	.	.	2	0.35	1	0.18
Sur./ Ant./ Aru.	11	3.74	5	1.85	.	.	16	2.82	14	2.59
overig	32	10.88	22	8.15	.	.	54	9.15	62	11.46
onbekend	2	0.68	.	.	.	.	2	0.35	10	1.85
TOTAAL	294	100.00	270	100.00	4	100.00	568	100.00	541	100.00

Tabel 9.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	216	73.47	190	71.70
homoseksueel	59	20.07	52	19.62
biseksueel	10	3.40	13	4.91
onbekend	9	3.06	10	3.77
TOTAAL	294	100.00	265	100.00

Tabel 9.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	7	2.38	23	8.52	1	25.00	31	5.46	49	9.12
prostituant(e)	24	8.16	1	0.37	.	.	25	4.40	24	4.47
geen van beide	238	80.95	236	87.41	2	50.00	476	83.80	429	79.89
onbekend	25	8.50	10	3.70	1	25.00	36	6.34	35	6.52
TOTAAL	294	100.00	270	100.00	4	100.00	568	100.00	537	100.00

Tabel 9.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	80	27.21	65	24.07	.	.	145	25.53	5	0.92
ja, ooit twee SOA									145	26.80
nee	183	62.24	188	69.63	3	75.00	374	65.85	308	56.93
onbekend	31	10.54	17	6.30	1	25.00	49	8.63	83	15.34
TOTAAL	294	100.00	270	100.00	4	100.00	568	100.00	541	100.00

Tabel 9.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	6	1.9	1	0.3	.	.	7	1.1	10	1.8
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	2	0.6	4	1.4	.	.	6	1.0	2	0.4
" : primair	4	1.3	.	.	.	.	4	0.7	3	0.5
" : secundair	1	0.3	.	.	.	.	1	0.2	1	0.2
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.4
Chlamydia infectie	20	6.3	17	5.8	.	.	37	6.0	47	8.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	4	1.3	2	0.7	.	.	6	1.0	5	0.9
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.3	.	.	1	0.2	5	0.9
" : primo: HSV type 2	2	0.6	2	0.7	.	.	4	0.7	6	1.1
" : recidief	1	0.3	1	0.3	.	.	2	0.3	2	0.4
Genitale wratten	31	9.7	21	7.2	.	.	52	8.5	45	7.9
Hepatitis B: acuut	.	.	1	0.3	.	.	1	0.2	.	.
Hepatitis B: chronisch	1	0.3	.	.	.	.	1	0.2	1	0.2
Niet Specifieke Urethritis	13	4.1	.	.	.	.	13	2.1	5	0.9
Bacteriele Vaginose	.	.	8	2.7	.	.	8	1.3	8	1.4
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.4
Candidiasis	3	0.9	15	5.1	.	.	18	2.9	8	1.4
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.4
Scabies	12	3.8	4	1.4	.	.	16	2.6	18	3.2
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	1	0.3	2	0.7	.	.	3	0.5	4	0.7
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.3	1	0.3	.	.	2	0.3	5	0.9
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>102</i>	<i>32.1</i>	<i>80</i>	<i>27.4</i>	.	.	<i>182</i>	<i>29.6</i>	<i>181</i>	<i>31.8</i>
HIV -	93	29.2	92	31.5	1	25.0	186	30.3	84	14.7
Nihil *	123	38.7	120	41.1	3	75.0	246	40.1	305	53.5
TOTAAL	318	100.0	292	100.0	4	100.0	614	100.0	570	100.0

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 9.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	16.7	1	16.7	2	33.3	.	.	.	.	.	.	1	16.7	1	16.7	.	.	6
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40.0	.	.	1	20.0	2	40.0	.	.	5
Chlamydia	.	.	1	5.0	4	20.0	7	35.0	2	10.0	2	10.0	1	5.0	3	15.0	.	.	.	.	20
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	3	42.9	.	.	2	28.6	.	.	1	14.3	.	.	1	14.3	7
genitale wratten	.	.	.	.	5	16.1	9	29.0	5	16.1	5	16.1	1	3.2	3	9.7	2	6.5	1	3.2	31
overig	1	3.1	.	.	5	15.6	4	12.5	4	12.5	5	15.6	7	21.9	4	12.5	2	6.3	.	.	32
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	12	6.0	50	24.9	43	21.4	22	10.9	20	10.0	17	8.5	21	10.4	16	8.0	.	.	201
TOTAAL	1	0.3	14	4.6	65	21.5	68	22.4	34	11.2	36	11.9	26	8.6	34	11.2	23	7.6	2	0.7	303

Tabel 9.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	4	23.5	8	47.1	3	17.6	1	5.9	1	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	17
herpes genitalis	.	.	2	33.3	.	.	.	.	.	.	1	16.7	2	33.3	1	16.7	.	.	.	.	6
genitale wratten	1	4.8	3	14.3	6	28.6	3	14.3	4	19.0	3	14.3	1	4.8	.	.	.	.	.	.	21
overig	1	2.9	1	2.9	14	41.2	5	14.7	4	11.8	4	11.8	2	5.9	2	5.9	.	.	1	2.9	34
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	26	13.1	76	38.4	33	16.7	15	7.6	20	10.1	13	6.6	11	5.6	4	2.0	.	.	198
TOTAAL	2	0.7	36	12.9	104	37.4	45	16.2	25	9.0	29	10.4	18	6.5	14	5.0	4	1.4	1	0.4	278

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 9.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	5	71.4	.	.	.	.	2	28.6	.	.	.	.	7
Syfilis: Prim. & Sec.	5	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Chlamydia infectie	29	78.4	.	.	.	.	2	5.4	6	16.2	.	.	37
Herpes genitalis	9	69.2	.	.	.	.	.	.	4	30.8	.	.	13
Genitale wratten	46	88.5	.	.	.	.	1	1.9	5	9.6	.	.	52
Overig	53	80.3	.	.	2	3.0	1	1.5	10	15.2	.	.	66
HIV+	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	2
Nihil	360	89.3	1	0.2	.	.	10	2.5	30	7.4	2	0.5	403
TOTAAL	508	86.8	1	0.2	2	0.3	16	2.7	56	9.6	2	0.3	585

Tabel 9.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	2	33.3	4	66.7	.	.	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	5	100.0	.	.	.	.	5
Chlamydia infectie	15	75.0	4	20.0	1	5.0	.	.	20
Herpes genitalis	7	100.0	.	.	.	.	.	.	7
Genitale wratten	25	80.6	6	19.4	.	.	.	.	31
Overig	20	62.5	7	21.9	.	.	5	15.6	32
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	151	75.1	38	18.9	8	4.0	4	2.0	201
TOTAAL	220	72.6	64	21.1	10	3.3	9	3.0	303

Tabel 9.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	1	16.7	5	83.3	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	20.0	4	80.0	.	.	5
Chlamydia infectie	1	5.0	1	5.0	18	90.0	.	.	20
Herpes genitalis	.	.	.	.	5	71.4	2	28.6	7
Genitale wratten	.	.	1	3.2	30	96.8	.	.	31
Overig	.	.	2	6.3	24	75.0	6	18.8	32
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	6	3.0	19	9.5	159	79.1	17	8.5	201
TOTAAL	7	2.3	25	8.3	246	81.2	25	8.3	303

Tabel 9.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	5.9	.	.	16	94.1	.	.	17
Herpes genitalis	.	.	.	.	6	100.0	.	.	6
Genitale wratten	1	4.8	.	.	19	90.5	1	4.8	21
Overig	3	8.8	.	.	27	79.4	4	11.8	34
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	18	9.1	1	0.5	174	87.9	5	2.5	198
TOTAAL	23	8.3	1	0.4	244	87.8	10	3.6	278

Tabel 9.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	2	28.6	4	57.1	1	14.3	7
Syfilis: Prim. & Sec.	5	100.0	.	.	.	.	5
Chlamydia infectie	10	27.0	23	62.2	4	10.8	37
Herpes genitalis	1	7.7	7	53.8	5	38.5	13
Genitale wratten	15	28.8	36	69.2	1	1.9	52
Overig	25	37.9	29	43.9	12	18.2	66
HIV+	2	100.0	.	.	.	.	2
Nihil	92	22.8	282	70.0	29	7.2	403
TOTAAL	152	26.0	381	65.1	52	8.9	585

10: GGD Noord Kennemerland

Tabel 10.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	70	24.82	43	47.25	39	26.90	152	29.34	143	29.73
vrouw	209	74.11	48	52.75	105	72.41	362	69.88	338	70.27
onbekend	3	1.06	.	.	1	0.69	4	0.77		
TOTAAL	282	100.00	91	100.00	145	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	24	8.51	10	10.99	5	3.45	39	7.53	32	6.65
februari	21	7.45	8	8.79	12	8.28	41	7.92	30	6.24
maart	25	8.87	5	5.49	15	10.34	45	8.69	36	7.48
april	26	9.22	7	7.69	17	11.72	50	9.65	26	5.41
mei	24	8.51	8	8.79	9	6.21	41	7.92	47	9.77
juni	26	9.22	6	6.59	10	6.90	42	8.11	40	8.32
juli	15	5.32	7	7.69	10	6.90	32	6.18	38	7.90
augustus	23	8.16	9	9.89	11	7.59	43	8.30	44	9.15
september	26	9.22	9	9.89	14	9.66	49	9.46	52	10.81
oktober	28	9.93	4	4.40	14	9.66	46	8.88	36	7.48
november	30	10.64	7	7.69	16	11.03	53	10.23	63	13.10
december	13	4.61	10	10.99	12	8.28	35	6.76	36	7.48
onbekend	1	0.35	1	1.10	.	.	2	0.39	1	0.21
TOTAAL	282	100.00	91	100.00	145	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	69	45.39	202	55.80	2	50.00	273	52.70	246	51.14
HIV-test	43	28.29	47	12.98	.	.	90	17.37	94	19.54
beide	39	25.66	107	29.56	1	25.00	147	28.38	130	27.03
onbekend	1	0.66	6	1.66	1	25.00	8	1.54	11	2.29
TOTAAL	152	100.00	362	100.00	4	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	89	2	.	91	96
SOA positief, geen HIV test	75	.	3	2	80	94
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	1	21	.	22	20
SOA negatief, geen HIV test	197	.	.	5	202	161
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	1	.	121	1	123	110
TOTAAL	273	90	147	8	518	481

Tabel 10.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0.62
15-19	5	3.29	40	11.05	1	25.00	46	8.88	37	7.69
20-24	31	20.39	127	35.08	.	.	158	30.50	148	30.77
25-29	28	18.42	101	27.90	2	50.00	131	25.29	144	29.94
30-34	29	19.08	48	13.26	.	.	77	14.86	61	12.68
35-39	17	11.18	16	4.42	.	.	33	6.37	20	4.16
40-44	9	5.92	14	3.87	.	.	23	4.44	27	5.61
45-54	19	12.50	9	2.49	.	.	28	5.41	29	6.03
>54	11	7.24	4	1.10	.	.	15	2.90	11	2.29
??	3	1.97	3	0.83	1	25.00	7	1.35	1	0.21
TOTAAL	152	100.00	362	100.00	4	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	143	94.08	174	48.07	1	25.00	318	61.39	320	66.53
Turkije	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Marokko	1	0.66	.	.	.	.	1	0.19	1	0.21
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
overig	5	3.29	186	51.38	3	75.00	194	37.45	156	32.43
onbekend	3	1.97	2	0.55	.	.	5	0.97	4	0.83
TOTAAL	152	100.00	362	100.00	4	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	127	83.55	123	86.01
homoseksueel	12	7.89	8	5.59
biseksueel	8	5.26	2	1.40
onbekend	5	3.29	10	6.99
TOTAAL	152	100.00	143	100.00

Tabel 10.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	1	0.66	201	55.52	3	75.00	205	39.58	178	37.40
prostituant(e)	10	6.58	.	.	.	.	10	1.93	11	2.30
geen van beide	124	81.58	155	42.82	.	.	279	53.86	260	54.39
onbekend	17	11.18	6	1.66	1	25.00	24	4.63	29	6.07
TOTAAL	152	100.00	362	100.00	4	100.00	518	100.00	478	100.00

Tabel 10.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	13	8.55	68	18.78	.	.	81	15.64	.	.
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	49	10.19
nee	109	71.71	131	36.19	.	.	240	46.33	219	45.53
onbekend	30	19.74	163	45.03	4	100.00	197	38.03	213	44.28
TOTAAL	152	100.00	362	100.00	4	100.00	518	100.00	481	100.00

Tabel 10.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	4	2.6	6	1.5	.	.	10	1.8	6	1.2
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	6	3.9	21	5.4	.	.	27	4.9	37	7.2
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.4
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.2
Genitale wratten	4	2.6	12	3.1	.	.	16	2.9	9	1.7
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	2	0.5	.	.	2	0.4	.	.
Bacteriele Vaginose	1	0.6	23	5.9	1	25.0	25	4.6	14	2.7
Trichomoniasis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Candidiasis	1	0.6	25	6.4	.	.	26	4.7	27	5.2
Schaamluis	1	0.6	1	0.3	.	.	2	0.4	1	0.2
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	2	1.3	.	.	.	.	2	0.4	31	6.0
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>19</i>	<i>12.4</i>	<i>90</i>	<i>23.1</i>	<i>1</i>	<i>25.0</i>	<i>110</i>	<i>20.0</i>	<i>128</i>	<i>24.9</i>
HIV -	82	53.2	153	39.2	1	25.0	236	43.1	226	43.9
Nihil *	53	34.4	147	37.7	2	50.0	202	36.9	161	31.3
TOTAAL	154	100	390	100	4	100	548	100	515	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 10.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	1	25.0	1	25.0	1	25.0	.	.	.	.	1	25.0	.	.	.	.	4
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	2	33.3	2	33.3	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16.7	6
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	1	25.0	2	50.0	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4
overig	.	.	.	.	1	20.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	.	.	1	20.	.	.	.	.	5
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	5	3.8	26	19.5	22	16.5	26	19.5	15	11.3	9	6.8	17	12.8	11	8.3	2	1.5	133
TOTAAL	.	.	5	3.3	31	20.4	28	18.4	29	19.1	17	11.2	9	5.9	19	12.5	11	7.2	3	2.0	152

Tabel 10.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	1	16.7	5	83.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	5	23.8	10	47.6	5	23.8	1	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
genitale wratten	.	.	.	.	5	41.7	2	16.7	3	25.0	.	.	1	8.3	.	.	1	8.3	.	.	12
overig	.	.	9	17.6	10	19.6	14	27.5	7	13.7	4	7.8	4	7.8	2	3.9	.	.	1	2.0	51
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	27	9.6	101	36.1	82	29.3	37	13.2	12	4.3	9	3.2	7	2.5	3	1.1	2	0.7	280
TOTAAL	.	.	42	11.4	131	35.4	103	27.8	48	13.0	16	4.3	14	3.8	9	2.4	4	1.1	3	0.8	370

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 10.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	5	50.0	.	.	1	10.0	.	.	4	40.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	48.1	.	.	.	.	.	.	14	51.9	.	.	27
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	12	75.0	.	.	.	.	.	.	4	25.0	.	.	16
Overig	42	73.7	.	.	.	.	.	.	15	26.3	.	.	57
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	251	60.3	.	.	.	.	.	.	160	38.5	5	1.2	416
TOTAAL	323	61.4	.	.	1	0.2	.	.	197	37.5	5	1.0	526

Tabel 10.15:

Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	4	100.0	.	.	.	.	.	.	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	6	100.0	.	.	.	.	.	.	6
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	4	100.0	.	.	.	.	.	.	4
Overig	5	100.0	.	.	.	.	.	.	5
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	108	81.2	12	9.0	8	6.0	5	3.8	133
TOTAAL	127	83.6	12	7.9	8	5.3	5	3.3	152

Tabel 10.16a:

Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	2	50.0	1	25.0	1	25.0	4
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	1	16.7	4	66.7	1	16.7	6
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Overig	.	.	1	20.0	4	80.0	.	.	5
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	1	0.8	6	4.5	111	83.5	15	11.3	133
TOTAAL	1	0.7	10	6.6	124	81.6	17	11.2	152

Tabel 10.16b:

Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	5	83.3	.	.	1	16.7	.	.	6
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	13	61.9	.	.	8	38.1	.	.	21
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	6	50.0	.	.	6	50.0	.	.	12
Overig	17	33.3	.	.	34	66.7	.	.	51
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	163	58.2	.	.	111	39.6	6	2.1	280
TOTAAL	204	55.1	.	.	160	43.2	6	1.6	370

Tabel 10.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	2	20.0	2	20.0	6	60.0	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	3.7	9	33.3	17	63.0	27
Herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.
Genitale wratten	2	12.5	8	50.0	6	37.5	16
Overig	5	8.8	35	61.4	17	29.8	57
HIV+	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	71	17.1	191	45.9	154	37.0	416
TOTAAL	81	15.4	245	46.6	200	38.0	526

11: GGD Zuidelijk Zuid Limburg

Tabel 11.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	136	47.22	30	49.18	56	40.58	222	45.59	250	49.60
vrouw	152	52.78	29	47.54	80	57.97	261	53.59	254	50.40
onbekend	.	.	2	3.28	2	1.45	4	0.82		
TOTAAL	288	100.00	61	100.00	138	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	26	9.03	3	4.92	13	9.42	42	8.62	33	6.55
februari	20	6.94	3	4.92	17	12.32	40	8.21	30	5.95
maart	19	6.60	3	4.92	8	5.80	30	6.16	60	11.90
april	24	8.33	2	3.28	9	6.52	35	7.19	31	6.15
mei	23	7.99	3	4.92	5	3.62	31	6.37	41	8.13
juni	32	11.11	7	11.48	10	7.25	49	10.06	44	8.73
juli	22	7.64	3	4.92	6	4.35	31	6.37	48	9.52
augustus	20	6.94	5	8.20	9	6.52	34	6.98	33	6.55
september	28	9.72	5	8.20	11	7.97	44	9.03	49	9.72
oktober	29	10.07	11	18.03	14	10.14	54	11.09	44	8.73
november	21	7.29	10	16.39	16	11.59	47	9.65	48	9.52
december	24	8.33	5	8.20	20	14.49	49	10.06	43	8.53
onbekend	.	.	1	1.64	.	.	1	0.21		
TOTAAL	288	100.00	61	100.00	138	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	118	53.15	128	49.04	.	.	246	50.51	290	57.54
HIV-test	30	13.51	32	12.26	2	50.00	64	13.14	81	16.07
beide	71	31.98	97	37.16	2	50.00	170	34.91	125	24.80
onbekend	3	1.35	4	1.53	.	.	7	1.44	8	1.59
TOTAAL	222	100.00	261	100.00	4	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	1	.	.	1	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	1	58	1	.	60	82
SOA positief, geen HIV test	68	.	9	4	81	76
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	1	.	15	.	16	7
SOA negatief, geen HIV test	175	1	29	2	207	241
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	1
SOA negatief, HIV negatief	1	4	116	1	122	97
TOTAAL	246	64	170	7	487	504

Tabel 11.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	%	%
LEEFTIJD										
14	1	0.45	.	.	.	.	1	0.21	3	0.60
15-19	6	2.70	23	8.81	1	25.00	30	6.16	42	8.33
20-24	70	31.53	117	44.83	1	25.00	188	38.60	159	31.55
25-29	38	17.12	42	16.09	1	25.00	81	16.63	104	20.63
30-34	33	14.86	23	8.81	.	.	56	11.50	71	14.09
35-39	31	13.96	14	5.36	1	25.00	46	9.45	44	8.73
40-44	10	4.50	19	7.28	.	.	29	5.95	27	5.36
45-54	18	8.11	17	6.51	.	.	35	7.19	45	8.93
>54	10	4.50	3	1.15	.	.	13	2.67	6	1.19
??	5	2.25	3	1.15	.	.	8	1.64	3	0.60
TOTAAL	222	100.00	261	100.00	4	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	205	92.34	243	93.10	3	75.00	451	92.61	476	94.44
Turkije	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.20
Marokko	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.40
Sur./ Ant./ Aru.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.20
Overig	12	5.41	12	4.60	1	25.00	25	5.13	23	4.56
onbekend	5	2.25	6	2.30	.	.	11	2.26	1	0.20
TOTAAL	222	100.00	261	100.00	4	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	191	86.04	199	79.60
homoseksueel	21	9.46	30	12.00
biseksueel	4	1.80	3	1.20
onbekend	6	2.70	18	7.20
TOTAAL	222	100.00	250	100.00

Tabel 11.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	1	0.45	16	6.13	.	.	17	3.49	29	5.92
prostituant(e)	6	2.70	.	.	.	.	6	1.23	11	2.24
geen van beide	206	92.79	237	90.80	4	100.00	447	91.79	430	87.76
onbekend	9	4.05	8	3.07	.	.	17	3.49	20	4.08
TOTAAL	222	100.00	261	100.00	4	100.00	487	100.00	490	100.00

Tabel 11.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	36	16.22	28	10.73	.	.	64	13.14	3	0.60
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	68	13.49
nee	171	77.03	212	81.23	4	100.00	387	79.47	392	77.78
onbekend	15	6.76	21	8.05	.	.	36	7.39	41	8.13
TOTAAL	222	100.00	261	100.00	4	100.00	487	100.00	504	100.00

Tabel 11.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorrhoe (excl.PVG)	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	1	0.2
Gonorrhoe: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	3	0.6
" : primair	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	.	.
" : secundair	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	1	0.2
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.2
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	9	4.0	19	6.9	.	.	28	5.5	28	5.4
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
" : primo: HSV type 1	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	3	0.6
" : primo: HSV type 2	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	2	0.4
" : recidief	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	1	0.2
Genitale wratten	23	10.1	26	9.4	.	.	49	9.6	28	5.4
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.4
Bacteriele Vaginose	.	.	3	1.1	.	.	3	0.6	3	0.6
Trichomoniasis	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
Candidiasis	1	0.4	5	1.8	.	.	6	1.2	16	3.1
Schaamluis	1	0.4	3	1.1	.	.	4	0.8	.	.
Scabies	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	1	0.4	.	.	1	0.2	2	0.4
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	1	0.4	.	.	.	.	1	0.2	1	0.2
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>40</i>	<i>17.7</i>	<i>63</i>	<i>22.7</i>	.	.	<i>103</i>	<i>20.3</i>	<i>92</i>	<i>17.7</i>
HIV -	85	37.4	109	39.4	4	100	198	39.0	186	35.8
Nihil *	102	44.9	105	37.9	.	.	207	40.7	241	46.4
TOTAAL	227	100	277	100	4	100	508	100	519	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 11.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	1	11.1	3	33.3	2	22.2	2	22.2	1	11.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	2	66.7	.	.	3
genitale wratten	.	.	.	.	5	21.7	5	21.7	4	17.4	7	30.4	.	.	1	4.3	1	4.3	.	.	23
overig	.	.	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	1	0.5	5	2.7	61	33.5	31	17.0	24	13.2	21	11.5	10	5.5	17	9.3	7	3.8	5	2.7	182
TOTAAL	1	0.5	6	2.7	70	31.5	38	17.1	33	14.9	31	14.0	10	4.5	18	8.1	10	4.5	5	2.3	222

Tabel 11.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia	.	.	1	5.3	12	63.2	1	5.3	2	10.5	1	5.3	.	.	2	10.5	.	.	.	.	19
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	3	11.5	15	57.7	.	.	1	3.8	1	3.8	2	7.7	4	15.4	.	.	.	.	26
overig	.	.	.	.	3	20.0	4	26.7	2	13.3	1	6.7	1	6.7	4	26.7	.	.	.	.	15
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	.	.	19	9.4	90	44.3	35	17.2	18	8.9	11	5.4	16	7.9	8	3.9	3	1.5	3	1.5	203
TOTAAL	.	.	23	8.6	120	45.1	42	15.8	23	8.6	14	5.3	19	7.1	19	7.1	3	1.1	3	1.1	266

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 11.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE													
Gonorroë	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	2	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Chlamydia infectie	26	92.9	.	.	.	.	.	.	2	7.1	.	.	28
Herpes genitalis	4	80.0	.	.	.	.	.	.	1	20.0	.	.	5
Genitale wratten	49	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49
Overig	14	82.4	.	.	.	.	.	.	3	17.6	.	.	17
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	359	92.3	.	.	.	.	.	.	19	4.9	11	2.8	389
TOTAAL	456	92.7	.	.	.	.	.	.	25	5.1	11	2.2	492

Tabel 11.15:
Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	8	88.9	.	.	.	.	1	11.1	9
Herpes genitalis	2	66.7	.	.	.	.	1	33.3	3
Genitale wratten	17	73.9	3	13.0	.	.	3	13.0	23
Overig	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	160	87.9	17	9.3	4	2.2	1	0.5	182
TOTAAL	191	86.0	21	9.5	4	1.8	6	2.7	222

Tabel 11.16a:
Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	8	88.9	1	11.1	9
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	66.7	1	33.3	3
Genitale wratten	.	.	.	.	20	87.0	3	13.0	23
Overig	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
HIV+	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	1	0.5	6	3.3	171	94.0	4	2.2	182
TOTAAL	1	0.5	6	2.7	206	92.8	9	4.1	222

Tabel 11.16b:
Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	19	100.0	.	.	19
Herpes genitalis	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Genitale wratten	1	3.8	.	.	25	96.2	.	.	26
Overig	2	13.3	.	.	11	73.3	2	13.3	15
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	13	6.4	.	.	184	90.6	6	3.0	203
TOTAAL	17	6.4	.	.	241	90.6	8	3.0	266

Tabel 11.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Chlamydia infectie	3	10.7	23	82.1	2	7.1	28
Herpes genitalis	2	40.0	3	60.0	.	.	5
Genitale wratten	11	22.4	35	71.4	3	6.1	49
Overig	4	23.5	11	64.7	2	11.8	17
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	44	11.3	317	81.5	28	7.2	389
TOTAAL	65	13.2	391	79.5	36	7.3	492

12: GGD West Brabant

Tabel 12.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	121	50.21	84	53.50	11	52.38	216	51.55		
vrouw	119	49.38	73	46.50	9	42.86	201	47.97		
onbekend	1	0.41	.	.	1	4.76	2	0.48		
TOTAAL	241	100.00	157	100.00	21	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	15	6.22	21	13.38	1	4.76	37	8.83		
februari	24	9.96	15	9.55	.	.	39	9.31		
maart	21	8.71	16	10.19	2	9.52	39	9.31		
april	24	9.96	12	7.64	1	4.76	37	8.83		
mei	10	4.15	11	7.01	4	19.05	25	5.97		
juni	12	4.98	15	9.55	2	9.52	29	6.92		
juli	21	8.71	14	8.92	2	9.52	37	8.83		
augustus	20	8.30	11	7.01	3	14.29	34	8.11		
september	34	14.11	9	5.73	2	9.52	45	10.74		
oktober	24	9.96	5	3.18	1	4.76	30	7.16		
november	25	10.37	12	7.64	1	4.76	38	9.07		
december	11	4.56	16	10.19	2	9.52	29	6.92		
TOTAAL	241	100.00	157	100.00	21	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	115	53.24	118	58.71	1	50.00	234	55.85		
HIV-test	85	39.35	73	36.32	.	.	158	37.71		
beide	15	6.94	9	4.48	1	50.00	25	5.97		
onbekend	1	0.46	1	0.50	.	.	2	0.48		
TOTAAL	216	100.00	201	100.00	2	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	.	.	.	.	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	156	1	.	157	.
SOA positief, geen HIV test	72	.	.	1	73	.
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	2	.	2	.
SOA negatief, geen HIV test	162	.	5	1	168	.
SOA negatief, HIV positief	.	.	1	.	1	.
SOA negatief, HIV negatief	.	2	16	.	18	.
TOTAAL	234	158	25	2	419	340

Tabel 12.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	2	1.00	.	.	2	0.48	.	.
15-19	10	4.63	37	18.41	.	.	47	11.22	.	.
20-24	44	20.37	57	28.36	1	50.00	102	24.34	.	.
25-29	44	20.37	46	22.89	.	.	90	21.48	.	.
30-34	38	17.59	23	11.44	1	50.00	62	14.80	.	.
35-39	22	10.19	17	8.46	.	.	39	9.31	.	.
40-44	24	11.11	7	3.48	.	.	31	7.40	.	.
45-54	20	9.26	12	5.97	.	.	32	7.64	.	.
>54	13	6.02	.	.	.	.	13	3.10	.	.
??	1	0.46	.	.	.	.	1	0.24	.	.
TOTAAL	216	100.00	201	100.00	2	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	197	91.20	183	91.04	1	50.00	381	90.93	.	.
Turkije	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Marokko	1	0.46	.	.	.	.	1	0.24	.	.
Sur./ Ant./ Aru.	2	0.93	3	1.49	.	.	5	1.19	.	.
overig	12	5.56	11	5.47	.	.	23	5.49	.	.
onbekend	4	1.85	4	1.99	1	50.00	9	2.15	.	.
TOTAAL	216	100.00	201	100.00	2	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	158	73.15		
homoseksueel	41	18.98		
biseksueel	7	3.24		
onbekend	10	4.63		
TOTAAL	216	100.00		

Tabel 12.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	.	.	10	4.98	.	.	10	2.39		
prostituant(e)	13	6.02	.	.	.	.	13	3.10		
geen van beide	181	83.80	179	89.05	2	100.00	362	86.40		
onbekend	22	10.19	12	5.97	.	.	34	8.11		
TOTAAL	216	100.00	201	100.00	2	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	31	14.35	26	12.94	.	.	57	13.60		
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.		
nee	162	75.00	162	80.60	2	100.00	326	77.80		
onbekend	23	10.65	13	6.47	.	.	36	8.59		
TOTAAL	216	100.00	201	100.00	2	100.00	419	100.00	340	100.00

Tabel 12.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		Onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	5	2.3	1	0.5	.	.	6	1.4		
Gonorroë: PVG	3	1.4	1	0.5	.	.	4	0.9		
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.		
" : primair	.	.	.	.	.	.	.	.		
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.		
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.		
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.		
Chlamydia infectie	7	3.2	14	6.9	.	.	21	5.0		
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	1	0.5	.	.	.	.	1	0.2		
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.		
" : primo: HSV type 1	.	.	1	0.5	.	.	1	0.2		
" : primo: HSV type 2	1	0.5	.	.	.	.	1	0.2		
" : recidief	.	.	.	.	.	.	.	.		
Genitale wratten	9	4.1	7	3.4	.	.	16	3.8		
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.		
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.		
Niet Specifieke Urethritis	1	0.5	.	.	.	.	1	0.2		
Bacteriele Vaginose	.	.	5	2.5	.	.	5	1.2		
Trichomoniasis	.	.	3	1.5	.	.	3	0.7		
Candidiasis	3	1.4	12	5.9	.	.	15	3.6		
Schaamluis	1	0.5	.	.	.	.	1	0.2		
Scabies	.	.	1	0.5	.	.	1	0.2		
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.		
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.		
Overig/ niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.		
PID	.	.	.	.	.	.	.	.		
HIV +	1	0.5	.	.	.	.	1	0.2		
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	32	14.8	45	22.2	.	.	77	18.3		
HIV -	94	43.3	82	40.4	1	50.0	177	41.9		
Nihil *	91	41.9	76	37.4	1	50.0	168	39.8		
TOTAAL	217	100	203	100	2	100	422	100		

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 12.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	1	12.5	1	12.5	2	25.0	.	.	3	37.5	1	12.5	.	.	8
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	2	28.6	1	14.3	3	42.9	.	.	1	14.3	.	.	.	.	.	.	7
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	3	33.3	2	22.2	2	22.2	1	11.1	1	11.1	.	.	.	.	.	.	9
overig	.	.	.	.	.	.	2	40.0	2	40.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5
HIV+	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil *	.	.	9	4.9	39	21.2	38	20.7	29	15.8	17	9.2	22	12.0	17	9.2	12	6.5	1	0.5	184
TOTAAL	.	.	10	4.6	44	20.4	44	20.4	38	17.6	22	10.2	24	11.1	20	9.3	13	6.0	1	0.5	216

Tabel 12.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorrhoe	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	2
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	6	42.9	5	35.7	3	21.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
genitale wratten	.	.	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	.	.	7
overig	.	.	4	19.0	7	33.3	4	19.0	2	9.5	2	9.5	.	.	2	9.5	.	.	.	.	21
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil *	2	1.3	26	16.6	44	28.0	36	22.9	20	12.7	14	8.9	5	3.2	10	6.4	.	.	.	.	157
TOTAAL	2	1.0	37	18.3	58	28.7	46	22.8	23	11.4	17	8.4	7	3.5	12	5.9	.	.	.	.	202

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 12.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	8	80.0	.	.	.	.	.	.	2	20.0	.	.	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	18	85.7	.	.	.	.	1	4.8	1	4.8	1	4.8	21
Herpes genitalis	2	66.7	.	.	.	.	.	.	1	33.3	.	.	3
Genitale wratten	15	93.8	.	.	.	.	.	.	1	6.3	.	.	16
Overig	25	96.2	.	.	.	.	.	.	1	3.8	.	.	26
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	313	91.3	.	.	1	0.3	4	1.2	17	5.0	8	2.3	343
TOTAAL	382	91.0	.	.	1	0.2	5	1.2	23	5.5	9	2.1	420

Tabel 12.15:

Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	3	37.5	3	37.5	.	.	2	25.0	8
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	5	71.4	2	28.6	.	.	.	.	7
Herpes genitalis	.	.	1	50.0	.	.	1	50.0	2
Genitale wratten	5	55.6	4	44.4	.	.	.	.	9
Overig	4	80.0	1	20.0	.	.	.	.	5
HIV+	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Nihil	140	76.1	30	16.3	7	3.8	7	3.8	184
TOTAAL	158	73.1	41	19.0	7	3.2	10	4.6	216

Tabel 12.16a:

Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostitutué		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	1	12.5	5	62.5	2	25.0	8
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	6	85.7	1	14.3	7
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	2
Genitale wratten	.	.	.	.	9	100.0	.	.	9
Overig	.	.	.	.	4	80.0	1	20.0	5
HIV+	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1
Nihil	.	.	12	6.5	156	84.8	16	8.7	184
TOTAAL	.	.	13	6.0	181	83.8	22	10.2	216

Tabel 12.16b:

Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostitutée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	11	78.6	3	21.4	14
Herpes genitalis	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Genitale wratten	.	.	.	.	7	100.0	.	.	7
Overig	.	.	.	.	19	90.5	2	9.5	21
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nihil	10	6.4	.	.	140	89.2	7	4.5	157
TOTAAL	10	5.0	.	.	180	89.1	12	5.9	202

Tabel 12.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	1	10.0	5	50.0	4	40.0	10
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	2	9.5	16	76.2	3	14.3	21
Herpes genitalis	.	.	1	33.3	2	66.7	3
Genitale wratten	4	25.0	10	62.5	2	12.5	16
Overig	4	15.4	19	73.1	3	11.5	26
HIV+	.	.	1	100.0	.	.	1
Nihil	46	13.4	275	80.2	22	6.4	343
TOTAAL	57	13.6	327	77.9	36	8.6	420

13: GGD Zuid Kennemerland

Tabel 13.2:
Aantal consulten naar geslacht en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
man	65	50.39	93	58.13	6	31.58	164	53.25	138	54.33
vrouw	62	48.06	65	40.63	11	57.89	138	44.81	116	45.67
onbekend	2	1.55	2	1.25	2	10.53	6	1.95		
TOTAAL	129	100.00	160	100.00	19	100.00	308	100.00	254	100.00

Tabel 13.3:
Aantal consulten per maand en soort uitgevoerd onderzoek

	SOA onderzoek		HIV test		beide		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
MAAND										
januari	13	10.08	10	6.25	1	5.26	24	7.79	27	10.59
februari	8	6.20	9	5.63	1	5.26	18	5.84	24	9.41
maart	11	8.53	17	10.63	.	.	28	9.09	35	13.73
april	12	9.30	21	13.13	2	10.53	35	11.36	18	7.06
mei	11	8.53	13	8.13	.	.	24	7.79	15	5.88
juni	7	5.43	10	6.25	.	.	17	5.52	16	6.27
juli	11	8.53	10	6.25	2	10.53	23	7.47	23	9.02
augustus	11	8.53	15	9.38	1	5.26	27	8.77	27	10.59
september	12	9.30	18	11.25	1	5.26	31	10.06	20	7.84
oktober	18	13.95	8	5.00	4	21.05	30	9.74	15	5.88
november	7	5.43	15	9.38	3	15.79	25	8.12	19	7.45
december	8	6.20	14	8.75	4	21.05	26	8.44	16	6.27
TOTAAL	129	100.00	160	100.00	19	100.00	308	100.00	255	100.00

Tabel 13.4a:
Aantal consulten naar geslacht en reden bezoek van GGD

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BEZOEK I.V.M.										
SOA-onderzoek	56	34.15	47	34.06	1	16.67	104	33.77	59	23.23
HIV-test	93	56.71	66	47.83	2	33.33	161	52.27	162	63.78
beide	11	6.71	24	17.39	2	33.33	37	12.01	29	11.42
onbekend	4	2.44	1	0.72	1	16.67	6	1.95	4	1.57
TOTAAL	164	100.00	138	100.00	6	100.00	308	100.00	254	100.00

Tabel 13.4c:

Aantal consulten naar reden van bezoek, soort uitgevoerd onderzoek en diagnose

	SOA onderzoek	HIV test	beide	onbekend	totaal 1999	totaal 1998
SOORT ONDERZOEK & UITSLAG						
geen SOA onderzoek, HIV positief	.	4	.	.	4	.
geen SOA onderzoek, HIV negatief	.	153	1	2	156	166
SOA positief, geen HIV test	37	3	7	1	48	43
SOA positief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA positief, HIV negatief	.	.	4	.	4	2
SOA negatief, geen HIV test	67	1	10	3	81	34
SOA negatief, HIV positief	.	.	.	.	.	.
SOA negatief, HIV negatief	.	.	15	.	15	10
TOTAAL	104	161	37	6	308	255

Tabel 13.5:

Aantal consulten naar leeftijd en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LEEFTIJD										
14	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2.36
15-19	2	1.22	20	14.49	1	16.67	23	7.47	15	5.91
20-24	31	18.90	40	28.99	2	33.33	73	23.70	50	19.69
25-29	37	22.56	33	23.91	.	.	70	22.73	62	24.41
30-34	27	16.46	14	10.14	1	16.67	42	13.64	51	20.08
35-39	30	18.29	13	9.42	.	.	43	13.96	29	11.42
40-44	4	2.44	5	3.62	.	.	9	2.92	14	5.51
45-54	16	9.76	4	2.90	.	.	20	6.49	13	5.12
>54	14	8.54	8	5.80	1	16.67	23	7.47	11	4.33
??	3	1.83	1	0.72	1	16.67	5	1.62	3	1.18
TOTAAL	164	100.00	138	100.00	6	100.00	308	100.00	254	100.00

Tabel 13.6:

Aantal consulten naar land van herkomst en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
LAND V. HERKOMST										
Nederland	157	95.73	132	95.65	5	83.33	294	95.45	236	92.91
Turkije	1	0.61	.	.	.	.	1	0.32	1	0.39
Marokko	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.39
Sur./ Ant./ Aru.	1	0.61	.	.	.	.	1	0.32	1	0.39
overig	3	1.83	5	3.62	.	.	8	2.60	15	5.91
onbekend	2	1.22	1	0.72	1	16.67	4	1.30	.	.
TOTAAL	164	100.00	138	100.00	6	100.00	308	100.00	254	100.00

Tabel 13.7:
Aantal consulten naar seksuele gerichtheid, mannen

	totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%
SEKSUELE GERICHTHEID				
heteroseksueel	142	86.59	114	82.61
homoseksueel	19	11.59	21	15.22
biseksueel	2	1.22	1	0.72
onbekend	1	0.61	2	1.45
TOTAAL	164	100.00	138	100.00

Tabel 13.8:
Aantal consulten naar prostitutie en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PROSTITUTIE										
prostituë(e)	.	.	7	5.07	.	.	7	2.27	3	1.20
prostituant(e)	26	15.85	.	.	.	.	26	8.44	11	4.38
geen van beide	136	82.93	129	93.48	6	100.00	271	87.99	229	91.24
onbekend	2	1.22	2	1.45	.	.	4	1.30	8	3.19
TOTAAL	164	100.00	138	100.00	6	100.00	308	100.00	251	100.00

Tabel 13.10:
Aantal consulten naar SOA in anamnese en geslacht

	man		vrouw		onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SOA IN ANAMNESE										
ja, ooit een SOA	5	3.05	7	5.07	1	16.67	13	4.22	5	1.97
ja, ooit twee SOA	.	.	.	.	.	.	.	.	21	8.27
nee	157	95.73	128	92.75	5	83.33	290	94.16	220	86.61
onbekend	2	1.22	3	2.17	.	.	5	1.62	8	3.15
TOTAAL	164	100.00	138	100.00	6	100.00	308	100.00	254	100.00

Tabel 13.11:
Aantal gestelde diagnoses naar geslacht

	man		vrouw		Onbekend		totaal 1999		totaal 1998	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
DIAGNOSE										
Gonorroë (excl.PVG)	1	0.6	.	.	.	.	1	0.3	3	1.2
Gonorroë: PVG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: niet gespecificeerd	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primair	1	0.6	.	.	.	.	1	0.3	.	.
" : secundair	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens recens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : latens tarda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	1	0.6	3	2.1	.	.	4	1.3	6	2.3
Herpes genitalis: primo: HSV type ?	1	0.6	2	1.4	.	.	3	1.0	.	.
" : primo:HSV-type1&2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" : primo: HSV type 1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.4
" : primo: HSV type 2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.4
" : recidief	1	0.6	1	0.7	.	.	2	0.6	.	.
Genitale wratten	4	2.4	3	2.1	1	14.3	8	2.6	5	2.0
Hepatitis B: acuut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hepatitis B: chronisch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niet Specifieke Urethritis	2	1.2	.	.	.	.	2	0.6	2	0.8
Bacteriele Vaginose	3	1.8	10	7.1	1	14.3	14	4.5	6	2.3
Trichomoniasis	1	0.6	.	.	.	.	1	0.3	2	0.8
Candidiasis	7	4.2	3	2.1	.	.	10	3.2	7	2.7
Schaamluis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulcus molle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Granuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Overig/ niet gespecificeerd	6	3.6	.	.	.	.	6	1.9	11	4.3
PID	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
HIV +	2	1.2	2	1.4	.	.	4	1.3	.	.
<i>gediagnostiseerde infecties</i>	<i>30</i>	<i>18.2</i>	<i>24</i>	<i>17.1</i>	<i>2</i>	<i>28.6</i>	<i>56</i>	<i>17.9</i>	<i>44</i>	<i>17.2</i>
HIV -	97	58.8	74	52.9	4	57.1	175	56.1	178	69.5
Nihil *	38	23.0	42	30.0	1	14.3	81	26.0	34	13.3
TOTAAL	165	100	140	100	7	100	312	100	256	100

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie vallen onder 'HIV -' en worden niet bij 'Nihil' meegerekend.

Tabel 13.13a:
Diagnoses naar leeftijd, mannen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	1
Chlamydia	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
genitale wratten	.	.	.	.	.	.	3	75.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
overig	.	.	.	.	4	21.1	3	15.8	3	15.8	3	15.8	3	15.8	2	10.5	1	5.3	.	.	19
HIV+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	2
Nihil *	.	.	2	1.5	26	19.4	30	22.4	21	15.7	27	20.1	1	0.7	12	9.0	12	9.0	3	2.2	134
TOTAAL	.	.	2	1.2	31	18.9	37	22.6	27	16.5	30	18.3	4	2.4	16	9.8	14	8.5	3	1.8	164

Tabel 13.13b:
Diagnoses naar leeftijd, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-54		>54		??		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE																					
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syf.: Pr. & S.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia	.	.	.	.	1	33.3	1	33.3	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	3
herpes genitalis	.	.	.	.	.	.	1	33.3	2	66.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
genitale wratten	.	.	1	33.3	.	.	2	66.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
overig	.	.	6	46.2	5	38.5	.	.	.	.	1	7.7	.	.	.	.	1	7.7	.	.	13
HIV+	.	.	.	.	.	.	2	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Nihil *	.	.	13	11.4	34	29.8	27	23.7	12	10.5	12	10.5	4	3.5	4	3.5	7	6.1	1	0.9	114
TOTAAL	.	.	20	14.5	40	29.0	33	23.9	14	10.1	13	9.4	5	3.6	4	2.9	8	5.8	1	0.7	138

*Nihil: HIV-negatieven zonder andere infectie worden onder 'Nihil' meegerekend, ook in de tabellen 2.14 t/m 2.18a.

Tabel 13.14:
Diagnoses naar land van herkomst, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	Nederland		Turkije		Marokko		Sur./Ant./Aru.		overig		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
DIAGNOSE													
Gonorroë	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	1	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	3	75.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	.	.	4
Herpes genitalis	5	100.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Genitale wratten	7	87.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12.5	8
Overig	31	93.9	.	.	.	.	1	3.0	1	3.0	.	.	33
HIV+	3	75.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	.	.	4
Nihil	243	96.4	1	0.4	.	.	.	.	5	2.0	3	1.2	252
TOTAAL	294	95.5	1	0.3	.	.	1	0.3	8	2.6	4	1.3	308

Tabel 13.15:

Diagnoses naar seksuele gerichtheid, mannen (percentages in horizontale richting)

	heteroseksueel		homoseksueel		biseksueel		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	.	.	1
Chlamydia infectie	1	100.0	.	.	.	.	.	.	1
Herpes genitalis	2	100.0	.	.	.	.	.	.	2
Genitale wratten	3	75.0	.	.	1	25.0	.	.	4
Overig	16	84.2	3	15.8	.	.	.	.	19
HIV+	1	50.0	1	50.0	.	.	.	.	2
Nihil	118	88.1	14	10.4	1	0.7	1	0.7	134
TOTAAL	142	86.6	19	11.6	2	1.2	1	0.6	164

Tabel 13.16a:

Diagnoses naar prostitutie, mannen (percentages in horizontale richting)

	prostituté		prostituut		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	.	.	1	100.0	.	.	1
Herpes genitalis	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	2
Genitale wratten	.	.	.	.	4	100.0	.	.	4
Overig	.	.	5	26.3	14	73.7	.	.	19
HIV+	.	.	.	.	2	100.0	.	.	2
Nihil	.	.	20	14.9	112	83.6	2	1.5	134
TOTAAL	.	.	26	15.9	136	82.9	2	1.2	164

Tabel 13.16b:

Diagnoses naar prostitutie, vrouwen (percentages in horizontale richting)

	prostituée		prostituante		geen van beide		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE									
Gonorroë	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chlamydia infectie	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Herpes genitalis	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Genitale wratten	.	.	.	.	3	100.0	.	.	3
Overig	.	.	.	.	12	92.3	1	7.7	13
HIV+	1	50.0	.	.	1	50.0	.	.	2
Nihil	6	5.3	.	.	107	93.9	1	0.9	114
TOTAAL	7	5.1	.	.	129	93.5	2	1.4	138

Tabel 13.18a:

Diagnoses naar SOA in anamnese, mannen en vrouwen (percentages in horizontale richting)

	ja, ooit een SOA gehad		nee		onbekend		totaal
	N	%	N	%	N	%	N
DIAGNOSE							
Gonorroë	.	.	1	100.0	.	.	1
Syfilis: Prim. & Sec.	.	.	1	100.0	.	.	1
Chlamydia infectie	.	.	4	100.0	.	.	4
Herpes genitalis	1	20.0	4	80.0	.	.	5
Genitale wratten	2	25.0	6	75.0	.	.	8
Overig	3	9.1	29	87.9	1	3.0	33
HIV+	.	.	4	100.0	.	.	4
Nihil	7	2.8	241	95.6	4	1.6	252
TOTAAL	13	4.2	290	94.2	5	1.6	308

Bijlagen

Bijlage 1	Verzendlijst
Bijlage 2	Achtergrond SOA-registratie
Bijlage 3	Definities
Bijlage 4	Registratiekaart 1999
Bijlage 5	Toelichting op het invullen van het registratieformulier niet-curatieve SOA- bestrijding, versie 1995

Bijlage 1: Verzendlijst

1	Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg
2-4	Ministerie van VWS, Directeur-generaal
5	Inspecteur Infectieziekten van de Inspectie Gezondheidszorg
6	Hoofdinspectie voor de curatieve somatische gezondheidszorg
7	Voorzitter van de Gezondheidsraad
8	GGD Nederland
9	Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding
10-26	Streeklaboratoria
27-42	Leden IGZ-infectieziekten overleg RIVM
43-88	Sociaal verpleegkundigen SOA/AIDS bestrijding, GGD's
89-134	Artsen infectieziektenbestrijding, GGD's
135-144	Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding
145-153	Hoofden SOA-poliklinieken
154	Prof. dr. J. van der Meer, Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten
155	Prof. dr. H. Verbrugh, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
156	Stichting soa-bestrijding
157	Stichting AIDS Fonds
158	Bestuur SOA-commissie, Ned. Ver. Dermatologie en Venereologie
159	Bestuur Nederlandse Vereniging voor Studie van SOA
160	Ziekenfondsraad
161	Dr. H. Bijkerk
162	Depot Nederlandse Publicaties en Nederlandse bibliografie
163	Directie RIVM
164	Prof. dr. ir. D. Kromhout
165	Dr. J. L. Kool
166	Dr. J.G. Loeber
167	Dr. T.G. Kimman
168	Dr. ir. A.M. Henken
169	Dr. ir. J.C. Seidell
170	Dr. D. Ruwaard
171	Prof. dr. van de Bosch
172	Dr. ir. B.P.M. Bloemberg
173-180	Projectleiders Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie
181-183	Auteurs
184	Hoofd Voorlichting en Public Relations RIVM
185	Bibliotheek RIVM
186	Bureau Rapportenregistratie
187-210	Reserve exemplaren
211-300	Bureau Rapportenbeheer

Bijlage 2: Achtergrond SOA-registratie

De doelstelling van de registratie is: het verzamelen van achtergrondgegevens van personen die met een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek een GGD of SOA-polikliniek bezoeken en het registreren van de eventueel gestelde SOA-diagnoses en HIV-test uitslag. De vrijwillige registratie wordt uitgevoerd door sociaal verpleegkundigen werkzaam in de SOA-bestrijding bij GGD's en bij drempelvrije en laagdrempelige SOA-poliklinieken. Achtergrondgegevens betreffen naast leeftijd en geslacht ook woonplaats, nationaliteit, risicogroep (prostitutie, homoseksuele contacten, druggebruik) en SOA-voorgeschiedenis. In het kader van deze registratie vullen sociaal verpleegkundigen de registratiekaart in.

De SOA-registratie omvat gegevens over het aantal personen dat een sociaal verpleegkundige (SV), werkzaam in de SOA/AIDS-bestrijding van een GGD of drempelvrije SOA-polikliniek, bezoekt i.v.m. een SOA-hulpvraag, een HIV-testverzoek of beide. Als daadwerkelijk onderzoek naar SOA of HIV uitgevoerd is (of gaat worden) en de uitslag bij de SV bekend is (of wordt doorgegeven), worden de gegevens over de patiënt geregistreerd op de registratiekaart. De patiënt kan zijn doorverwezen (voor een consultatie bij de SV) door de huisarts of specialist of kan rechtstreeks de SV benaderd hebben al dan niet in combinatie met een bezoek aan de SOA-polikliniek of GGD.

De procedure voor het invullen van de SOA-registratiekaart staat vermeld in de 'toelichting op het invullen van het registratieformulier niet-curatieve SOA-bestrijding' (bijlage 5) en wordt beïnvloed door een aantal factoren:

Bij HIV-testverzoeken zal vrijwel altijd een pretest gesprek met de SV plaatsvinden omdat de cliënt toestemming moet geven ('informed consent') voor het uitvoeren van de HIV-test.

Bij een SOA-hulpvraag wordt niet altijd een registratiekaart ingevuld want dat is afhankelijk van het verwijzen van de SOA-patiënt naar de SV, het consulteren van de SV door de patiënt en de beschikbaarheid van de SV tijdens het SOA-sprekuur. Deze factoren hebben regionale verschillen in de werkwijze tot gevolg, waardoor de validiteit en de kwaliteit van de registratie wordt beïnvloed.

Bij het verwerken van een negatieve uitslag van SOA-onderzoek (diagnose SOA nihil) wordt bij sommige GGD's de registratiekaart niet (of niet altijd) ingevuld. Daardoor wordt het berekenen van percentages (zoals het percentage van consulten met gonorroe of chlamydia) bemoeilijkt vanwege onbetrouwbare noemeraantallen en wordt de vergelijkbaarheid tussen GGD's bemoeilijkt.

De huidige registratiekaart en de bijbehorende toelichting worden gebruikt vanaf februari 1995. De registratiekaart bestaat uit een A-gedeelte, dat bedoeld is voor de nationale registratie, en een B-gedeelte dat als patiëntenstatus kan worden gebruikt. Het A-gedeelte wordt na invulling gekopieerd en aan de Stichting SOA-bestrijding verstuurd voor verdere bewerking.

Beperkingen van de registratie.

De representativiteit van de SOA-registratie (in hoeverre beschrijft het systeem het voorkomen in de tijd en de verdeling in de bevolking naar plaats en persoon) wordt gezien als het grootste probleem voor de validiteit van de registratie. Dit wordt veroorzaakt door

- de regionale verschillen in de werkwijze en de onbekende selectie van patiënten die de GGD's of SOA-poliklinieken bezoekt.
- regionale verschillen in het aandeel van de verschillende behandelaars zoals bleek uit het SOA-dichtheidsonderzoek over 1985.

Desalniettemin geeft de registratie inzicht in de populatie die GGD's en drempelvrije SOA-poliklinieken bezocht heeft in een bepaald jaar.

De registratiekaart dient te worden ingevuld indien daadwerkelijk onderzoek verricht wordt en een gesprek met de SV plaatsvindt. Het verwijsbeleid ten aanzien van een HIV-testverzoek op landelijk niveau is waarschijnlijk het meest consistent omdat er altijd een pre-test gesprek zal plaatsvinden waarin ook een 'informed consent' van de patient wordt gevraagd. Ook voor de bacteriële SOA is het verwijsbeleid op landelijk niveau waarschijnlijk consistent en vergelijkbaar (en traditioneel bepaald door activiteiten in het kader van de bron- en contactopsporing). Het verwijsbeleid ten aanzien van de virale SOA is niet eenduidig; in sommige GGD's zullen geen consulten met de SV plaatsvinden als herpes genitalis of genitale wratten zijn gediagnosticeerd. In sommige gevallen is de SV al geconsulteerd voordat de diagnose bekend was of zijn deze infecties als co-infecties bij een bacteriële SOA gevonden en geregistreerd. Voor de surveillance van SOA is het echter van groot belang dat het registratieprotocol eenduidig is en dat uniformiteit in en de kwaliteit van de gegevensverzameling wordt verbeterd.

Ondanks de mogelijke vertekening in de gegevensverzameling is deze registratie van SOA waardevol, omdat het de enige op nationaal niveau is mét achtergrondgegevens van patiënten en bovendien niet beperkt is tot enkele SOA. Trends in het voorkomen van SOA en determinanten kunnen uit de verzamelde gegevens gevolgd worden. Hierbij wordt verondersteld dat geen belangrijke veranderingen in de 'circuitkeuze' van SOA-patiënten zijn opgetreden, dat de werkwijze binnen GGD's en de vertegenwoordiging van risicogroepen op het spreekuur van SV'en relatief stabiel gebleven zijn.

Bijlage 3: Definities

Consult: bezoek aan GGD of SOA-polikliniek in verband met SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek dat heeft geleid tot daadwerkelijk onderzoek en een gesprek met de sociaal verpleegkundige. Hierbij is de uitslag van het onderzoek bekend (positief of negatief). Consulten bij GGD's zonder contact met de SV zijn niet in deze registratie opgenomen evenals de consulten die niet tot onderzoek hebben geleid. Het consult waarbij specifiek onderzoek (SOA en HIV-test) is uitgevoerd hoeft niet hetzelfde te zijn als de reden van het bezoek. Bijvoorbeeld: een patiënt bezoekt een GGD vanwege een HIV-testverzoek maar wordt, na consultatie met de SV, ook op de andere SOA onderzocht.

Bezoekers: personen die de GGD of SOA-polikliniek hebben geconsulteerd en waarvoor een registratiekaart is ingevuld en opgestuurd (onderzoek is uitgevoerd of gaat uitgevoerd worden; diagnose kan wel of niet positief zijn).

Diagnose: de diagnose, als resultaat van uitgevoerd onderzoek, wordt gesteld door de arts en zal veelal gebaseerd zijn op laboratoriumonderzoek (het is overigens onbekend welk onderzoek is aangevraagd). De diagnose moet bekend zijn alvorens de registratiekaart ingevuld kan worden: de diagnose kan ook 'nihil' (d.w.z. geen SOA gediagnosticeerd) zijn.

Voorkomen van SOA: Gezien de aard van de SOA-registratie dienen aanduidingen met betrekking tot een bepaalde diagnose (bijv. 'in de SOA-registratie is Chlamydia de meest voorkomende SOA') in principe gelezen te worden als 'in de SOA-registratie vonden de meeste consulten bij de SV plaats ten behoeve van patiënten met chlamydia'. Echter, ten behoeve van de leesbaarheid en met deze beperking in gedachten, is gekozen voor de eerstgenoemde schrijfwijze.

SOA-polikliniek: dit betreft niet alleen de zes drempelvrije SOA-poliklinieken in de vier grote steden maar ook de laagdrempelige SOA-poliklinieken waar SV'en ook (gedeeltelijk) aanwezig zijn. De aanwezigheid en beschikbaarheid van de SV variëren per polikliniek.

Bijlage 4

Volgnummer

Kopie van de voorzijde (deel A) - volledig ingevuld -
toezenden aan: Stichting soa-bestrijding, Postbus 8198, 3503 RD Utrecht

Registratieformulier niet-curatieve soa-bestrijding deel A

1 Instellingscode 2 Inschrijfdatum 3 Geslacht 1 ☐ man 2 ☐ vrouw 4 Geboortedatum	5 Geboorteland Nationaliteit ☐ Nederlands ☐ Turks ☐ Surinaams ☐ Marokkaans ☐ Antilliaans ☐ anders, namelijk 6 Woongemeente Provincie																																																																																																
7 Bezoek in verband met 1 ☐ SOA-hulpvraag 2 ☐ HIV-testverzoek 3 ☐ beide 8 Reden (meerdere antwoorden mogelijk) <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Reden SOA-hulpvraag</th><th style="text-align: center;">Reden HIV-testverzoek</th></tr></thead><tbody><tr><td>klachten</td><td style="text-align: center;">1 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>begin nieuwe relatie</td><td style="text-align: center;">2 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>kinderwens</td><td style="text-align: center;">3 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>eigen risicogedrag</td><td style="text-align: center;">4 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>risicogedrag partner</td><td style="text-align: center;">5 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>partner HIV-positief</td><td style="text-align: center;">6 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>gewaarschuwd door:</td><td></td><td></td></tr><tr><td> partner</td><td style="text-align: center;">7 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td> sociaal-verpleegkundige</td><td style="text-align: center;">8 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td> anders</td><td style="text-align: center;">9 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>periodieke controle</td><td style="text-align: center;">10 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>na seksueel geweld</td><td style="text-align: center;">11 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>extreme angst</td><td style="text-align: center;">12 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>prik-accident</td><td style="text-align: center;">13 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>i.v.m. verzekering</td><td style="text-align: center;">14 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>onbekend</td><td style="text-align: center;">15 ☐</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr><tr><td>anders, namelijk</td><td style="text-align: center;">16</td><td></td></tr></tbody></table>		Reden SOA-hulpvraag	Reden HIV-testverzoek	klachten	1 ☐	☐	begin nieuwe relatie	2 ☐	☐	kinderwens	3 ☐	☐	eigen risicogedrag	4 ☐	☐	risicogedrag partner	5 ☐	☐	partner HIV-positief	6 ☐	☐	gewaarschuwd door:			partner	7 ☐	☐	sociaal-verpleegkundige	8 ☐	☐	anders	9 ☐	☐	periodieke controle	10 ☐	☐	na seksueel geweld	11 ☐	☐	extreme angst	12 ☐	☐	prik-accident	13 ☐	☐	i.v.m. verzekering	14 ☐	☐	onbekend	15 ☐	☐	anders, namelijk	16		13 Vastgestelde diagnose (meerdere antwoorden mogelijk) <table border="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td>1 ☐ Gonorroe</td><td>17 ☐ Bacteriële Vaginose/BV</td></tr><tr><td>2 ☐ PVG</td><td>18 ☐ Scabies/Schurft</td></tr><tr><td>3 ☐ Chlamydia-infectie</td><td>19 ☐ Schaamluis-infectie</td></tr><tr><td>4 ☐ Niet Specifieke Urethritis</td><td>20 ☐ Trichomoniasis</td></tr><tr><td>5 ☐ Syfilis met stadia:</td><td>21 ☐ Candidiasis</td></tr><tr><td>6 ☐ lues I</td><td>22 ☐ Ulcus molle</td></tr><tr><td>7 ☐ lues II</td><td>23 ☐ Lymphogranuloma venereum</td></tr><tr><td>8 ☐ lues latens recens</td><td>24 ☐ Donovanosis</td></tr><tr><td>9 ☐ lues latens tarda</td><td>25 ☐ Hepatitis B acute infectie</td></tr><tr><td>10 ☐ Herpes genitalis primo-infectie</td><td>26 ☐ Hepatitis B chronisch dragerschap</td></tr><tr><td>11 ☐ HSV 1</td><td>27 ☐ PID</td></tr><tr><td>12 ☐ HSV 2</td><td></td></tr><tr><td>13 ☐ Herpes genitalis recidief</td><td></td></tr><tr><td>14 ☐ Condylomata acuminata</td><td>28 ☐ Geén SOA vastgesteld</td></tr><tr><td>15 ☐ HIV-seronegatief</td><td>29 ☐ andere diagnose, namelijk</td></tr><tr><td>16 ☐ HIV-seropositief</td><td></td></tr></tbody></table> 14 Lokatie in geval van Gonorroe en Chlamydia-infectie <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Gonorroe:</th><th style="text-align: left;">Chlamydia-infectie:</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ☐ urethraal/cervicaal</td><td>1 ☐ urethraal/cervicaal</td></tr><tr><td>2 ☐ anaal/rectaal</td><td>2 ☐ anaal/rectaal</td></tr><tr><td>3 ☐ mond/keel</td><td>3 ☐ mond/keel</td></tr><tr><td>4 ☐ oog</td><td>4 ☐ oog</td></tr></tbody></table>	1 ☐ Gonorroe	17 ☐ Bacteriële Vaginose/BV	2 ☐ PVG	18 ☐ Scabies/Schurft	3 ☐ Chlamydia-infectie	19 ☐ Schaamluis-infectie	4 ☐ Niet Specifieke Urethritis	20 ☐ Trichomoniasis	5 ☐ Syfilis met stadia:	21 ☐ Candidiasis	6 ☐ lues I	22 ☐ Ulcus molle	7 ☐ lues II	23 ☐ Lymphogranuloma venereum	8 ☐ lues latens recens	24 ☐ Donovanosis	9 ☐ lues latens tarda	25 ☐ Hepatitis B acute infectie	10 ☐ Herpes genitalis primo-infectie	26 ☐ Hepatitis B chronisch dragerschap	11 ☐ HSV 1	27 ☐ PID	12 ☐ HSV 2		13 ☐ Herpes genitalis recidief		14 ☐ Condylomata acuminata	28 ☐ Geén SOA vastgesteld	15 ☐ HIV-seronegatief	29 ☐ andere diagnose, namelijk	16 ☐ HIV-seropositief		Gonorroe:	Chlamydia-infectie:	1 ☐ urethraal/cervicaal	1 ☐ urethraal/cervicaal	2 ☐ anaal/rectaal	2 ☐ anaal/rectaal	3 ☐ mond/keel	3 ☐ mond/keel	4 ☐ oog	4 ☐ oog
	Reden SOA-hulpvraag	Reden HIV-testverzoek																																																																																															
klachten	1 ☐	☐																																																																																															
begin nieuwe relatie	2 ☐	☐																																																																																															
kinderwens	3 ☐	☐																																																																																															
eigen risicogedrag	4 ☐	☐																																																																																															
risicogedrag partner	5 ☐	☐																																																																																															
partner HIV-positief	6 ☐	☐																																																																																															
gewaarschuwd door:																																																																																																	
partner	7 ☐	☐																																																																																															
sociaal-verpleegkundige	8 ☐	☐																																																																																															
anders	9 ☐	☐																																																																																															
periodieke controle	10 ☐	☐																																																																																															
na seksueel geweld	11 ☐	☐																																																																																															
extreme angst	12 ☐	☐																																																																																															
prik-accident	13 ☐	☐																																																																																															
i.v.m. verzekering	14 ☐	☐																																																																																															
onbekend	15 ☐	☐																																																																																															
anders, namelijk	16																																																																																																
1 ☐ Gonorroe	17 ☐ Bacteriële Vaginose/BV																																																																																																
2 ☐ PVG	18 ☐ Scabies/Schurft																																																																																																
3 ☐ Chlamydia-infectie	19 ☐ Schaamluis-infectie																																																																																																
4 ☐ Niet Specifieke Urethritis	20 ☐ Trichomoniasis																																																																																																
5 ☐ Syfilis met stadia:	21 ☐ Candidiasis																																																																																																
6 ☐ lues I	22 ☐ Ulcus molle																																																																																																
7 ☐ lues II	23 ☐ Lymphogranuloma venereum																																																																																																
8 ☐ lues latens recens	24 ☐ Donovanosis																																																																																																
9 ☐ lues latens tarda	25 ☐ Hepatitis B acute infectie																																																																																																
10 ☐ Herpes genitalis primo-infectie	26 ☐ Hepatitis B chronisch dragerschap																																																																																																
11 ☐ HSV 1	27 ☐ PID																																																																																																
12 ☐ HSV 2																																																																																																	
13 ☐ Herpes genitalis recidief																																																																																																	
14 ☐ Condylomata acuminata	28 ☐ Geén SOA vastgesteld																																																																																																
15 ☐ HIV-seronegatief	29 ☐ andere diagnose, namelijk																																																																																																
16 ☐ HIV-seropositief																																																																																																	
Gonorroe:	Chlamydia-infectie:																																																																																																
1 ☐ urethraal/cervicaal	1 ☐ urethraal/cervicaal																																																																																																
2 ☐ anaal/rectaal	2 ☐ anaal/rectaal																																																																																																
3 ☐ mond/keel	3 ☐ mond/keel																																																																																																
4 ☐ oog	4 ☐ oog																																																																																																
9 Seksuele contacten 1 ☐ met vrouw(en) 2 ☐ met man(nen) 3 ☐ met beide 4 ☐ niet gevraagd 5 ☐ onbekend 11 Prostitutie afgelopen zes maanden 1 ☐ cliënt heeft geen relatie met prostitutie 2 ☐ cliënt is prostitue(e) 3 ☐ cliënt is prostituant 4 ☐ cliënt is partner van prostitue(e) 5 ☐ niet gevraagd 6 ☐ onbekend	10 Ooit eerder soa gehad 1 ☐ ja Indien ja welke soa? 7 ☐ nee 8 ☐ niet gevraagd 9 ☐ onbekend 2 ☐ Gonorroe 3 ☐ Syfilis 4 ☐ Chlamydia-infectie 5 ☐ anders, namelijk 6 ☐ onbekend 12 Druggebruik afgelopen zes maanden 1 ☐ ja Indien ja: 7 ☐ nee 8 ☐ niet gevraagd 9 ☐ onbekend 2 ☐ intraveneus 3 ☐ niet intraveneus 4 ☐ niet gevraagd 5 ☐ anders, namelijk 6 ☐ onbekend																																																																																																

Registratieformulier niet-curatieve soa-bestrijding deel B

1 Datum 1e gesprek: - - - - - 2 Naam Voornamen 3 Geslacht ☐ man ☐ vrouw 4 Geboortedatum/leeftijd	5 Vast/tijdelijk verblijfadres Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer 6 Huisarts 7 Behandelend arts															
8 Klachten sinds (datum): - - - - - Aard klachten: 9 Indien vrouwelijke cliënt vragen naar: anticonceptie, zwangerschap, uitstrijkje baarmoedermond 10 HBV vaccinatie ☐ ja, dd. - - - - -	11 Laboratorium onderzoek verricht in verband met: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: left;">soa</th> <th style="width: 33%; text-align: left;">onderzoek</th> <th style="width: 33%; text-align: left;">uitslag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> 12 Therapie	soa	onderzoek	uitslag												
soa	onderzoek	uitslag														
13 Doorgestuurd naar 14 Gebruik VOMIL-regeling ☐ ja ☐ nee	15 Contactonderzoek en partnerwaarschuwing door patiënt gemeld aantal seksuele partners aantal gewaarschuwde seksuele partners gewaarschuwd door: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> patiënt zelf behandelaar </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> sociaal-verpleegkundige onbekend </td> </tr> </table>	patiënt zelf behandelaar	sociaal-verpleegkundige onbekend													
patiënt zelf behandelaar	sociaal-verpleegkundige onbekend															

19 Overige gegevens/opmerkingen

Bijlage 5



**TOELICHTING
OP HET INVULLEN VAN HET
REGISTRATIEFORMULIER
NIET-CURATIEVE SOA-BESTRIJDING**

VERSIE 1995

INHOUD

INLEIDING

1. Het gewijzigde registratieformulier	1
2. Invullen deel A	1
3. Invullen deel B	2
4. Inzending	2
5. Verwerking, analyse en rapportage	2

INSTRUCTIE EN TOELICHTING PER VRAAG

Volgnummer	3
01. Instellingscode	3
02. Inschrijfdatum	4
03. Geslacht	4
04. Geboortedatum	4
05. Geboorteland	4
06. Woongemeente	5
Provincie	5
07. Reden bezoek	5
08. Reden soa-hulpvraag en/of HIV-testverzoek	6
09. Seksuele contacten	6
10. Ooit eerder soa gehad	6
11. Prostitutie afgelopen drie maanden	7
12. Druggebruik afgelopen zes maanden	7
13. Vastgestelde diagnose	7
14. Lokatie in geval van gonorroe en CT-infectie	8

INLEIDING

1. HET GEWIJZIGDE REGISTRATIEFORMULIER

Het gewijzigde registratieformulier bestaat uit twee delen: deel A en deel B en - als bijlagen - drie codelijsten en deze toelichting.

DEEL A is het eigenlijke registratiegedeelte met 14 vragen. Deze zijn in vier blokken onderverdeeld, namelijk:

- a. algemene gegevens en persoonsgegevens;
- b. informatie over de achtergrond van het bezoek aan de instelling;
- c. informatie over mogelijk risicogedrag;
- d. informatie over vastgestelde diagnose(s).

De gegevens in deel A zijn van belang voor de epidemiologische analyse. Van een volledig ingevuld deel A wordt een kopie worden opgestuurd aan de SOA Stichting.

DEEL B - de achterzijde van het registratieformulier - bevat vragen en aandachtspunten die niet van primair belang zijn voor de analyse, maar als 'cliëntendossier' wel van betekenis (kunnen) zijn voor een goede beroepsuitoefening (begeleiding en hulpverlening). Het betreft onder andere aanvullende gegevens over de cliënt, informatie over uitgevoerd laboratorium-onderzoek, therapie, partnerwaarschuwing en vervolgspraken. Het gebruik van dit deel B is facultatief. De informatie blijft bij de instelling achter en valt onder de privacy-wetgeving en de Wet op de Behandelings Overeenkomst (WBO) en dient zorgvuldig te worden opgeborgen.

BIJLAGEN - voor het invullen van de vragen 1, 5 en 6 van deel A is het noodzakelijk over een code-lijst te beschikken. De drie benodigde **codelijsten** zijn bijgevoegd, te weten:

1. CBS Gemeente-codelijst
2. CBS Landen-codelijst
3. GBA Nationaliteiten-codelijst

2. INVULLEN DEEL A

In de volgende gevallen dient **deel A** te worden ingevuld en **een kopie** opgestuurd naar de SOA Stichting:

1. Bij elk **nieuw consult**. Dat is bij iedere cliënt die in verband met een soa-hulpvraag of een HIV-testverzoek voor een consult de instelling bezoekt, waarna soa-onderzoek en/of een HIV-test wordt uitgevoerd, waarvan de **definitieve uitslag** vervolgens ook **bekend** is (laboratoriumuitslag);
2. Als 1, ook indien de **uitslag** van het onderzoek **negatief** is, dat wil zeggen: geen soa geconstateerd (invullen: geen soa vastgesteld) en/of cliënt HIV-seronegatief (aankruisen).
3. Als 1, indien een cliënt in één jaar **meerdere keren** de instelling bezoekt, in verband met een **nieuwe** soa-hulpvraag en/of een HIV-testverzoek (recidivisme en 'ping pong'-effect: herbesmetting via onbehandelde partner).
Voor deze personen wordt steeds een nieuw formulier ingevuld, waarna - als de (nieuwe) uitslag bekend is - een kopie naar de SOA Stichting wordt opgestuurd.
4. Voor cliënten met **complicaties** ten gevolge van een soa, zoals PID, neurolyues, Go-arthritis en dragerschap Hepatitis B, als de **oorzaak** van de complicaties door middel van laboratorium-onderzoek een **soa** blijkt te zijn.

Deel A kan worden ingevuld, maar er wordt **géén kopie** gemaakt en opgestuurd in de volgende gevallen.

- a. er is sprake van een 'oud' consult, bijvoorbeeld een cliënt bezoekt de instelling in verband met een controle;
- b. een cliënt komt alleen voor informatie over soa en/of aids;
- c. het consult is telefonisch; de cliënt bezoekt de instelling niet;
- d. een cliënt komt met een HIV-testverzoek, maar er wordt geen test uitgevoerd of soa-onderzoek gedaan;
- d. een cliënt wordt doorverwezen voor andere problemen dan een soa.

3. INVULLEN DEEL B

Deel B kan worden gebruikt als aanvulling op deel A. Tezamen met deel A vormt deel B het 'cliënten-dossier' dat bij de instelling achterblijft en onder de privacy-wetgeving valt.

Het staat de sociaal-verpleegkundige / hulpverlener vrij deel B in te vullen. In deel B zijn wel items en aandachtspunten opgenomen die voor de dossiervorming van belang zijn. Enkele vragen die voorheen tot deel A behoorden, zijn naar deel B verplaatst: voor de algemene registratie zijn ze van minder belang, maar de informatie past wel in een patiënten-dossier.

4. INZENDING

Indien deel A volledig is ingevuld - de diagnose moet bekend zijn - en overigens aan de voorwaarden voor insturen is voldaan (zie '2. Invullen' deel A) dient van deel A een **kopie** te worden gemaakt; dus alléén van de voorzijde van het formulier. Deze kopie kan vervolgens naar de SOA Stichting worden opgestuurd.

Nadat de kopie is gemaakt wordt het rechterbovenhoekje van het formulier verwijderd, zodat duidelijk is dat de procedure ten behoeve van de registratie is afgerond, namelijk: deel A van het formulier is volledig ingevuld, er is een kopie gemaakt en deze is naar de SOA Stichting opgestuurd.

In verband met de verwerking verdient het aanbeveling de registratieformulieren **maandelijks** op te sturen, voor het laatst in de maand februari in het jaar volgend op het jaar van registratie (registratiegegevens 1995 dus uiterlijk eind februari 1996 opsturen). Formulieren opsturen naar:

SOA Stichting
Postbus 9074
3506 GB UTRECHT

Attentie:

Kopie van deel A nooit opsturen indien

- formulier niet volledig is ingevuld en
- definitieve diagnose niet is vastgesteld (vraag 12)

5. VERWERKING, ANALYSE EN RAPPORTAGE

De SOA Stichting verwerkt de registratieformulieren en laat deze analyseren in de maanden februari en maart volgend op het jaar van registratie. In april wordt het rapport met analyse-gegevens, tabellen en conclusies verspreid.

De SOA Stichting heeft met ingang van 1994 (rapportage over 1993) extra aandacht besteed aan deze feed back. De landelijke registratiegegevens (totaal van alle GGD-en) zijn op een meer overzichtelijke en toegankelijke wijze gepresenteerd. Met behulp van de reacties die daarop zijn ontvangen zal de rapportage over de komende jaren verder worden verbeterd, met aandacht voor de mogelijkheden om geanalyseerde gegevens per instelling ter beschikking te stellen.

INSTRUCTIE EN TOELICHTING PER VRAAG

Volgnummer

--	--	--	--	--	--	--	--

Het volgnummer wordt toegekend aan de cliënt of het formulier; het invullen is facultatief en dient de eigen administratie (opslaan en terugvinden in de kaartenbak).

Suggestie: het volgnummer opbouwen uit de geboorte-datum, code voor geslacht en eerste letter (meisjes)achternaam.

Voorbeeld: Mevrouw Pietersen-Janssen, geboren 16.02.40. Volgnummer wordt 16.02.40 V J
(V = vrouw).

Rechterbovenhoekje

Het rechterbovenhoekje dient te worden verwijderd nadat een kopie is gemaakt van het volledig ingevulde deel A. De kopie kan worden opgestuurd naar de SOA Stichting. Het formulier blijft bij de instelling. Het verwijderen van het rechterbovenhoekje is bedoeld als (interne) controle, namelijk dat de registratieprocedure volledig is afgerond.

01. Instellingscode

	A		B	C
--	---	--	---	---

De instellingscode bestaat uit drie delen:

- A. Een drie-cijfercode voor de gemeente waar de instelling is gevestigd (CBS-codering). Zie bijlage 1 voor codelijst. De eerste 0 vervalt.
Invullen: CBS-gemeentecode.

Voorbeeld: GGD Nijmegen - gemeentecode: (0) 268

- B. Een één-cijfercode voor de spreekuur-lokatie:

GGD (exclusief soa-poli)	code = 1
Drempelvrije soa-polikliniek	code = 2
Andere soa-polikliniek	code = 3
SAD-weekendpoli	code = 4
Huiskamer	code = 5

Invullen: code voor de spreekuur-lokatie.

Voorbeeld 1: drempelvrije soa-polikliniek Utrecht = code 2

Drempelvrije soa-poliklinieken zijn de zes door de Ziekenfondsraad als zodanig aangemerkte poliklinieken in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Voorbeeld 2: GGD Groningen = code 1; Soa-poli Academisch Ziekenhuis Groningen = code 3

- C. Een één-cijfercode voor degene die het registratieformulier invult.
Invullen: persoonlijke code van hulpverlener.

Voorbeeld instellingscode: sociaal-verpleegkundige 3 werkzaam bij GGD Breda:
invullen: code Breda, code instelling, code sv = 758 1 3

Toelichting:

1. De eerste code wordt gebruikt om gegevens per gemeente te verkrijgen en gemeenten onderling te vergelijken.
2. De tweede code wordt gebruikt om de verschillende spreekuur-lokaties in een gemeente onderling te vergelijken.
3. De derde code is van belang om systematische invulfouten te traceren.

02. Inschrijfdatum

d	d	m	m	j	j
dag		maand		jaar	

Invullen: datum (dag, maand, jaar) waarop een **nieuw consult** plaatsvindt. Deze datum komt niet altijd overeen met de datum waarop de definitieve diagnose wordt gesteld. Telefonische contacten en vervolg-afspraken (ivm controle) worden niet als nieuw consult aange-merkt. Als een persoon in één jaar meerdere keren een soa oploopt en zich voor onderzoek meldt, dient wel steeds een nieuw formulier te worden ingevuld.

Voorbeeld: datum nieuw consult 7 februari 1995 = 07 02 95

Toelichting:

De datum is van belang om trendmatige ontwikkelingen te kunnen vaststellen.

03. Geslacht ☐ man ☐ vrouw

Aankruisen wat van toepassing is; altijd invullen.

Toelichting:

Informatie over het geslacht is voor epidemiologische analyses een basaal gegeven.

04. Geboortedatum

d	d	m	m	j	j
dag		maand		jaar	

Invullen: geboortedatum (dd, mm, jj) zoals cliënt die opgeeft.

Voorbeeld: geboren 2 november 1959 = 02 11 59

Indien de vraag om welke reden dan ook **niet gesteld** wordt, dan invullen: 88 88 88

Indien de cliënt de vraag niet **kan of wil** beantwoorden, dan invullen: 99 99 99

Toelichting:

De geboortedatum is van belang om het vóórkomen van soa in verschillende leeftijdscategorieën te kunnen bestuderen.

05. Geboorteland

--	--	--

Nationaliteit

--	--	--

2°

--	--	--

Invullen:

- driecijfer-code voor **land van geboorte** dat cliënt opgeeft; zie bijlage 2 voor landen-codelijst.

Voorbeeld: geboren op IJsland = code 024

- driecijfer-code voor **nationaliteit** die cliënt opgeeft; zie bijlage 3 voor nationaliteiten-codelijst. De eerste nul vervalt.

NB: Wanneer iemand een dubbele **nationaliteit** heeft, bijvoorbeeld de Turkse en Nederlandse nationaliteit, dan beide nationaliteiten invullen in betreffende ruimte.

Indien de vraag naar geboorteland en nationaliteit om welke reden dan ook **niet gesteld** wordt, dan invullen: 888

Indien de cliënt de vraag **niet kan of wil** beantwoorden, dan invullen: 999

Toelichting:

Informatie over geboorteland en nationaliteit (in combinatie) is van belang om over- of ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen te kunnen signaleren en kan aanwijzingen opleveren voor mogelijk verhoogd soa-risico als gevolg van factoren die samenhangen met cultureel bepaalde gedrag patronen.

06. Woongemeente

--	--	--

Invullen: een driecijfer-code voor de **gemeente** waar de cliënt woont. De code is opgenomen in de gemeente-codelijst van het CBS (bijlage 1). Het gaat hier om de woongemeente en **niet** om de woonplaats.

Hanteer de volgende coderingswijze:

1. Vaste woonplaats. Invullen CBS-code van de **gemeente** waarin vaste woonplaats is gelegen.
Voorbeeld: woon- of verblijfplaats Beek (bij Nijmegen), gemeente Ubbergen = code 282
2. Geen vaste woon- of verblijfplaats. *Invullen: code 000*
3. Vaste woonplaats in het buitenland. *Invullen: code 998*
4. Geen woon- of verblijfplaats of woongemeente opgegeven of onbekend. *Invullen: code 999*
5. Indien cliënt alleen woonprovincie opgeeft en woongemeente is onbekend. *Invullen: code 999*

Provincie

--	--

Invullen: een tweecijfer-code voor de woon**provincie** (volgens onderstaande lijst).

Groningen	01	N-Holland	08	buitenland	98
Friesland	02	Z-Holland	09	onbekend	99
Drente	03	Zeeland	10		
Overijssel	04	N-Brabant	11		
Gelderland	05	Limburg	12		
Utrecht	06				
Flevoland	07				

Toelichting:

Deze informatie geeft inzicht in de geografische spreiding en concentratie van soa, terwijl per instelling de herkomst van de cliëntèle kan worden vastgesteld (cliëntenstromen).

07. Bezoek in verband met: ☐ SOA-hulpvraag ☐ HIV-testverzoek ☐ Beide

Instructie:

Aankruisen welke vraag door de cliënt zelf centraal wordt gesteld: soa-hulpvraag, HIV-testverzoek of beide. Als cliënt zich daarover niet meteen uitspreekt, zal door middel van vraagverheldering duidelijk worden wat iemand tot een bezoek aan de instelling heeft gebracht. Het beantwoorden van vraag 7 kan dus ook tijdens of na het eerste gesprek plaatsvinden. Deze vraag dient **altijd** te worden ingevuld.

Toelichting:

Vraag 7 en vraag 8 (reden soa-hulpvraag en/of HIV-test verzoek) hangen nauw samen. Bij vraag 7 staat het onderscheid tussen soa-hulpvragen en HIV-testverzoeken centraal. Uit de soa-registraties van GGD-en blijkt namelijk dat een belangrijk deel van de consulten (in 1993 ongeveer 40%) in het teken staat van een HIV-testverzoek of leidt tot een HIV-test.

Aanvullende informatie hierover is niet voorhanden, maar wel gewenst met het oog op voorlichtings-inspanningen, specifieke voorzieningen en training van bijvoorbeeld artsen en sociaal-verpleegkundigen (pre- en posttest counseling).

08. Reden soa-hulpvraag en/of HIV-testverzoek

Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk), nadat vraag 7 is beantwoord. Indien bij vraag 7 'beide' is ingevuld, dan bij vraag 8 ook beide kolommen aankruisen. Het gaat om de meest op de voorgrond tredende redenen die door de cliënt zelf worden aangegeven. Indien de reden onbekend is, dit ook aangeven. Indien er een andere reden is dan de hier genoemde, dan deze afzonderlijk vermelden.

Indien een cliënt komt na gewaarschuwd te zijn, dient te worden aangegeven of waarschuwing door de partner, een sociaal-verpleegkundige of een derde heeft plaatsgevonden.

Toelichting:

Zie ook toelichting vraag 7. Met behulp van vraag 8 wordt meer inzicht verkregen in de reden van de soa-hulpvraag of het HIV-testverzoek.

Informatie hierover is van belang om de aard van de achterliggende problematiek en mogelijke consequenties daarvan voor voorlichtings- en preventie-activiteiten of specifieke interventies te kunnen vaststellen.

Het is niet bekend hoeveel cliënten een GGD of drempelvrije soa-polikliniek bezoeken omdat zij gewaarschuwd zijn door een partner, sociaal-verpleegkundige of derde. De betekenis van partnerwaarschuwing als vorm van secundaire preventie en onderdeel van de soa-bestrijding blijft daardoor onduidelijk. Met deze vraag wordt getracht meer zicht te krijgen op de rol van partnerwaarschuwing als reden voor een soa-hulpvraag en/of HIV-testverzoek.

09. Seksuele contacten

Aankruisen wat de cliënt tijdens het gesprek opgeeft. Niet altijd zal deze vraag expliciet worden gesteld, aangezien tijdens het gesprek vaak duidelijk wordt wat de aard van de seksuele contacten van de cliënt is. Bij onduidelijkheid of twijfel echter **altijd navragen**. In het bijzonder is dit van belang bij personen die met zowel mannen als vrouwen seksueel contact hebben, maar zich over hun 'bisexualiteit' niet spontaan uitlaten. Ook homoseksuele contacten zijn soms moeilijk bespreekbaar, maar vaak kan daarover in de anamnese wel informatie worden verkregen.

Toelichting:

Oorspronkelijk werd gevraagd naar 'sexuele gerichtheid', maar voor het doel van de registratie is het van minder belang welke sexuele gerichtheid een cliënt opgeeft. Informatiever is het antwoord op de vraag naar de aard van de seksuele contacten, dat - in combinatie met de antwoorden onder vraag 8 - aanwijzingen kan geven over risicogedrag.

10. Ooit eerder soa gehad

Aankruisen wat van toepassing is. De vraag dient uitdrukkelijk te luiden of de cliënt **ooit** eerder een soa heeft gehad.

Indien de cliënt ooit een soa heeft gehad dient de vraag 'welke soa?' te volgen. Ook daar aankruisen of invullen wat van toepassing is.

Toelichting:

De vraag luidt of iemand ooit eerder een soa heeft gehad. Het beperken tot een periode van drie, zes of twaalf maanden blijkt in praktijk problemen op te leveren en elke begrenzing blijft arbitrair. De vraag is van belang om een beeld te vormen van de omvang van het soa-recidivisme (in 1993 ongeveer 25% in de soa-registratie door GGD-en).

11. Prostitutie afgelopen drie maanden

Aankruisen wat van toepassing is. Hierbij dient een **periode van drie maanden** te worden aangehouden. Cliënt heeft geen relatie met prostitutie wil hier zeggen: in de afgelopen drie maanden niet als prostitué(e) gewerkt resp. geen seksueel contact met een prostitué(e) gehad. Van belang is rekening te houden met minder openlijke vormen van prostitutie, zoals thuiswerken en escortservice, en daar in het gesprek alert op te zijn.

Toelichting:

Informatie over de relatie met prostitutie is voor de soa-bestrijding (preventie en curatie) van belang. Naast prostituanten worden partners van prostitué(e)s onderscheiden.

12. Druggebruik afgelopen zes maanden

Aankruisen wat van toepassing is. Deze vraag dient in beginsel bij **alle cliënten** te worden gesteld. Indien cliënt aangeeft in de voorafgaande zes maanden drugs te hebben gebruikt, dan vragen naar de aard van het druggebruik, in het bijzonder of intraveneus drugs zijn gebruikt. Het gaat hier om het gebruik van soft drugs en hard drugs en niet om het gebruik van bijvoorbeeld alcohol, dat in een ruime definitie ook als 'drug' kan worden gezien.

Toelichting:

Ten behoeve van voorlichtings- en preventie-activiteiten is inzicht in de relatie tussen het voorkomen van soa en druggebruik van belang. Intraveneus (IV) druggebruik met gebruikmaking van besmette spuiten en naalden is namelijk een belangrijke risicofactor voor besmetting met HIV en Hepatitis B.

13. Vastgestelde diagnose

Een kopie van deel A van het registratieformulier dient alleen te worden ingestuurd indien er een **definitieve diagnose** is vastgesteld. Dat wil zeggen: **na bevestiging door laboratorium-onderzoek op aanwezigheid van soa**. Deze vraag dan ook pas ná het bekend worden van de uitslag van het laboratoriumonderzoek invullen. De betreffende diagnose of diagnoses (er kunnen meerdere soa worden geconstateerd) aankruisen. Als de diagnose nog niet bekend is, geen kopie opsturen.

Bij gonorrroe, lues en herpes genitalis wordt nadere informatie gevraagd over respectievelijk resistente gonorrroe (penicillinase vormende gonokokkenstammen PVG), het stadium van lues en het type HSV. Hier zowel de soa als de specifieke informatie aankruisen.

Voorbeeld: ☐ Lues met stadia
☐ Lues II

Indien een **HIV-antistoffentest** is uitgevoerd, altijd de uitslag (positief of negatief) aankruisen.

Indien uit laboratorium onderzoek op soa blijkt dat er geen sprake is van een soa dient de antwoordmogelijkheid '**geen soa vastgesteld**' te worden aangekruist. Dus soms zowel 'HIV-seronegatief' als 'geen soa vastgesteld' invullen.

Toelichting:

Voorheen werd gewerkt met een code-lijst voor soa. Het gebruik van codes leidde tot registratiefouten. Daarom is nu gekozen voor een opsomming van alle soa, inclusief HIV-infectie (HIV-seropositief en HIV-seronegatief).

De mogelijkheid voor een extra vraag per dienst is vervallen.

14. Lokatie in het geval van gonorroe en CT-infectie

Instructie:

Aankruisen hetgeen van toepassing is; meerdere antwoorden mogelijk.

Toelichting:

Om diverse redenen, onder andere in verband met het vaststellen van risicogedrag en ten behoeve van voorlichtings- en preventie-activiteiten, is het wenselijk te beschikken over informatie over de plaats waar een gonorroe- en/of CT-infectie is geconstateerd (vgl. anale of orale gonorroe).