

**Tabel 2.** Voorkomen en odds ratios (95% CI) van lokale en systemische verschijnselen binnen 1 week na de booster DaKTP-vaccinatie op 4-jarige leeftijd

	<b>wK groep <sup>a</sup></b> <b>(n = 815)</b> % (95% CI)	<b>aK groep <sup>a</sup></b> <b>(n = 824)</b> % (95% CI)	OR (95% CI) <sup>b,c</sup>
≥ 1 lokale reactie	36.1 (32.9-39.5)	58.5 (55.2-61.9)	2.7 (2.2-3.3)
≥ 1 systemische verschijnselen	11.0 (9.1-13.4)	20.6 (18.0-23.6)	2.2 (1.6-3.0)
Geen verschijnselen	59.5 (56.2-63.0)	35.9 (32.8-39.3)	Ref
Alleen lokale reacties	29.4 (26.4-32.7)	43.4 (40.2-46.9)	2.4 (2.0-3.0)
Alleen systemische verschijnselen	4.4 (3.2-6.1)	5.6 (4.2-7.4)	2.1 (1.3-3.3)
Zowel lokale als systemische reacties	6.6 (5.1-8.6)	15.0 (12.8-17.7)	3.8 (2.6-5.3)

<sup>a</sup> wK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DwKTP-Hib;

aK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DaKTP-Hib

<sup>b</sup> wK-groep = referentie groep

<sup>c</sup> In de analyses zijn er geen confounders of effectmodificatoren geïdentificeerd