Tabel 7. *Kosten diagnose, behandeling en begeleiding patiënt met normaal gevoelige (en niet-multiresistente) tuberculose en patiënt met multiresistent tuberculose, 2009 (euro's).*

	Normaal gevoelige (niet-multiresistente) tuberculose		**Multiresistente tuberculose**	
	Totaal (n=1.138) (€)	per patiënt (€)	Totaal (n=20)* (€)	per patiënt (€)
Medicatie	528.644	465	347.399	17.370
Ziekenhuisopnames (incl. klinische diagnose) (n=437)	6.654.554	5.848	740.520	37.026
Poliklinische diagnose medisch specialisten (n=436)	235.004		6.540	
Follow-up medische (n=873)	467.444		10.960	
Poliklinische diagnose GGD (n=285)	123.750		9.000	
Follow-up GGD (n=285)	121.000		8.800	
Totaal ambulante diagnostiek en behandeling	947.198	832	35.300	1.765
*Sociaal-verpleegkundige begeleiding **	432.440		15.200	
*Directly observed therapy (DOT)****	374.781		32.933	
Totaal sociaal-verpleegkundige begeleiding	807.221	709	48.133	2.407
Totaal	**8.937.617**	**7.854**	**1.171.353**	**58.568**

* Aanname is dat de helft van de MDR-tuberculose door klinisch specialisten wordt vastgesteld en de helft door tbc-artsen van GGD'en.
** Uurtarief sociaal verpleegkundige is € 76 gebaseerd op salarisschaal in Tabel 5, inclusief alle opslag, en op 1.350 productieve uren. Aanname is dat begeleiding bestaat uit 2 uur intake en 6 x 0,5 uur begeleiding tijdens behandeling (voor MDR gemiddeld 12 x 0,5 uur).
*** Uurtarief sociaal verpleegkundige als boven. Aanname is dat 20% van de patiënten 5 dagen per week medicatie onder directly observed therapy krijgen gedurende 6 maanden en 50% van de MDR patiënten gedurende 12 maanden. Dit laatste gebaseerd op gegevens 2009 uit de studie naar behandelresultaten MDR-tuberculose. (4) De geschatte tijdsbesteding voor DOT is 10 minuten per keer.