

	2009	2010	2011	2012
Aantal bevestigde patiënten, NRL (man/vrouw)	24 (20/4)	31 (27/4)	31 (26/5)	44 (34/10)
PCR-positief	13	6	7	17
Meest voorkomende serogroepen (aantal)	Icterohaemorrhagiae (7), Mini (4), Grippotyphosa (2), Sejroe (2)	Icterohaemorrhagiae (8), Grippotyphosa (4), Pomona (2), Ballum (2), Australis (2)	Icterohaemorrhagiae (10), Grippotyphosa (5), Australis (3), Mini (3)	Grippotyphosa (7), Mini (6), Icterohaemorrhagiae (4), Javanica (3)
Infectie opgelopen in Nederland (% van bevestigde patiënten)	10 (42%)	16 (52%)	9 (29%)	17 (39%)
Beroepsmatige infecties in Nederland (% van de in NL opgelopen infecties)	5 (50%)	7 (44%)	6 (67%)	5 (29%)
Infecties in Zuidoost Azië/ Thailand (% opgelopen in Thailand)	8 (67%)	10 (90%)	15 (40%)	14 (tenminste 43%)

Bron: Gebaseerd op Maassen et al., 2011 gecombineerd met cijfers vanuit de jaarverslagen van het NRL, 2009-20122.