

Tabel 2 Medische achtergrond op basis van de Osirimelding van patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie, 2009-2012

Medische achtergrond*	2012 n (%)	2011 n (%)	2010 n (%)	2009 n (%)
Medicijngebruik				
Immunosuppressiva	37 / 60 (62)	40 / 78 (51)	25 / 58 (43)	19 / 41 (46)
Maagzuurremmers	28 / 49 (57)	27 / 68 (40)	15 / 49 (31)	8 / 41 (20)
Kanker	24 / 64 (38)	21 / 83 (25)	17 / 55 (31)	13 / 48 (27)
Diabetes mellitus	7 / 64 (11)	8 / 83 (10)	10 / 55 (18)	10 / 48 (21)
Transplantatie	1 / 64 (2)	2 / 83 (2)	0	3 / 48 (6)
Chronische nierziekten	4 / 64 (6)	7 / 83 (8)	8 / 55 (15)	5 / 48 (10)
Chronische leverziekten	2 / 64 (3)	4 / 83 (5)	3 / 55 (5)	4 / 48 (8)
Immuunstoornissen	8 / 64 (13)	7 / 83 (8)	5 / 55 (9)	7 / 48 (15)
Zwangerschap (of geboorte)	6 / 77 (8)	9 / 87 (10)	4 / 76 (5)	3 / 79 (4)
waarvan sterfte baby/miskraam	0	3	1	1
Alcoholisme	1 / 64 (2)	1 / 83 (1)	3 / 55 (5)	2 / 48 (4)
Hart- en vaatziekten	13 / 64 (20)	20 / 83 (24)	11 / 55 (27)	11 / 48 (23)
Longziekten	6 / 64 (9)	13 / 83 (16)	9 / 55 (16)	10 / 48 (21)
Ziekten van maag-darmkanaal	4 / 64 (6)	9 / 83 (11)	9 / 55 (16)	2 / 48 (4)
Reuma	7 / 64 (11)	9 / 83 (11)	4 / 55 (7)	1 / 48 (2)
Overige ziekten	8 / 64 (13)	3 / 83 (4)	5 / 55 (9)	11 / 48 (23)
Aantal gezonde patiënten zonder medicijnen	2 / 67 (3)	4 / 83 (5)	2 / 57 (4)	3 / 52 (6)

* Patiënten kunnen meerdere aandoeningen hebben, het totaal aantal aandoeningen ligt daardoor hoger dan het aantal patiënten