

Tabel 2. Osirisgegevens over activiteiten en voedselconsumptie* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie, 2010-2013.

Risicofactoren	2013 n / N (%)	2012 n / N (%)	2011 n / N (%)	2010 n / N (%)
Activiteiten				
Reis buitenland	2 / 68 (3)	2 / 79 (3)	9 / 61 (15)	3 / 52 (6)
Voedselconsumptie				
Worst/worstjes	20 / 48 (42)	20 / 52 (39)	23 / 62 (37)	28 / 48 (58)
Paté	13 / 48 (27)	5 / 52 (10)	10 / 62 (16)	11 / 48 (23)
Gekookte/gerookte ham	20 / 48 (42)	15 / 52 (29)	32 / 62 (52)	23 / 48 (48)
Kip/kalkoen vleeswaren	18 / 48 (38)	18 / 52 (35)	22 / 62 (36)	23 / 48 (48)
Hamburger	12 / 48 (25)	6 / 52 (12)	12 / 62 (19)	2 / 48 (4)
Gerookte zalm	16 / 51 (31)	14 / 53 (26)	18 / 63 (29)	12 / 48 (25)
Gerookte makreel	12 / 51 (24)	10 / 53 (19)	13 / 63 (21)	16 / 48 (33)
Haring	16 / 51 (31)	18 / 53 (34)	16 / 63 (25)	21 / 48 (44)
Kibbeling/lekkerbek	14 / 51 (28)	13 / 53 (25)	12 / 63 (19)	6 / 48 (13)
Garnalen	13 / 51 (26)	9 / 53 (17)	15 / 63 (24)	10 / 48 (21)
Totaal zachte kazen	28 / 54 (52)	17 / 54 (32)	30 / 62 (48)	20 / 48 (42)

* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door ten minste 20% van de patiënten in 2013 genoemd