

**Tabel 3.** Osirisgegevens over activiteiten en voedselconsumptie\* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie, 2009-2012

Risicofactoren	2012 n / N (%)	2011 n / N (%)	2010 n / N (%)	2009 n / N (%)
Activiteiten				
Reis buitenland	1 / 67 (2)	2 / 79 (3)	9 / 61 (15)	3 / 52 (6)
Voedselconsumptie				
Worst/worstjes	20 / 52 (39)	23 / 62 (37)	28 / 48 (58)	17 / 41 (41)
Filet americain	13 / 52 (25)	11 / 62 (18)	13 / 48 (27)	8 / 41 (20)
Rosbief	12 / 52 (23)	8 / 62 (13)	12 / 48 (25)	10 / 41 (24)
Gekookte/gerookte ham	15 / 52 (29)	32 / 62 (52)	23 / 48 (48)	22 / 41 (54)
Kip/kalkoen vleeswaren	18 / 52 (35)	22 / 62 (36)	23 / 48 (48)	16 / 41 (39)
Gerookte zalm	14 / 53 (26)	18 / 63 (29)	12 / 48 (25)	9 / 41 (22)
Haring	18 / 53 (34)	16 / 63 (25)	21 / 48 (44)	12 / 41 (29)
Kibbeling/lekkerbek	13 / 53 (25)	12 / 63 (19)	6 / 48 (13)	8 / 41 (20)
Totaal zachte kazen	17 / 54 (32)	30 / 62 (48)	20 / 48 (42)	16 / 41 (39)

\* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door tenminste 20% van de patiënten in 2012 genoemd;