Tabel 2. Vergelijking van risicofactoren tussen patiënten met listeriose en controlepersonen van 19 jaar en ouder, 2009

Risicofactoren	% patiënten (n=41)	% controles (n=325)	OR (95% BI)*	
Leeftijd				
19-34 jaar	5	8	ref	
35-49 jaar	2	24	ref	
50-64 jaar	24	34	3.2	(0.8-11.8)
64-79 jaar	39	24	7.2	(2.0-25.5)
80+ jaar	29	10	13.6	(3.6-51.1)
Geslacht = man	49	43	0.8	(0.4-1.5)
Activiteiten				
Reis buitenland	2	13	0.2	(0.02-1.4)
Voedselconsumptie				
Tartaar	15	34	0.4	(0.2-0.9)
Hamburger	2	37	0.1	(0.01-0.5)
Shoarma	7	25	0.3	(0.1-1.2)
Filet americain	20	46	0.4	(0.2-0.9)
Rosbief	24	29	1.0	(0.4-2.1)
Corned beef	22	14	1.5	(0.7-3.5)
Paté	22	32	0.8	(0.4-1.8)
Rauwe ham	27	39	0.6	(0.3-1.3)
Gekookte/gerookte ham	54	67	0.6	(0.3-1.2)
Kip/kalkoen vleeswaren	39	54	0.7	(0.3-1.3)
Gerookte zalm	22	50	0.3	(0.2-0.7)
Gerookte makreel	12	25	0.4	(0.1-0.9)
Garnalen	22	33	0.7	(0.3-1.5)
Haring	29	43	0.4	(0.2-0.8)
Lekkerbek/kibbeling	20	43	0.3	(0.1-0.7)
Totaal zachte kazen	39	66	0.4	(0.2-0.7)
Medicijngebruik				
Immunosuppressiva	44	2	87.0	(22.7-333.9)
Maagzuurremmers	25	10	2.6	(1.0-6.9)
Aandoeningen				
Kanker	32	1	28.7	(8.4-98.0)
Diabetes mellitus	21	10	1.6	(0.7-4.0)
Leverziekten	11	0		
Nierziekten	13	1	21.8	(3.6-133.3)
Immuunstoornissen	16	1	30.8	(6.0-158.1)
Hart- en vaatziekten	21	11	1.3	(0.5-3.3)
Transplantatie	8	0		
Longziekten	18	5	3.4	(1.2-9.6)
Reuma	3	4	0.6	(0.1-4.5)
Ziekten van maagdarmkanaal	5	4	1.0	(0.2-4.7)

* Odds ratio met 95% betrouwbaarheidsinterval, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht