

Tabel 3. Osiris- (2009) en vragenlijstgegevens (2005-2008) over activiteiten en voedselconsumptie* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie.

Risicofactoren	2009 (n=55)		2008 (n=38)		2007 (n=45)		2006 (n=50)		2005 (n=69)	
	N (%)		N (%)		N (%)		N (%)		N (%)	
Activiteiten										
Reis buitenland	3 / 52	(6)	4 / 36	(11)	8 / 42	(19)	3 / 48	(6)	6 / 67	(9)
Voedselconsumptie										
Worst/worstjes	17 / 41	(41)	25 / 28	(89)	24 / 34	(71)	28 / 45	(62)	40 / 65	(62)
Rosbief	10 / 41	(24)	12 / 27	(44)	9 / 36	(25)	14 / 45	(31)	15 / 63	(24)
Corned beef	9 / 41	(22)	7 / 26	(27)	9 / 36	(25)	6 / 45	(13)	8 / 62	(13)
Paté	9 / 41	(22)	9 / 26	(35)	10 / 35	(29)	18 / 44	(41)	19 / 64	(30)
Rauwe ham	11 / 41	(27)	11 / 26	(42)	14 / 36	(39)	18 / 45	(40)	25 / 62	(40)
Gekookte/gerookte ham	22 / 41	(54)	22 / 28	(79)	21 / 34	(62)	29 / 44	(66)	48 / 63	(76)
Kip/kalkoen vleeswaren	16 / 41	(39)	17 / 29	(59)	19 / 35	(54)	21 / 45	(47)	39 / 64	(61)
Gerookte zalm	9 / 41	(22)	10 / 27	(37)	9 / 34	(26)	22 / 47	(47)	32 / 65	(49)
Garnalen	9 / 41	(22)	7 / 26	(27)	7 / 34	(21)	15 / 44	(34)	22 / 63	(35)
Haring	12 / 41	(29)	18 / 30	(60)	17 / 35	(50)	22 / 46	(48)	-	#
Totaal zachte kazen	16 / 41	(39)	9 / 28	(32)	19 / 36	(53)	20 / 45	(44)	31 / 63	(49)

* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door tenminste 20% van de patiënten in 2009 genoemd. # Consumptie van haring werd in 2005 nog niet nagevraagd.