



Protocol urineweginfecties

Interzorg Noord Nederland

Doel: tijdig signaleren en behandelen van UWI

2 ledig

Deel voor verzorging

Deel voor arts

Stap 1 Preventie

- Hygiëne aspecten
- Intake
- Verzorgende aspecten

Stap 2 signaleren

- Klachten/symptomen

Stap 3 Rapportage en Overleg

- Rapportage symptomen/klachten plus overleg specialist ouderengeneeskunde
- Uitvoeren van evt opdrachten van specialist ouderengeneeskunde


Stap 4 Beleid en Uitvoering

- Uitvoering van beleid
- Observatie en rapportage

Deel : Arts

Stroomdiagram

Stroomdiagram UWI



Directe gevoeligheidsbepaling

- Al meer dan 10 jaar in gebruik

Doel:

- bewaken en voorkomen van resistentievorming.
- relatief goedkope en snelle manier om het juiste antibioticum aan cliënt voor te schrijven

Directe gevoeligheidsbepaling

- Inzetten en aflezen gestandaardiseerd
- Uitgevoerd door DA
- Agar plaat, dun laagje urine mbv wattenstokje uitstrijken.
- mbv dispenser worden diverse anti microbiële middelen op plaat gelegd
- Incubator (37 graden), 24 uur
- Aflezen remmingszones (S, I, R)

Directe gevoeligheidsbepaling

- Amoxicilline
- Amoxicilline/Clavulaanzuur
- Ciproxin
- Furadantoïne
- Trimethoprim

Nadelen directe gevoeligheids bepaling

- Geen inzicht in het aantal kolonievormende bacteriën
- Geen identificatie
- Max 2 stammen uit te lezen

Urinekweek

- Ter identificatie van bacterie bij recidiverende UWI
- Bij resistentie van directe gevoeligheids bepaling

