

Tabel 1 Medische achtergrond op basis van de Osiris-melding (2009, 2010, 2011) of vragenlijstgegevens (2005-2008) van patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie.

Medische achtergrond*	2011 n (%)	2010 n (%)	2009 n (%)	2005-2008 n (%)
Medicijngebruik				
Immunosuppressiva	40 / 78 (51)	25 / 58 (43)	19 / 41 (46)	80 / 189 (42)
Maagzuurremmers	27 / 68 (40)	15 / 49 (31)	8 / 41 (20)	34 / 162 (21)
Kanker	21 / 83 (25)	17 / 55 (31)	13 / 48 (27)	66 / 202 (33)
Diabetes mellitus	8 / 83 (10)	10 / 55 (18)	10 / 48 (21)	39 / 202 (19)
Transplantatie	2 / 83 (2)	0	3 / 48 (6)	16 / 202 (8)
Chronische nierziekten	7 / 83 (8)	8 / 55 (15)	5 / 48 (10)	22 / 202 (11)
Chronische leverziekten	4 / 83 (5)	3 / 55 (5)	4 / 48 (8)	15 / 202 (7)
Immuunstoornissen	7 / 83 (8)	5 / 55 (9)	7 / 48 (15)	27 / 202 (13)
Zwangerschap (of geboorte) waarvan sterfte baby/miskraam	9 / 87 (10) 3	4 / 76 (5) 1	3 / 79 (4) 1	18 / 267 (7) 7
Alcoholisme	1 / 83 (1)	3 / 55 (5)	2 / 48 (4)	7 / 202 (3)
Hart- en vaatziekten	20 / 83 (24)	11 / 55 (27)	11 / 48 (23)	69 / 202 (34)
Longziekten	13 / 83 (16)	9 / 55 (16)	10 / 48 (21)	31 / 202 (15)
Ziekten van maagdarmkanaal	9 / 83 (11)	9 / 55 (16)	2 / 48 (4)	28 / 202 (14)
Reuma	9 / 83 (11)	4 / 55 (7)	1 / 48 (2)	16 / 202 (8)
Overige ziekten	3 / 83 (4)	5 / 55 (9)	11 / 48 (23)	42 / 202 (21)
Aantal gezonde patiënten zonder medicijnen	4 / 83 (5)	2 / 57 (4)	3 / 52 (6)	19 / 208 (9)

* Patiënten kunnen meerdere aandoeningen hebben, het totaal aantal aandoeningen ligt daardoor hoger dan het aantal patiënten