

Tabel 1 Resultaten contactonderzoek GG&GD Utrecht

| persoon | Leeftijd | 1 ^{ste} ziektedag | Klachten | Diagnostiek in acute fase | Diagnostiek in later stadium | opmerkingen |
|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 (indexpatiënte) | 51-60 | 10 juni | Koorts, spierpijn, rillingen | UAG+, X-thorax + | | 5 dagen opname ziekenhuis met ciprofloxacin |
| 2 | 51-60 | 9 juni | Koorts, rillerig, spierpijn, vermoeid | | Serologie+ | Vanaf 12-6 ciprofloxacin via huisarts, op advies arts-microbioloog |
| 3 | 71-80 | 10 juni | Braken, algemene malaise | | | Vanaf 12-6 ciprofloxacin via huisarts, op advies arts-microbioloog |
| 4 | 51-60 | 9 juni | Koorts, algemene malaise | UAG - | | Geen behandeling |
| 5 | 51-60 | 10 juni | Koorts, vermoeid | UAG - | | Geen behandeling |
| 6 | 11-20 | 10 juni | Koorts, vermoeid | UAG - | | Geen behandeling |
| 7 | 21-30 | 14 juni | Koorts, hoofdpijn | 17-6: UAG +, klinische pneumonie | | ciprofloxacin na diagnose |
| 8 | 51-60 | 10 juni | Futloos, spierpijn | | Serologie+ | Vanaf 12-6 ciprofloxacin via huisarts, op advies arts-microbioloog |
| 9 | 21-30 | 10 juni | Futloos, spierpijn | | Serologie+ | Vanaf 12-6 ciprofloxacin via huisarts, op advies arts-microbioloog |

UAG=urineantigeentest op *L. pneumophila*