

Tabel 2 Osiris- (2009, 2010, 2011) of vragenlijstgegevens (2005-2008) over activiteiten en voedselconsumptie* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie.

| Risicofactoren | | 2011 n / N (%) | 2010 n / N (%) | 2009 n / N (%) | 2005-2008 n / N (%) |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Activiteiten | | | | | |
| | Reis buitenland | 2 / 79 (3) | 9 / 61 (15) | 3 / 52 (6) | 21 / 193 (11) |
| Voedselconsumptie | | | | | |
| | Worst/worstjes | 23 / 62 (37) | 28 / 48 (58) | 17 / 41 (41) | 119 / 172 (69) |
| | Rauwe ham | 16 / 62 (26) | 18 / 48 (38) | 11 / 41 (27) | 70 / 169 (41) |
| | Gekookte/gerookte ham | 32 / 62 (52) | 23 / 48 (48) | 22 / 41 (54) | 121 / 169 (72) |
| | Kip/kalkoen vleeswaren | 22 / 62 (36) | 23 / 48 (48) | 16 / 41 (39) | 97 / 173 (56) |
| | Gerookte zalm | 18 / 63 (29) | 12 / 48 (25) | 9 / 41 (22) | 72 / 173 (42) |
| | Gerookte makreel | 13 / 63 (21) | 16 / 48 (33) | 5 / 41 (12) | 47 / 167 (28) |
| | Garnalen | 15 / 63 (24) | 10 / 48 (21) | 9 / 41 (22) | 51 / 167 (31) |
| | Haring | 16 / 63 (25) | 21 / 48 (44) | 12 / 41 (29) | 57 / 111 (51) # |
| | Totaal zachte kazen | 30 / 62 (48) | 20 / 48 (42) | 16 / 41 (39) | 79 / 182 (43) |

* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door tenminste 20% van de patiënten in 2011 genoemd; # Consumptie van haring werd in 2005 nog niet nagevraagd