



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2018:**  
**Topklinische ziekenhuizen**  
**Thema Urethrakathetergebruik**  
PREZIES – versie: februari 2019  
Documentversie: 1.0

# Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik 2018.

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Topklinisch
	N
Aantal patiënten	4541

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Topklinisch	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	875	19,3
Nee	3666	80,7

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Topklinisch	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	%
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	590	90,5
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	23	3,5
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	39	6,0

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Topklinisch	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	590	90,5
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	120	18,4
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	222	34,0
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	151	23,2
1.4 Neurogene (overloop) blaas	4	0,6
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	5	0,8
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	8	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	24	3,7
1.8 Andere terechte indicatie	56	8,6
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	23	3,5
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	4	0,6
2.2 Decubituspreventie	2	0,3
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	7	1,1
2.5 Andere onterechte indicatie	10	1,5
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	39	6,0
3 Indicatie onbekend	39	6,0

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail

Op dag van inbreng	O	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	596	91,4
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	125	19,2
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	215	33,0
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	177	27,1
1.4 Neurogene (overloop) blaas	6	0,9
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	4	0,6
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	8	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	19	2,9
1.8 Andere terechte indicatie	42	6,4
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	17	2,6
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	4	0,6
2.2 Decubituspreventie	1	0,2
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	4	0,6
2.5 Andere onterechte indicatie	8	1,2
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	39	6,0
3 Indicatie onbekend	39	6,0

	0	
Op dag van inbreng	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Topklinisch				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	4315	729	16,9	22	3,0
Intensieve zorg	226	146	64,6	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Topklinisch				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	7	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	36	4	11,1	0	0
Cardiologie	567	84	14,8	4	4,8
Dermatologie	2	0	0	0	0
Geriatricie	148	42	28,4	0	0
Heelkunde	616	137	22,2	4	2,9
Hematologie	30	6	20,0	0	0
Interne Geneeskunde	675	131	19,4	3	2,3
Keel-neus-oor	39	4	10,3	0	0
Kindergeneeskunde	189	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	584	99	17,0	1	1,0
MDL*	178	17	9,6	0	0
Neonatalogie	73	1	1,4	0	0
Neurochirurgie	144	41	28,5	1	2,4
Neurologie	350	60	17,1	6	10,0
Obstetrie en gynaecologie	287	50	17,4	0	0
Onbekend	114	46	40,4	1	2,2
Oncologie	26	4	15,4	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0
Orthopedie	250	58	23,2	1	1,7
Plastische chirurgie	22	0	0	0	0
Reumatologie	8	1	12,5	0	0
Traumatologie	56	16	28,6	1	6,3
Urologie	140	74	52,9	0	0

Op registratiedag	Topklinisch				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag

Op registratiedag	Topklinisch						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	729	493	67,6	21	2,9	36	4,9
Intensieve zorg	146	97	66,4	2	1,4	3	2,1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Topklinisch						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	0	0	0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	4	3	75,0	0	0	0	0
Cardiologie	84	63	75,0	2	2,4	2	2,4
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatric	42	27	64,3	0	0	2	4,8
Heelkunde	137	95	69,3	5	3,6	8	5,8
Hematologie	6	3	50,0	2	33,3	0	0
Interne Geneeskunde	131	91	69,5	4	3,1	11	8,4
Keel-neus-oor	4	2	50,0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	99	67	67,7	3	3,0	5	5,1
MDL*	17	7	41,2	0	0	2	11,8
Neonatalogie	1	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	41	38	92,7	1	2,4	0	0
Neurologie	60	37	61,7	3	5,0	4	6,7
Obstetrie en gynaecologie	50	41	82,0	0	0	0	0
Onbekend	46	14	30,4	0	0	1	2,2
Oncologie	4	1	25,0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	58	34	58,6	2	3,4	1	1,7
Plastische chirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologie	1	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	16	13	81,3	0	0	2	12,5
Urologie	74	54	73,0	1	1,4	1	1,4

	Topklinisch						
Op registratiedag	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever