

Demografie

Uniek ID

Locatie

Consultnummer

Geboortjaar

O onbekend

Datum consult (dd mm jj)

Postcode cliënt (4-cijfers)

Geen vast verblijfadres

Wonend in buitenland

Onbekend

Geslacht

Indien transgender:

Man

Voelt zich man, met vrouwelijke geslachtsdelen

Vrouw

Voelt zich man, met mannelijke geslachtsdelen

Transgender

Voelt zich vrouw, met mannelijke geslachtsdelen

Voelt zich vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen

Opleidingsniveau (laatst genoten of huidig)

Laag

Middelbaar

Hoog

Anders, nl...

Onbekend

Werelddeel van geboorte index moeder vader

Nederland	0	0	0
Marokko	0	0	0
Turkije	0	0	0
Indonesië	0	0	0
Suriname	0	0	0
Nederlandse Antillen	0	0	0
Noord/West/Midden Europa	0	0	0
Zuid Europa	0	0	0
Oost-Europa/MOE-landen	0	0	0
Zuid Afrika	0	0	0
West Afrika	0	0	0
Oost Afrika	0	0	0
Noord Afrika	0	0	0
Midden Afrika	0	0	0
Noord Amerika	0	0	0
Midden Amerika	0	0	0
Zuid Amerika	0	0	0
Oceanië	0	0	0
West Azië (Midden-Oosten)	0	0	0
Azië	0	0	0
Onbekend	0	0	0

Hulpvraag

Hulpvraag

- seksualiteit
- seksueel geweld
- anticonceptie
- onbedoelde zwangerschap
- soa-consult
- soa (geen test)
- anders, nl

Hulpvraag seksualiteit:

- vragen/problemen over lichaam
- seksuele dysfuncties
- seksuele oriëntatie
- genderidentiteit
- seksueel gedrag/techniek
- anders

Soa-consult

- Regulier soa consult GGD
- Via Man tot Man
- GGD thuishet pakket
- PrEP: start consult
- PrEP: follow-up consult

Indicatiestelling

Seksuele voorkeur: heteroseksueel homoseksueel biseksueel onbekend

Gewaarschuwd door partner: ja nee onbekend

Indien gewaarschuwd:

Voor welke soa?

- Chlamydia
- Gonorrhoe
- Hiv
- Hepatitis C
- Ander
- LGV
- Syfilis
- Hepatitis B
- Trichomonas
- Onbekend/weet niet

Gewaarschuwd door een recente (seks)partner?

Nee, laatste sekscontact met deze partner meer dan 2 maanden geleden

Ja, laatste sekscontact met deze partner ≤ 2 maanden geleden (huidig of ex)

Waarschuwer/waarschuwster anoniem/onbekend

Hoe is de cliënt gewaarschuwd?

Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, messenger, e-mail

Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook

Via PW.nl met een code

Via een zorgverlener van CSG

Prostitué(e): ja nee onbekend

Partner uit doelgroep: ja nee onbekend

▪ **Indien ja: welke doelgroep?**

- partner geboren in soa endemisch gebied
- geboorteland partner/ouders onbekend
- ouder(s) van partner geboren in soa endemisch gebied
- indien geslacht van cliënt is vrouw: partner is MSM

Soa-klachten: ja nee onbekend

- **Indien klachten: heeft of had de cliënt klachten die kunnen wijzen op syfilis of hiv?** ja nee onbekend

Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief) ja nee onbekend

Andere indicatie (Facultatief)

Historie soa/hiv en seksueel risicogedrag

Heeft de cliënt het afgelopen jaar een soa-test gedaan?

ja nee onbekend

- **Indien getest: gonorrhoe, chlamydia en/of syfilis gehad?** ja nee weet niet onbekend

Eerdere hiv-test?

nee

ja, positief jaar test..... maand test.....

ja, negatief jaar test..... maand test.....

ja, uitslag onbekend

onbekend

Met hoeveel personen heeft u seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden? Onbekend

Seks en condoomgebruik in de afgelopen 6 maanden:

- **Receptieve anale seks:** nee ja, altijd met condoom Ja, niet altijd met condoom onbekend
- **Insertieve anale seks:** nee ja, altijd met condoom Ja, niet altijd met condoom onbekend
- **Vaginale seks:** nee ja, altijd met condoom Ja, niet altijd met condoom onbekend
- **Een man gepijpt:** nee ja, altijd met condoom Ja, niet altijd met condoom onbekend

Prostituant(e) ja nee onbekend

Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen gebruikt in de afgelopen 6 maanden?

(Facultatief vrouwen en heteromannen, verplicht voor MSM)

ja nee onbekend

▪ **Indien ja:**

Welke drugs? (Facultatief vrouwen en heteromannen, verplicht voor MSM)

Uppers

- Cocaine
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau Miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol: aangeschoten/dronken
- Wiet /hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl...

Heb je drugs geslamt/geinjecteerd (Facultatief) Ja Nee

Extra (gedrags)vragen MSM

Heeft u in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:

- **Meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?** ja nee onbekend
- **Hiv-positieve mannen?** (Facultatief) ja nee weet ik niet

Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt:

▪ **Hoe heeft u PrEP gebruikt?**

(Beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rndom seks

▪ **Wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)**

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPREP, INPREP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Rectale soa of syfilis diagnose
- Onveilige anale seks met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- PEP-kuur
- Anders, nl...

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
(mijn nierfunctie ging achteruit)
- Interacties
(PrEP kan niet samen met andere medicijnen)
- Niet therapietrouw
(het lukte niet volgens schema te gebruiken)
- Hiv-diagnose

Clïent wilde zelf stoppen:

- Minder risicogedrag
(ik loop minder/geen risico op hiv)
- Ervaren bijwerkingen
(bijwerkingen waren niet te verdragen)
- Niet therapietrouw
(het lukte niet de tabletten volgens schema te gebruiken)
- Logistieke redenen
(bijv. geen tijd voor controles, financieel)

Anders:

- Anders, nl...
- Onbekend

Voor PrEP follow-up consulten: gaat u de komende 3 maanden door met PrEP?

- Ja **Aantal voorgeschreven pillen:**
- Geen
 - 30
 - 60
 - 90
 - Anders, nl...

Ja, maar niet meer via CSG

Nee, ik stop vanwege (meerdere redenen mogelijk):

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
(mijn nierfunctie ging achteruit)
- Interacties
(PrEP kan niet samen met andere medicijnen)
- Niet therapietrouw
(het lukte niet volgens schema te gebruiken)
- Hiv-diagnose

Clïent wilde zelf stoppen:

- Minder risicogedrag
(ik loop minder/geen risico op hiv)
- Ervaren bijwerkingen
(bijwerkingen waren niet te verdragen)
- Niet therapietrouw
(het lukte niet de tabletten volgens schema te gebruiken)
- Logistieke redenen
(bijv. geen tijd voor controles, financieel)

Anders:

- Anders, nl...
- Onbekend

Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gonorrhoe Onderzoek | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | <input type="checkbox"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal /cervicaal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | <input type="checkbox"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | <input type="checkbox"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | <input type="checkbox"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | <input type="checkbox"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="checkbox"/> pos | <input type="checkbox"/> neg | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- ja, GRAS
 nee
 nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
 Cervicaal
 Anaal
 Oraal

Uitslagen GRAS urethraal:

- Cefotaxim MIC:.....
 Ceftriaxon MIC:.....
 Azithromycine MIC:.....
 Ciprofloxacin MIC:.....

Facultatief:

- Beta lactamase* pos
 Beta lactamase neg
 Spectinomycine MIC:.....
 Penicilline MIC:.....
 Tetracycline MIC:.....

Uitslagen GRAS cervicaal:

- Cefotaxim MIC:.....
 Ceftriaxon MIC:.....
 Azithromycine MIC:.....
 Ciprofloxacin MIC:.....

Facultatief:

- Beta lactamase* pos
 Beta lactamase neg
 Spectinomycine MIC:.....
 Penicilline MIC:.....
 Tetracycline MIC:.....

Uitslagen GRAS anaal:

- Cefotaxim MIC:.....
 Ceftriaxon MIC:.....
 Azithromycine MIC:.....
 Ciprofloxacin MIC:.....

Facultatief:

- Beta lactamase* pos
 Beta lactamase neg
 Spectinomycine MIC:.....
 Penicilline MIC:.....
 Tetracycline MIC:.....

Uitslagen GRAS oraal:

- Cefotaxim MIC:.....
 Ceftriaxon MIC:.....
 Azithromycine MIC:.....
 Ciprofloxacin MIC:.....

Facultatief:

- Beta lactamase* pos
 Beta lactamase neg
 Spectinomycine MIC:.....
 Penicilline MIC:.....
 Tetracycline MIC:.....

Chlamydia Onderzoek

- vaginaal
 cervicaal
 urethraal
 anorectaal
 oraal
 urine

▪ Indien positief: Serovartypering voor LGV gedaan?

ja nee

▪ Uitslag typering?

pos neg LGV-PCR niet te beoordelen

Syfilis onderzoek

HIV onderzoek

- Opt out voor HIV onderzoek

Hepatitis B onderzoek

Hepatitis C onderzoek

Trichomonas onderzoek

HSV onderzoek

Condylomata acuminata onderzoek: ja nee

Overig onderzoek, namelijk....

Diagnose (meerdere antwoorden mogelijk)

GONORROE

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

CHLAMYDIA

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

SYFILIS

- negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

HIV

- Hiv positief
- Hiv negatief

HEPATITIS B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

▪ **Indien positief: Infectieus (Facultatief):**

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

HEPATITIS C

- Positief
- Negatief

▪ **Indien positief: Infectieus (Facultatief):**

- Ja
- Nee
- Niet getest/onbekend

CONDYLOMATA ACUMINATA

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

OVERIGE SOA DIAGNOSES

- urethritis
- mycoplasma genitalium
- trichomoniasis
- schaamluis
- scabiës

ULCERATIES

- herpes gen. primo-inf. type 1
- herpes gen. primo-inf. type 2
- herpes gen. primo-inf. type onbekend
- herpes genitalis recidief
- ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

ANDERE (HUID-)AANDOENINGEN

- candidiasis / balanitis
- bacteriële vaginose / gardnerella
- proctitis
- Epididymitis
- ulcus e.c.i.
- mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

Partner waarschuwing bij soa en hiv

Voor hoeveel partners is PW geïndiceerd (aantal te waarschuwen riscopartners)? Totaal:

Hoeveel van deze partners kunnen gewaarschuwd worden? Totaal:

Hoeveel partners worden en/of zijn er gewaarschuwd? Door index cliënt:

Door GGD: