



Vaccinatiegraad

Er is een einde gekomen aan de daling in deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma



Vaccinatiebereidheid voor maternale kinkhoest vaccinatie




Immuunsurveillance



Hoge antistof concentraties tegen vaccinn typen HPV16/18

Seroprevalentie in Caribisch Nederland



Meningokokken B

Niet geadviseerd
Herbeoordeling na 3 jaar



Meningokokken ACWY



=
14 maanden
Doorgaan met vaccineren



+
14 jaar
Invoering van vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Highlights surveillance 2018 - 2019

Bijwerkingen

1.519 meldingen van 5.208 mogelijke bijwerkingen

Een stijging van 9,8% door introductie van MenACWY vaccinatie voor 14-jarigen

Ziekte

Mazelen



Lokale mazelen uitbraak in een gemeente met lage vaccinatiegraad



Meningokokken W

Na een stijging sinds 2015 was er in de eerste 6 maanden van 2019 een daling of stabilisatie te zien in bijna alle leeftijdsgroepen



HPV

Vaccinatie **aanbevolen** voor




Aanvullend vaccinatieprogramma voor ongevaccineerde personen tot en met 26 jaar



Gordelroos

Aanbevolen
Vaccinatie van ouderen met het nieuwe gordelroosvaccin

De kosteneffectiviteit van het **nieuwe gordelroosvaccin** mag niet hoger zijn dan de gebruikte referentiewaarde van € 20.000 per QALY



Pathogeen

Vóórkomen van pneumokokkenziekte

Vaccin serotypen



Lage incidentie

Niet-vaccin serotypen



Incidentie stijgt