




Griep (influenza) en het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?











Griep



COVID-19

Verschillen

Overeenkomsten

Influenzavirus	SARS-CoV2	 Virus	
	Verlies van reuk en smaak, darmklachten	 Klachten	Koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, loopneus, spierpijn
1-4 dagen na besmetting	2-14 dagen na besmetting	 Hoe lang duurt het voor je klachten krijgt?	
Jonge kinderen	Nog niet volledig bekend	 Risicogroepen	Onder andere ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen
1 dag voor symptomen tot 7 dagen na start van klachten	2 dagen voor symptomen ten minste 7 dagen na start van de klachten	 Besmettelijke periode*	
		 Verspreiding	Verspreiding via druppels die bijvoorbeeld verspreid kunnen worden door hoesten/niezen. Eventuele verspreiding via handen en contact met slijmvliesen.
	Bloedpropjes (trombose)	 Complicaties	Longontsteking, ademhalingsproblemen, secundaire bacteriële infecties
Jaarlijks griepvaccin	Nog niet beschikbaar	 Vaccin	

* De besmettelijke periode kan soms langer zijn bij een langere ziekteduur of bij immuungecompromiteerden.