



Vragenlijst SOAP vervolgconsult

Algemeen

Datum vervolgconsult: dd/mm/yyyy

Consultnummer initiële consult: -----

Persoonsnummer: -----

Consulttype:

- Serologie herhaal consult
- 1 maand na start PrEP
- Gonorroe TOC
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: lost to follow-up (>6 maanden geen contact)
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

Consulttype: serologie herhaalconsult

Laboratorium onderzoek:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B

Diagnose

Syfilis:

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues stadium onbekend

Hiv:

- Negatief
- Positief

Indien positief,

infectieduur:

- Recent (≤ 6 maanden)
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus:

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

Consulttype: 1-maand na PrEP start consult

Laboratorium onderzoek en uitslagen

- Chlamydia
- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

Gonorroe

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="checkbox"/> Positief |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="checkbox"/> Positief |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

cervicaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

Indien chlamydia positief:

serovartypering voor LGV gedaan?

- Ja
- Nee

Uitslag typering?

- Positief
- Negatief
- LGV-PCR niet te beoordelen

Negatief

Negatief

Test mislukt

Negatief

Negatief

Test mislukt

Negatief

Negatief

Test mislukt

Negatief

Negatief

Test mislukt

Negatief

Negatief

Negatief

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

anaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

oraal

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- HSV onderzoek
- Geen onderzoek

Diagnose

GONORROE

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

HIV

- Hiv positief
- Hiv negatief

Indien positief, hiv-infectie duur:

- Recente infectie
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

ULCERATIES

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

CHLAMYDIA

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

HEPATITIS B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus (facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

SYFILIS

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

HEPATITIS C

- Negatief
- Doorgemaakte hepatitis
- Acute hepatitis C (seroconv <12 mnd geleden)
- Chronische hepatitis C (seroconv > 12 mnd geleden)
- Stadium onbekend PrEP vragen

Infectieuze hepatitis C (facultatief):

- Ja
- Nee
- Niet getest/onbekend

PrEP vragen

Gaat u door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Nee, ik stop

Indien ja, aantal voorgeschreven pillen:

- Geen
- 30
- 60
- 90
- Anders, nl....

Indien nee, waarom niet?

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapiegetrouw (medisch)
- Hiv diagnose
- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapiegetrouw (cliënt)
- Onbekend
- Anders, nl...

Consulttype: gonorroe test of cure

Laboratorium onderzoek

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

cervicaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

anaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

oraal

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azythromycine:

Ciprofloxacin:

Diagnose gonorrhoe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monster