



Vragenlijst SOAP 2022

Demografie

GGD locatie: -----

Persoonsnummer: -----

Consultnummer: -----

Datum consult: dd/mm/yyyy

Postcode cliënt (4 cijfers): _ _ _ _

- Geen vast verblijfadres
- Wonend in het buitenland
- Onbekend

Geboortejaar: _ _ _ _
 Onbekend

- Geslacht:
- Man
 - Vrouw
 - Transgender/non-binair/anders

Indien transgender/non-binair/anders,
genderidentiteit:

- Voelt zich man, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Voelt zich man, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Geboren als man, voelt zich niet volledig man of vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Geboren als man, voelt zich niet volledig man of vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Geboren als vrouw, voelt zich niet volledig man of vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Geboren als vrouw, voelt zich niet volledig man of vrouw, met mannelijke geslachtsdelen

Opleidingsniveau:

- Laag
- Middelbaar
- Hoog
- Anders, nl.....
- Onbekend

Land/werelddeel van geboorte	index	moeder	vader
Nederland	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marokko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turkije	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indonesië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suriname	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nederlandse Antillen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord/West/Midden Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost-Europa/MOE- landen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oceanië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West-Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onbekend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hulpvraag

Hulpvraag

- Soa-consult
- Seksualiteit
- Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
- Anticonceptie
- Onbedoelde zwangerschap
- Genderidentiteit
- Soa (geen test)
- Anders, nl

Hulpvraag seksualiteit

- Vragen over (problemen met) lichaam
- Seksuele dysfuncties
- Seksuele oriëntatie
- Seksueel gedrag/techniek
- Anders

Soa consult

- Regulier soa consult
- Man tot man/Testlab
- GGD Thuisestpakket
- PrEP: start consult
- PrEP: follow-up consult

Indicatiestelling

Sekspartners in de afgelopen 6 maanden:

- Mannen
- Vrouwen
- Mannen en vrouwen

Gewaarschuwd door partner:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien gewaarschuwd:

- **Voor welke soa?** Chlamydia LGV Hiv Hepatitis C Anders
 Gonorrhoe Syfilis Hepatitis B Trichomonas Onbekend/weet niet

▪ Gewaarschuwd door een recente sekspartner?

- Nee, laatste sekscontact met deze partner was meer dan 2 maanden geleden
- Ja, laatste sekscontact met deze partner was ≤ 2 maanden geleden
- Verzender waarschuwing onbekend/anoniem

▪ Hoe is de cliënt gewaarschuwd?

- Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, e-mail, etc
- Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- Via PW.nl met een code
- Via een zorgverlener van CSG

Soa klachten:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien klachten: kunnen deze klachten wijzen op syfilis of hiv?

- Ja
- Nee
- Onbekend

Partner uit doelgroep:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien ja: welke doelgroep?

- Partner geboren in soa endemisch gebied
- Ouders van partner geboren in soa endemisch gebied
- Geboorteland partner/ouders onbekend
- Indien vrouw: partner is MSM

Sekswerk in de afgelopen 6 maanden:

- Nee
- Ja
- Onbekend

Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)

- Nee
- Ja
- Onbekend

Andere indicatie (Facultatief) _____

Soa/hiv test- en risicogedrag

Heeft u het afgelopen jaar een soa-test gedaan?

- Nee
- Ja
- Onbekend

Eerdere hiv-test?

- Nee
- Ja, positief Jaar test: _____ Maand test: __
- Ja, negatief Jaar test: _____ Maand test: __
- Ja, uitslag onbekend
- Onbekend

Indien getest: chlamydia, gonorrhoe of syfilis gehad?

- Ja
- Nee
- Weet niet
- Onbekend

Met hoeveel personen heeft u seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden?

- _____ Onbekend

Prostituant(e) (afgelopen 6 maanden):

- Nee
- Ja
- Onbekend

Seks en condoomgebruik in de laatste 6 maanden:

<u>Receptieve anale seks</u>	<u>Insertieve anale seks</u>	<u>Vaginale seks</u>	<u>Gepijpt (orale seks geven):</u>
<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee
<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom
<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom
<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom
<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend

Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen gebruikt in de afgelopen 6 maanden? (Verplicht voor MSM, facultatief vrouwen en heteromannen)

- Nee
- Ja
- Onbekend

Indien ja: welke drugs?

Uppers

- Cocaine
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol (aangeschoten/dronken)
- Wiet/Hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl.....

Indien ja: heeft u drugs geslamt/geïnjecteerd? (Facultatief)

- Nee
- Ja

Extra vragen voor MSM

Heeft u in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:

- **meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**
 - Nee
 - Ja
 - Onbekend
- **hiv-positieve mannen? (Facultatief)**
 - Nee
 - Ja
 - Onbekend

PrEP vragen regulier soa consult/via testlab

Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt:

▪ **hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)**

- Dagelijks
- Rndom seks

▪ **wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)**

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPrEP, INPrEP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

PrEP vragen start consult

Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Rectale soa of syfilis diagnose
- Anale seks zonder condoom met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- PEP-kuur
- Geen indicatie
- Andere redenen
 - Financiële redenen
 - Angst voor hiv
 - Cliënt wil/kan niet terecht bij de huisarts
 - Cliënt wil zich optimaal beschermen
 - Kwetsbaar (o.a. MSM <25 jaar, migrant, seks werk, transgender)
 - Anders, nl.....

Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt:

▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPrEP, INPrEP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

Gaat u starten met PrEP?

- Ja
- Nee

Indien ja: aantal voorgeschreven pillen?

- geen
- 30
- 60
- 90
- 120
- 150
- 180
- Anders, nl...

Indien nee: waarom niet?

- Omdat er is sprake van een contra-indicatie
(hiv-infectie, verminderde nierfunctie, hepatitis B-infectie, interactie met andere medicatie, slechte therapietrouw)
- Nee, omdat de cliënt zelf (nog) niet wil starten
- Nee, vanwege een andere reden, nl...

PrEP vragen follow-up consult

Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt: hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

Gaat u de komende 3 maanden door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Nee, ik stop vanwege (meerdere antwoorden mogelijk)

Indien ja: aantal voorgeschreven pillen?

- geen
- 30
- 60
- 90
- 120
- 150
- 180
- Anders, nl...

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- Chlamydia onderzoek
- Gonorrhoe onderzoek
- Syfilis onderzoek
- Hiv onderzoek
 - o Opt out voor hiv
- Hepatitis B onderzoek
- Hepatitis C onderzoek
- Trichomonas onderzoek
- HSV onderzoek
- Geen lab onderzoek
- Overig onderzoek, nl....

Chlamydia onderzoek

- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?

- o Ja
- o Nee

Uitslag typering?

- o Positief
- o Negatief
- o LGV-PCR niet te beoordelen

Hepatitis C onderzoek

- anti-HCV
- HCV-RNA

Condylomata acuminata onderzoek

- o Nee
- o Ja

Gonorrhoe onderzoek

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- o Ja, GRAS
- o Nee
- o Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

Uitslagen GRAS

urethraal:

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

cervicaal:

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

anaal:

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

oraal

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

Facultatief:

Beta lactamase:

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

Diagnose

Gonorrhoe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

Chlamydia

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

Syfilis

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

Hiv

- Positief
- Negatief

Indien positief, infectie duur:

- Onbepaalde duur
- Recente infectie
- Bekend hiv positief

Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus

(facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

Hepatitis C

- Negatief
antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test
- Infectieus
RNA positief
- Doorgemaakt of behandeld
antistof positief en RNA negatief
- Infectieus/niet infectieus onbekend
antistof positief en geen RNA test verricht

Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- Ja
- Nee

Indien infectieus:

- Nieuw/herinfectie
- Bekend

Condylomata acuminata

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- Ja
- Nee
- Onbekend

Ulceraties

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

Overige soa diagnoses

- Urethritis
- Mycoplasma genitalium
- Trichomoniasis
- Schaamluis
- Scabiës

Andere (huid)aandoeningen

- Candidiasis / balanitis
- Bacteriële vaginose / gardnerella
- Proctitis
- Epididymitis
- Ulcus e.c.i.
- Mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

Partnerwaarschuwing bij soa en hiv

Voor hoeveel partners is PW geïndiceerd (aantal te waarschuwen risicopartners)?

Aantal

Hoeveel van deze partners kunnen gewaarschuwd worden?

Hoeveel partners worden en/of zijn er gewaarschuwd:

a. door de cliënt?

b. door GGD?
