



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## Werkwijze herhaalprik tegen corona voor patiënten met het syndroom van Down

*Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met de  
NHG, LHV, SNPG en GGD GHOR.*

*28 februari 2022*

## Inhoudsopgave

- 1      Inleiding –3**
- 2      Doelgroep –3**
- 3      Selectie –3**
- 4      Uitnodigen –4**
- 5      Vaccineren –4**

Dit is een uitgave van:  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu**  
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
Nederland  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

## 1 Inleiding

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om uit voorzorg volwassenen met het syndroom van Down een herhaalprik tegen corona aan te bieden, 3 maanden na de boostervaccinatie of doorgemaakte COVID-19. Kwetsbare groepen lopen een groter risico op ernstige ziekte en een deel van hen heeft de eerste booster zo'n drie maanden geleden gekregen, waardoor de bescherming inmiddels is afgenomen. Daardoor zou een toename in het aantal besmettingen toch tot ziekenhuisopnames kunnen leiden onder deze groepen, ondanks dat Omikron mild is. De minister heeft op 24 februari 2022 het advies overgenomen.

Aan huisartsen wordt gevraagd om deze patiënten te selecteren en uit te nodigen, zodat deze groep een afspraak kan maken bij de GGD.

## 2 Doelgroep

De doelgroep omvat alle volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down die medische zorg van de huisarts ontvangen. Het gaat om thuiswonende en bewoners van een instelling zonder medische dienst die zelf of met hulp van anderen naar een GGD-vaccinatie locatie kunnen komen.

De thuiswonende volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down die van u medische zorg ontvangen en niet in staat zijn om naar een GGD-vaccinatie locatie te komen, kunt u zelf vaccineren of aanmelden bij de GGD. Dit staat beschreven in de [werkwijze boostervaccinatie niet-mobiele thuiswonenden](#).

De instelling zonder medische dienst neemt contact op met de regionale GGD wanneer haar cliënten met het syndroom van Down niet in staat zijn om naar een GGD-vaccinatie locatie te komen.

Het kan zijn dat u patiënten met het syndroom van Down in uw praktijk heeft die in een instelling met medische dienst wonen. Voor deze patiënten wordt de vaccinatie door de instelling geregeld. U hoeft deze patiënten niet te selecteren. Mogelijk wordt u gevraagd contra-indicaties door te geven

## 3 Selectie

U wordt gevraagd om voor uw praktijk een selectie te maken van alle volwassenen van 18 jaar en ouder met het syndroom van Down. Meestal zijn deze patiënten al voldoende bij u in beeld. U kunt er aanvullend voor kiezen een selectie uit uw HIS te maken met behulp van de ICPC code A90.01 Syndroom van Down.

*Let op!* Tijdens eerdere campagnes bent u gevraagd om enkel de thuiswonende patiënten met het syndroom van Down te selecteren. Nu gaat het om alle patiënten met het syndroom van Down die medische zorg van u als huisarts ontvangen.

## 4 Uitnodigen

U nodigt deze doelgroep uit met behulp van een speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde uitnodigingsbrief en een gezondheidsverklaring van de GGD. Alleen met een gepersonaliseerde brief (voorzien van naam en adresgegevens van uw patiënt) kan uw patiënt een afspraak maken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door er een adressticker op te plakken. *Let op!* Zorg dat er geen BSN-nummer genoemd wordt op de adressticker.

De tekst van de brief mag niet veranderd worden. Anders is deze niet meer herkenbaar voor de medewerkers op de GGD-locatie. U kunt de uitnodiging en de gezondheidsverklaring van de GGD downloaden via de link in de SNPG-alert (verspreid via de SNPG-alert op 25 februari).

In de brief staat een speciaal telefoonnummer voor deze doelgroep. Dit telefoonnummer is per zaterdag 26 februari bereikbaar. U kunt de uitnodiging vanaf vrijdag 25 februari versturen.

## 5 Vaccineren

Wanneer uw patiënt aangeeft niet naar een GGD-vaccinatie locatie te durven vanwege prikangst, kunt u aangeven dat de GGD hier oplossingen voor biedt. Zo zijn er prikangst-sprekuren, speciale ruimtes met afleiding op de muur of prikkelarm. Ook is het mogelijk om meer tijd aan te vragen bij het vaccineren en om te vragen naar een prikker die ervaring heeft met patiënten met prikangst. Op de website van de regionale GGD is meer informatie te vinden over de mogelijkheden van vaccineren met prikangst.