



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Instructie nazorg BCG-vaccinatie

Zo zorgt u voor uw kind na de vaccinatie



Vaccinatie tegen tuberculose

Uw kind heeft de BCG-vaccinatie tegen tuberculose gekregen. Het is belangrijk dat het wondje dat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld wordt. In deze folder vindt u uitleg over wat u kunt verwachten na de vaccinatie, wat u moet doen en waar u op moet letten.


1 Uw kindje krijgt een prik in de arm

Het kind krijgt geen koorts van deze prik.




2 Na 1-2 maanden komt er een zweertje

Soms duurt het zelfs nog wat langer. Er kan bloed of pus uitkomen. Dit is normaal.



3 Na 6 tot 12 maanden is het zweertje verdwenen

Het is dan een klein litteken.




Zo zorgt u voor uw kind na de vaccinatie

Er kan bloed of pus uit het zweertje komen

Plak er dan een droog gaasje op.




Uw kind kan gewoon in bad of onder de douche



Gebruik geen zalf, crème, olie of pleisters op het zweertje

Knijp **niet** in het zweertje.



Meer informatie en hulp

Als er een zwelling van een klier in hals of oksel ontstaat, is het belangrijk dat u de GGD belt. U mag de GGD ook altijd bellen als u zich zorgen maakt over het zweertje.

Informatie in andere talen

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Somalisch / Tigrinya / Arabisch / Dari op:

This information is available in English at:

Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:

ብጃንቋ ትግርኛ ዝተተርጎሙ መልክዕ ናይ'ዚ ሓበሬታ፡ ኣብ'ዚ ዝስዕብ ገጽ ክርከብ ይከኣል፡-

هذه المعلومات متاحة باللغة العربية في هذا الموضوع:

این معلومات به زبان دری در اینجا قابل دسترس است:



www.rivm.nl/en/tuberculosis/information-materials

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl

september 2022

De zorg voor morgen begint vandaag