



Klinische verschijnselen van een infectie in de bloedbaan, zoals koorts (>38°C), koude rillingen of hypotensie

Afwezigheid van een infectiebron elders voor sepsis met hetzelfde micro-organisme als uit bloed en/of tipkweek

Kweek van perifeer bloed uit **venapunctie** is positief

Geen lijnsepsis

→ = Ja
→ = Nee

Kweek van perifeer bloed uit venapunctie is niet gedaan; bloed uit **arteriële** lijn is positief

Bloedkweek is niet gedaan én tipkweek volgens de (semi) kwantitatieve is positief

Kweek van (semi)-kwantitatieve tipkweek is positief met hetzelfde micro-organisme

Tipkweek is niet gedaan

Klinische verschijnselen van sepsis verdwijnen binnen 24 uur na verwijderen CVK

CVK blijft in situ en klinische verschijnselen van sepsis verdwijnen binnen 48 uur na start behandeling

Geen lijnsepsis

Kweek van (semi)-kwantitatieve tipkweek is positief met hetzelfde micro-organisme

Klinische verschijnselen van sepsis verdwijnen binnen 24 uur na verwijderen CVK

Geen lijnsepsis

Lijnsepsis

Lijnsepsis, cat. 3

Lijnsepsis, cat. 4

Lijnsepsis, cat. 2

Lijnsepsis, cat. 3