



واکسیناسیون در دوران بارداری

اگر شما باردار هستید، می توانید 2 واکسن بزنید. واکسن ضد آنفولانزا و سیاه سرفه (واکسیناسیون هفته 22). این واکسن ها از کودک و شما محافظت می کنند.



آنفولانزا

سیاه سرفه



زنان باردار نیز ممکن است در اثر آنفولانزا بشدت بیمار شوند.



گاهی آنها باید به بیمارستان بروند.



آنها می توانند بشدت دچار حالت خفه گی شوند.



نوزادان ممکن است در اثر آنفولانزا به شدت بیمار شوند.



نوزادان ممکن است بر اثر سیاه سرفه حتی بمیرند.



نوزادان هم ممکن است در اثر سرفه دچار ذات الریه یا آسیب مغزی شوند.



سیاه سرفه می تواند باعث حملات شدید سرفه شود. این ممکن است ماه ها طول بکشد.



چه زمان؟

شما از هفته بیست و دوم تا پایان بارداری می توانید واکسن ها را دریافت کنید. شما فقط از 15 اکتبر تا 1 مارس می توانید واکسن آنفولانزا دریافت کنید.

عوارض جانبی چه هستند؟

واکسیناسیون برای شما و کودک شما بی خطر است. شما می توانید عوارض جانبی داشته باشید.



سردرد



بی اشتها



درد در محل تزریق

بعد از واکسیناسیون چه اتفاقی می افتد؟

بدن شما پس از واکسیناسیون آنتی بادی تولید می کند. اینها از طریق جفت به جنین شما می رسند. به این ترتیب، کودک شما در ماه های اول پس از تولد در برابر سیاه سرفه و آنفولانزا نیز محافظت می شود.

نوزاد 1 تزریق کمتر

موارد زیر در مورد سیاه سرفه صدق می کنند: در صورتیکه شما واکسینه شوید، کودک شما به زودی به 1 تزریق کمتر نیاز خواهد داشت.

