



Vragenlijst SOAP vervolgconsult 2025

Algemeen

Datum vervolgconsult: dd/mm/yyyy

Consultnummer initiële consult: -----

Persoonsnummer: -----

Consulttype:

- Serologie herhaalconsult
- 1 maand na start PrEP
- Gonorroe TOC
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: lost to follow-up (>6 maanden geen contact)
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

Consulttype: serologie herhaalconsult

Laboratoriumonderzoek:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B

Diagnose

Syfilis:

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues stadium onbekend

Hiv:

- Negatief
- Positief

Indien positief, infectieduur:

- Recent (≤ 6 maanden)
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus:

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

Consulttype: 1-maand na PrEP start consult

Laboratoriumonderzoek en uitslagen

- Chlamydia
- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

Gonorrhoe

- | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | <input type="checkbox"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="checkbox"/> Positief | <input type="checkbox"/> Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

- Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

cervicaal:

- Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

anaal:

- Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

oraal

- Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- HSV onderzoek
- Geen onderzoek

Hepatitis C onderzoek

- anti-HCV
- HCV-RNA

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox) onderzoek

- Nee
- Ja

Indien chlamydia positief:

serovartypering voor LGV gedaan?

- Ja
- Nee

Uitslag typering?

- Positief
- Negatief
- LGV-PCR niet te beoordelen

Diagnose

GONORROE

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

CHLAMYDIA

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

SYFILIS

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

HIV

- Hiv positief
- Hiv negatief

Indien positief, hiv-infectie duur:

- Recente infectie
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

HEPATITIS B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus

(facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

ULCERATIES

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

HEPATITIS C

- Negatief
antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test
- Infectieus
RNA positief
- Doorgemaakt of behandeld
antistof positief en RNA negatief
- Infectieus/niet infectieus onbekend
antistof positief en geen RNA test verricht

Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- Ja
- Nee
- Onbekend

Indien infectieus:

- Nieuw/herinfectie
- Bekend

Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- Ja
- Nee
- Onbekend

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox)

- Negatief
- Positief

PrEP vragen

Gaat de cliënt door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Ja, maar via een ander CSG
- Nee, cliënt stopt

Indien nee, waarom niet?

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv diagnose
- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Financiële redenen
- Niet therapiegetrouw
- Onbekend
- Anders, nl...

Consulttype: gonorroe test of cure

Laboratorium onderzoek

- | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

cervicaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

anaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

oraal

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

Diagnose gonorroe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

Consulttype: Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

PrEP vragen

Gaat de cliënt door met PrEP?

(bij deze consultvorm altijd: Nee, cliënt stopt)

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Ja, maar via een ander CSG
- Nee, cliënt stopt

Indien nee, waarom niet?

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv diagnose
- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Financiële redenen
- Niet therapiegetrouw
- Onbekend
- Anders, nl...