



Vragenlijst SOAP 2026

Demografie

GGD locatie: -----

Persoonsnummer: -----

Consultnummer: -----

Datum consult: dd/mm/yyyy

Postcode cliënt (4 cijfers): ----

- ☐ Geen vast verblijfadres
- ☐ Wonend in het buitenland
- ☐ Onbekend

Geboortejaar: ----
☐ Onbekend

Geslacht geregistreerd bij geboorte:

- ☐ Man
- ☐ Vrouw

Genderidentiteit (geslacht volgens gevoel)

- ☐ Man
- ☐ Vrouw
- ☐ Anders (non-binair, genderfluïde, agender, etc.)

Is er sprake van gender-bevestigende chirurgie van de genitalia?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:
 - ☐ Vaginoplastiek / neo-vagina chirurgie
 - ☐ Phalloplastiek / neo-penis chirurgie
 - ☐ Hysterectomie / baarmoederverwijdering

Opleidingsniveau:

- ☐ Laag (geen, basisonderwijs, lbo, mavo, vmbo, mbo 1)
- ☐ Middelbaar (mbo 2-4, havo, vwo)
- ☐ Hoog (hbo, wo)
- ☐ Anders, nl.....
- ☐ Onbekend

Land/werelddeel van geboorte	index	moeder	vader
Nederland	☐	☐	☐
Marokko	☐	☐	☐
Turkije	☐	☐	☐
Indonesië	☐	☐	☐
Suriname	☐	☐	☐
Nederlandse Antillen	☐	☐	☐
Noord/West/Midden Europa	☐	☐	☐
Zuid Europa	☐	☐	☐
Oost-Europa/MOE- landen	☐	☐	☐
Zuid Afrika	☐	☐	☐
West Afrika	☐	☐	☐
Oost Afrika	☐	☐	☐
Noord Afrika	☐	☐	☐
Midden Afrika	☐	☐	☐
Noord Amerika	☐	☐	☐
Midden Amerika	☐	☐	☐
Zuid Amerika	☐	☐	☐
Oceanië	☐	☐	☐
West-Azië	☐	☐	☐
Azië	☐	☐	☐
Onbekend	☐	☐	☐

Hulpvraag

Hulpvraag

- ☐ Soa-consult
- ☐ Seksualiteit
- ☐ Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
- ☐ Anticonceptie
- ☐ Onbedoelde zwangerschap
- ☐ Genderidentiteit
- ☐ Soa (geen test)
- ☐ Anders, nl

Hulpvraag seksualiteit

- ☐ Vragen over (problemen met) lichaam
- ☐ Seksuele dysfuncties
- ☐ Seksuele oriëntatie
- ☐ Seksueel gedrag/techniek
- ☐ Anders

Consult

Type soa-consult

- ☐ Soa
- ☐ PrEP start consult
- ☐ PrEP follow-up consult

Gespreksvorm van het initiële consult

- ☐ Consult op CSG locatie
- ☐ Consult of outreach locatie
- ☐ Video/telefonisch consult
- ☐ Geen gesprek

Manier van testafname

- ☐ Op CSG/outreach locatie
- ☐ Thuis testpakket
- ☐ Op priklocatie (niet testlab)
- ☐ Testlab / man tot man

Indicatiestelling

Sekspartners in de afgelopen 6 maanden:

- ☐ Cis-mannen
- ☐ Cis-vrouwen
- ☐ Genderdiverse personen (bijv. trans, non-binair, genderfluïde, etc.)
 - ☐ met (neo-)penis
 - ☐ met (neo-)vagina

Geïnformeerd door partner:

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien geïnformeerd:

- Voor welke soa? ☐ Chlamydia ☐ LGV ☐ Hiv ☐ Hepatitis C ☐ Anders
☐ Gonorrroe ☐ Syfilis ☐ Hepatitis B ☐ Trichomonas ☐ Onbekend/weet niet

▪ Geïnformeerd door een recent sekscontact?

- ☐ Nee, laatste sekscontact met deze persoon was meer dan 2 weken geleden
- ☐ Ja, laatste sekscontact met deze persoon was ≤ 2 weken geleden
- ☐ Verzender notificatie onbekend/anoniem

▪ Geïnformeerd door vaste partner met klachten?

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

▪ Hoe is de cliënt geïnformeerd?

- ☐ Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, e-mail, etc
- ☐ Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- ☐ Via PW.nl met een code
- ☐ Via een zorgverlener van CSG

Soa klachten:

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien klachten: kunnen deze klachten wijzen op syfilis of hiv?

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Partner uit doelgroep:

(verplicht voor vrouwen en
heteroseksuele mannen)

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien ja: welke doelgroep?

- ☐ Partner geboren in soa endemisch gebied
- ☐ Ouders van partner geboren in soa endemisch gebied
- ☐ Geboorteland partner/ouders onbekend
- ☐ Indien vrouw: partner is MSM

Sekswerk in de afgelopen 6 maanden:

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Andere indicatie (Facultatief) _____

Deelname aan onderzoek (in te vullen in overleg met RIVM) _____

Soa/hiv test- en risicogedrag

Heeft de cliënt in het afgelopen jaar een soa-test gedaan?

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien getest: chlamydia, gonorroe of syfilis gehad?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Weet niet
- ☐ Onbekend

Heeft de cliënt een eerdere hiv-test gedaan?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, positief
- ☐ Ja, negatief
- ☐ Ja, uitslag onbekend
- ☐ Onbekend

Indien eerder getest: hoe lang geleden?

- ☐ 0-3 maanden geleden
- ☐ 4-6 maanden geleden
- ☐ 7-12 maanden geleden
- ☐ Meer dan 12 maanden geleden
- ☐ Onbekend

Indien nieuwe hiv-diagnose: waar was de laatste hiv-test?

- | | |
|--|--|
| ☐ GGD (incl. Testlab of outreach) | ☐ Zorgverlener in het buitenland |
| ☐ Huisarts | ☐ Thuisafnametest die naar het lab is gestuurd |
| ☐ Ziekenhuis | ☐ Zelftest die direct de uitslag gaf |
| ☐ Andere zorgverlener in Nederland | ☐ Onbekend |

Met hoeveel personen heeft de cliënt seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden? ____ ☐ Onbekend

Seks en condoomgebruik in de laatste 6 maanden:Receptieve anale seks

- ☐ Nee
- ☐ Ja, altijd met condoom
- ☐ Ja, niet altijd met condoom
- ☐ Ja, nooit met condoom
- ☐ Onbekend

Insertieve anale seks

- ☐ Nee
- ☐ Ja, altijd met condoom
- ☐ Ja, niet altijd met condoom
- ☐ Ja, nooit met condoom
- ☐ Onbekend

Vaginale seks

- ☐ Nee
- ☐ Ja, altijd met condoom
- ☐ Ja, niet altijd met condoom
- ☐ Ja, nooit met condoom
- ☐ Onbekend

Gepijpt (orale seks geven):

- ☐ Nee
- ☐ Ja, altijd met condoom
- ☐ Ja, niet altijd met condoom
- ☐ Ja, nooit met condoom
- ☐ Onbekend

Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen in de afgelopen 6 maanden? (Verplicht voor MSM en genderdiverse personen)

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien ja: welke drugs?Uppers

- ☐ Cocaïne
- ☐ XTC/MDMA
- ☐ Speed
- ☐ Crystal Meth ("Tina")
- ☐ Mephedrone ("Miau miau")
- ☐ 3-MMC
- ☐ 4-MEC
- ☐ 4-FA

Downers

- ☐ Alcohol (aangeschoten/dronken)
- ☐ Wiet/Hasj
- ☐ GHB/GBL ("Gina")
- ☐ Ketamine
- ☐ Heroïne

Anders

- ☐ Poppers
- ☐ Erectiestimulerende middelen
- ☐ Anders, nl.....

Indien ja: heeft de cliënt drugs geslamt/geïnjecteerd?

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Extra vragen voor MSM**Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Heeft de cliënt in de afgelopen 3 maanden preventief antibiotica gebruikt voor of na seksueel contact om soa te voorkomen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, Doxycycline (DoxyPEP/ DoxyPrEP)
- ☐ Ja, een ander antibioticum
- ☐ Onbekend

Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox) gehad? (Facultatief)

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- ☐ Onbekend

Indien ja: maand en jaar MPX infectie

(datum eerste ziekte dag of indien onbekend datum positieve testuitslag)

Jaar: _ _ _ _ Maand: _ _

Is de cliënt gevaccineerd tegen MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox)? (Facultatief)

- ☐ Nee
- ☐ Ja, twee keer
- ☐ Ja, één keer
- ☐ Onbekend

Indien ja: maand en jaar laatste MPX vaccinatie

Jaar: _ _ _ _ Maand: _ _

PrEP vragen regulier soa consult/via testlab

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, in de afgelopen 3 maanden
- ☐ Ja, 4-12 maanden geleden

Indien PrEP gebruikt:

▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- ☐ Dagelijks
- ☐ Rndom seks

▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- ☐ GGD-arts
- ☐ Huisarts
- ☐ Hiv behandelaar
- ☐ Andere arts/specialist
- ☐ Informeel/buitenland
- ☐ Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt/geen PrEP gebruikt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- ☐ Nierfunctiestoornis
- ☐ Medicatie interacties
- ☐ Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- ☐ Minder risicogedrag
- ☐ Ervaren bijwerkingen
- ☐ Logistieke redenen
- ☐ Financiële redenen
- ☐ Niet therapiegetrouw

Anders

- ☐ Anders, nl....
- ☐ Onbekend

Indien geen PrEP gebruikt: had de cliënt PrEP willen gebruiken?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Weet cliënt niet/onbekend

Indien ja: waarom heeft de cliënt geen PrEP gebruikt? (meerdere keuzes mogelijk)

- ☐ Ik heb (nog) geen actie ondernomen
- ☐ Ik sta op de wachtlijst bij het CSG
- ☐ Ik kom niet in aanmerking voor PrEP-zorg bij het CSG
- ☐ Ik wil niet naar mijn huisarts
- ☐ Mijn huisarts biedt geen PrEP-zorg
- ☐ Ik vind PrEP-zorg en/of medicatie te duur
- ☐ Anders, nl.....

PrEP vragen start consult

Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden?

(meerdere antwoorden mogelijk)

- ☐ Rectale soa of syfilis diagnose
- ☐ Anale seks zonder condoom met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- ☐ PEP-kuur
- ☐ Geen indicatie
- ☐ Andere redenen
 - ☐ Financiële redenen
 - ☐ Angst voor hiv
 - ☐ Cliënt wil/kan niet terecht bij de huisarts
 - ☐ Cliënt wil zich optimaal beschermen
 - ☐ Kwetsbaar (o.a. MSM <25 jaar, migrant, sekswerk, transgender, onverzekerd)
 - ☐ Anders, namelijk

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar? Indien PrEP gebruikt:

- ☐ Nee
- ☐ Ja, in de afgelopen 3 maanden
- ☐ Ja, 4-12 maanden geleden

■ hoe heeft de cliënt PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- ☐ Dagelijks
- ☐ Randon seks

■ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- ☐ GGD-arts
- ☐ Huisarts
- ☐ Hiv behandelaar
- ☐ Andere arts/specialist
- ☐ Informeel/buitenland
- ☐ Anders

Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt/geen PrEP gebruikt? (Meerdere redenen mogelijk)

Medische redenen:

- ☐ Nierfunctiestoornis
- ☐ Medicatie interacties
- ☐ Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- ☐ Minder risicogedrag
- ☐ Ervaren bijwerkingen
- ☐ Logistieke redenen
- ☐ Financiële redenen
- ☐ Niet therapiegetrouw

Anders

- ☐ Anders, nl....
- ☐ Onbekend

Indien geen PrEP gebruikt: had de cliënt PrEP willen gebruiken?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Weet cliënt niet/onbekend

Indien ja: waarom heeft de cliënt geen PrEP gebruikt? (meerdere keuzes mogelijk)

- ☐ Ik heb (nog) geen actie ondernomen
- ☐ Ik sta op de wachtlijst bij het CSG
- ☐ Ik kom niet in aanmerking voor PrEP-zorg bij het CSG
- ☐ Ik wil niet naar mijn huisarts
- ☐ Mijn huisarts biedt geen PrEP-zorg
- ☐ Ik vind PrEP-zorg en/of medicatie te duur
- ☐ Anders, nl.....

PrEP vragen follow-up consult

Heeft de cliënt PrEP gebruikt in het afgelopen jaar? Indien PrEP gebruikt: hoe heeft de cliënt PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- ☐ Nee
- ☐ Ja, in de afgelopen 3 maanden
- ☐ Ja, 4-12 maanden geleden

- ☐ Dagelijks
- ☐ Randon seks

Gaat de cliënt de komende 3 maanden door met PrEP?

- ☐ Ja
- ☐ Ja, maar niet meer via CSG
- ☐ Ja, maar via een ander CSG
- ☐ Nee, de cliënt stopt vanwege (meerdere antwoorden mogelijk)

Medische redenen:

- ☐ Nierfunctiestoornis
- ☐ Medicatie interacties
- ☐ Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- ☐ Minder risicogedrag
- ☐ Ervaren bijwerkingen
- ☐ Logistieke redenen
- ☐ Financiële redenen
- ☐ Niet therapiegetrouw

Anders

- ☐ Anders, nl....
- ☐ Onbekend

Indien ja: welke testfrequentie is in principe afgesproken met de cliënt?

- ☐ 3-maandelijks
- ☐ 4-maandelijks
- ☐ 5-maandelijks
- ☐ 6-maandelijks
- ☐ Anders, nl ...

Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- | | |
|--|---|
| ☐ Chlamydia onderzoek | ☐ Hepatitis C onderzoek |
| ☐ Gonorroe onderzoek | ☐ Trichomonas onderzoek |
| ☐ Syfilis onderzoek | ☐ HSV onderzoek |
| ☐ Hiv onderzoek | ☐ Geen lab onderzoek |
| ○ Opt out voor hiv | ☐ Overig onderzoek, nl.... |
| ☐ Hepatitis B onderzoek | |

Chlamydia onderzoek

- ☐ Vaginaal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Urethraal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Urine

Serovarterpering voor LGV gedaan?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Uitslag typering?

- ☐ Positief
- ☐ Negatief
- ☐ LGV-PCR niet te beoordelen

Hepatitis C onderzoek

- ☐ anti-HCV
- ☐ HCV-RNA

Condylomata acuminata onderzoek

- ☐ Nee
- ☐ Ja

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox) onderzoek

- ☐ Nee
- ☐ Ja

Gonorroe onderzoek

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Gram preparaat | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ Kweek vaginaal/cervicaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ NAAT cervicaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urine | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT vaginaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- ☐ Ja, GRAS
- ☐ Nee
- ☐ Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Anaal
- ☐ Oraal

Uitslagen GRAS

urethraal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:

Facultatief:

Beta lactamase:

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

cervicaal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

anaal:

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

oraal

Cefotaxim MIC:
Ceftriaxon MIC:
Azitromycine MIC:
Ciprofloxacin MIC:

Facultatief:

Beta lactamase

- Positief
- Negatief

Spectinomycine MIC:

Penicilline MIC:

Tetracycline MIC:

Diagnose

Gonorrroe

- ☐ Negatief
- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Vaginaal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Obv gepoolde monsters

Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

Indien infectieus

(facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

Chlamydia

- ☐ Negatief
- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Vaginaal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Obv gepoolde monsters

Condylomata acuminata

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

Syfilis

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox)

- Negatief
- Positief

Hiv

- Positief
- Negatief

Indien positief, infectie duur:

- Onbepaalde duur
- Recente infectie
- Bekend hiv positief

Ulceraties

- ☐ Herpes gen. primo-inf. type 1
- ☐ Herpes gen. primo-inf. type 2
- ☐ Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- ☐ Herpes genitalis recidief
- ☐ Ulcus molle
- ☐ LGV anorectaal
- ☐ LGV urogenitaal
- ☐ LGV oraal
- ☐ LGV ulcus

Overige soa diagnoses

- ☐ Urethritis
- ☐ Mycoplasma genitalium
- ☐ Trichomoniasis
- ☐ Schaamluis
- ☐ Scabiës

Andere (huid)aandoeningen

- ☐ Candidiasis / balanitis
- ☐ Bacteriële vaginose / gardnerella
- ☐ Proctitis
- ☐ Epididymitis
- ☐ Ulcus e.c.i.
- ☐ Mollusca contagiosa
- ☐ PID
- ☐ Anders, nl....

Hepatitis C

- ☐ Negatief
antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test
- ☐ Infectieus
RNA positief
- ☐ Doorgemaakt of behandeld
antistof positief en RNA negatief
- ☐ Infectieus/niet infectieus onbekend
antistof positief en geen RNA test verricht

Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Onbekend

Indien infectieus:

- ☐ Nieuw/herinfectie
- ☐ Bekend

Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Onbekend