



Vragenlijst SOAP vervolgconsult 2026

Algemeen

Datum vervolgconsult: dd/mm/yyyy

Consultnummer initiële consult: _ _ _ _ _

Persoonsnummer: _ _ _ _ _

Consulttype:

- ☐ Serologie herhaalconsult
- ☐ 1 maand na start PrEP
- ☐ Gonorroe TOC
- ☐ Geen consult, PrEP zorg beëindigd: lost to follow-up (>6 maanden geen contact)
- ☐ Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

Consulttype: serologie herhaalconsult

Laboratoriumonderzoek:

- ☐ Syfilis
- ☐ Hiv
- ☐ Hepatitis B

Diagnose

Syfilis:

- ☐ Negatief
- ☐ Lues I
- ☐ Lues II
- ☐ Lues latens recens
- ☐ Lues latens tarda
- ☐ Lues, (eerder) behandeld
- ☐ Lues stadium onbekend

Hiv:

- ☐ Negatief
- ☐ Positief

Indien positief, infectieduur:

- ☐ Recent (≤ 6 maanden)
- ☐ Onbepaalde duur
- ☐ Bekend hiv positief

Hepatitis B

- ☐ Infectieus
- ☐ Doorgemaakt
- ☐ Negatief

Indien infectieus:

- ☐ Acut
- ☐ Chronisch
- ☐ Onbekend

Consulttype: 1-maand na PrEP start consult

Laboratoriumonderzoek en uitslagen

- ☐ Chlamydia
- ☐ Vaginaal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Urethraal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Urine

☐ Gonorroe

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Gram preparaat | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ Kweek vaginaal/cervicaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ NAAT cervicaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urine | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT vaginaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- ☐ Ja, GRAS
- ☐ Nee
- ☐ Nvt

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

cervicaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Uitslag typering?

- ☐ Positief
- ☐ Negatief
- ☐ LGV-PCR niet te beoordelen

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Anaal
- ☐ Oraal

anaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

oraal

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

- ☐ Syfilis
- ☐ Hiv
- ☐ Hepatitis B
- ☐ Hepatitis C
- ☐ HSV onderzoek
- ☐ Geen onderzoek

Hepatitis C onderzoek

- ☐ anti-HCV
- ☐ HCV-RNA

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox) onderzoek

- ☐ Nee
- ☐ Ja

Diagnose

GONORROE

- ☐ Negatief
- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Vaginaal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Obv gepoolde monsters

CHLAMYDIA

- ☐ Negatief
- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Vaginaal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Obv gepoolde monsters

SYFILIS

- ☐ Negatief
- ☐ Lues I
- ☐ Lues II
- ☐ Lues latens recens
- ☐ Lues latens tarda
- ☐ Lues, (eerder) behandeld
- ☐ Lues, stadium onbekend

HIV

- ☐ Hiv positief
- ☐ Hiv negatief

Indien positief, hiv-infectie duur:

- ☐ Recente infectie
- ☐ Onbepaalde duur
- ☐ Bekend hiv positief

HEPATITIS B

- ☐ Infectieus
- ☐ Doorgemaakt
- ☐ Negatief

Indien infectieus (facultatief):

- ☐ Acut
- ☐ Chronisch
- ☐ Onbekend

ULCERATIES

- ☐ Herpes gen. primo-inf. type 1
- ☐ Herpes gen. primo-inf. type 2
- ☐ Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- ☐ Herpes genitalis recidief
- ☐ Ulcus molle
- ☐ LGV anorectaal
- ☐ LGV urogenitaal
- ☐ LGV oraal
- ☐ LGV ulcus

HEPATITIS C

- ☐ Negatief
antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test
- ☐ Infectieus
RNA positief
- ☐ Doorgemaakt of behandeld
antistof positief en RNA negatief
- ☐ Infectieus/niet infectieus onbekend
antistof positief en geen RNA test verricht

Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Onbekend

Indien infectieus:

- ☐ Nieuw/herinfectie
- ☐ Bekend

Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Onbekend

MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox)

- ☐ Negatief
- ☐ Positief

PrEP vragen

Gaat de cliënt door met PrEP?

- ☐ Ja
- ☐ Ja, maar niet meer via CSG
- ☐ Ja, maar via een ander CSG
- ☐ Nee, cliënt stopt

Indien nee, waarom niet?

- ☐ Nierfunctiestoornis
- ☐ Medicatie interacties
- ☐ Hiv diagnose
- ☐ Minder risicogedrag
- ☐ Ervaren bijwerkingen
- ☐ Logistieke redenen
- ☐ Financiële redenen
- ☐ Niet therapiegetrouw
- ☐ Onbekend
- ☐ Anders, nl...

Consulttype: gonorroe test of cure

Laboratorium onderzoek

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Gram preparaat | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ Kweek | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| vaginaal/cervicaal | | | |
| ☐ Kweek urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ Kweek oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | ☐ Test mislukt |
| ☐ NAAT cervicaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urethraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT anorectaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT oraal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT urine | ☐ Positief | ☐ Negatief | |
| ☐ NAAT vaginaal | ☐ Positief | ☐ Negatief | |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- ☐ Ja, GRAS
- ☐ Nee
- ☐ Nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Anaal
- ☐ Oraal

GRAS uitslagen, MIC waarden

urethraal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

cervicaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

anaal:

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

oraal

Cefotaxim:
Ceftriaxon:
Azitromycine:
Ciprofloxacin:
Tetracycline:

Diagnose gonorroe

- ☐ Negatief
- ☐ Urethraal
- ☐ Cervicaal
- ☐ Vaginaal
- ☐ Anorectaal
- ☐ Oraal
- ☐ Obv gepoolde monsters

Consulttype: Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

PrEP vragen

Gaat de cliënt door met PrEP?

- ☐ Ja
- ☐ Ja, maar niet meer via CSG
- ☐ Ja, maar via een ander CSG
- ☐ Nee, cliënt stopt

Indien nee, waarom niet?

- ☐ Nierfunctiestoornis
- ☐ Medicatie interacties
- ☐ Hiv diagnose
- ☐ Minder risicogedrag
- ☐ Ervaren bijwerkingen
- ☐ Logistieke redenen
- ☐ Financiële redenen
- ☐ Niet therapiegetrouw
- ☐ Onbekend
- ☐ Anders, nl...