

Uitleg bemonstering

Zandregio		Lössregio	Veenregio	Kleiregio	
Programma A  <u>winter</u> –  <u>zomer</u> 1x grondwater	Programma B  <u>winter</u> 1x grondwater 4x drainwater 4x slootwater  <u>zomer</u> 1x grondwater 4x slootwater	 <u>winter</u> 1x bodemvocht  <u>zomer</u> –	 <u>winter</u> 1x grondwater 4x slootwater (en soms greppelwater)  <u>zomer</u> 4x slootwater	 Met drains  <u>winter</u> 4x drainwater 4x slootwater  <u>zomer</u> 4x slootwater	 Geen drains  <u>winter</u> 2x grondwater 4x slootwater  <u>zomer</u> 4x slootwater
Toelichting Programma A is het basis programma voor alle deelnemers. Bij ongeveer 60 bedrijven op natte zandgebieden bemonstert het RIVM intensiever (programma B).		Toelichting In de Lössregio bevindt het grondwater zich vaak dieper dan vijf meter onder het maaiveld. Daarom neemt het RIVM bij alle deelnemers grondmonsters. In het laboratorium haalt een centrifuge vervolgens het bodemvocht uit deze grondmonsters.		Toelichting Ook als een bedrijf wel drains heeft, kan het zijn dat het RIVM dit bedrijf bemonstert als een bedrijf zonder drains. Dat komt omdat meer dan 25% van het oppervlakte gedraineerd moet zijn en omdat de drains ook goed moeten werken om monsters te kunnen nemen.	