



Vaccinaties tijdens de zwangerschap

Als je zwanger bent, kun je twee vaccinaties halen: de kinkhoestprik en de grieprik. Deze beschermen je baby én jezelf tegen kinkhoest en griep.

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest kan zorgen voor ernstige hoestbuien. Deze kunnen maanden duren.

Baby's kunnen door het hoesten longontsteking of hersenschade krijgen.

Soms moeten ze naar het ziekenhuis. Baby's kunnen eraan overlijden.




Wat is griep?

Baby's kunnen ernstig ziek en benauwd worden van griep.

Soms krijgen ze longontsteking en moeten ze naar het ziekenhuis.

Ook zwangeren kunnen erg ziek worden van griep.



DKT-prik

De kinkhoestprik is de DKT-prik. Deze beschermt ook tegen difterie en tetanus. Als jij je laat vaccineren, hoeft je baby straks één DKT-prik minder.

Hoe werkt het?

Na de vaccinatie maak je antistoffen aan. Deze gaan via de placenta naar je baby. Zo is je kindje ook in de eerste maanden na geboorte beschermd tegen kinkhoest en griep.

Wanneer?

Je kan de vaccinaties halen vanaf de 22^e week tot aan het einde van je zwangerschap. De grieprik kun je alleen halen tussen 15 oktober en 1 maart.

Wat kunnen bijwerkingen zijn?

De vaccinaties zijn veilig voor je baby en jezelf. Je kan wel bijwerkingen krijgen, zoals pijn op de prikplek, hongerigheid of hoofdpijn.



Waar haal je de prik?

Maak een afspraak bij het consultatiebureau bij jou in de buurt. Kijk op rvp.nl/afspraak-maken-vaccinaties



Heb je vragen?

Kijk op www.rivm.nl/zwanger-en-vaccineren of stel je vraag op het consultatiebureau of aan je verloskundig zorgverlener.

